EPIDEMIOLOGIA DE DOENÇAS DE PLANTAS

**CONCEITOS
TRADICIONAIS**

**DEFINIÇÃO E OBJETIVOS
PADRÕES REGULARES
DOIS GRUPOS EPIDEMIOLÓGICOS
PRINCÍPIO FUNDADOR
CONTROLE I**

**CONCEITOS
NOVOS**

**HLB DOS CITROS
O TERCEIRO GRUPO EPIDEMIOLÓGICO
CONTROLE II
OUTROS EXEMPLOS**

EPIDEMIOLOGIA

definição

O estudo das populações do patógeno e do hospedeiro e do contato entre elas, que leva a algo novo: A DOENÇA.

Esta pode ser considerada como uma terceira classe de população: a população de LESÕES ou de PLANTAS DOENTES.

EPIDEMIOLOGIA

objetivos

Compreender melhor o patossistema, ou seja, a estrutura e o comportamento da população de lesões ou de plantas doentes no tempo e no espaço.

ACADÊMICO

Para isso leva em conta as populações do (i) HOSPEDEIRO, do (ii) PATÓGENO, do (iii) VETOR (se houver) e de (iv) HOSPEDEIROS SECUNDÁRIOS (se houver), bem como as influências do clima e do homem sobre o patossistema.

A melhor compreensão é a base do CONTROLE RACIONAL DA DOENÇA.

APLICADO

EPIDEMIOLOGIA DE DOENÇAS DE PLANTAS

CONCEITOS
TRADICIONAIS

DEFINIÇÃO E OBJETIVOS

PADRÕES REGULARES

DOIS GRUPOS EPIDEMIOLÓGICOS

PRINCÍPIO FUNDADOR

CONTROLE I

CONCEITOS
NOVOS

HLB DOS CITROS

O TERCEIRO GRUPO EPIDEMIOLÓGICO

CONTROLE II

OUTROS EXEMPLOS

EPIDEMIOLOGIA

padrões regulares ^{GRUPO} 1

VERTICILLIUM EM BATATA
Verticillium albo-atrum
Verticillium dahliae

COLONIZAÇÃO DOS TECIDOS SENESCENTES

COLONIZAÇÃO DA RAIZ

FORMAÇÃO DE MICROESCLERÓDIOS

PENETRAÇÃO PELA PONTA DA RAIZ

MICROESCLERÓDIOS NO SOLO

EXSUDATOS DA PLANTA E GERMINAÇÃO

germinação do microescleróidio

GRUPO 1

EPIDEMIOLOGIA

padrões regulares **GRUPO 2**

EPIDEMIOLOGIA

padrões regulares **GRUPOS 1 & 2**

EPIDEMIOLOGIA

padrões regulares **GRUPOS 1 & 2**

xilema

VERTICILLIUM EM BATATA

SEM CICLOS SECUNDÁRIOS

SARNA DA MACIEIRA

repete-se várias vezes

MUITOS CICLOS SECUNDÁRIOS

GRUPO **1**

GRUPO **2**

EPIDEMIOLOGIA

padrões regulares **GRUPOS 1 & 2**

EPIDEMIOLOGIA DE DOENÇAS DE PLANTAS

**CONCEITOS
TRADICIONAIS**

DEFINIÇÃO E OBJETIVOS

PADRÕES REGULARES

DOIS GRUPOS EPIDEMIOLÓGICOS

PRINCÍPIO FUNDADOR

CONTROLE I

**CONCEITOS
NOVOS**

HLB DOS CITROS

O TERCEIRO GRUPO EPIDEMIOLÓGICO

CONTROLE II

OUTROS EXEMPLOS

dois grupos epidemiológicos

DOENÇAS MONOCÍCLICAS

Plantas infectadas durante o ciclo da cultura não servem de fonte de inóculo para novas infecções no mesmo ciclo

DOENÇAS POLICÍCLICAS

Plantas infectadas durante o ciclo da cultura servem de fonte de inóculo para novas infecções no mesmo ciclo

EPIDEMIOLOGIA DE DOENÇAS DE PLANTAS

CONCEITOS
TRADICIONAIS

DEFINIÇÃO E OBJETIVOS
PADRÕES REGULARES
DOIS GRUPOS EPIDEMIOLÓGICOS
PRINCÍPIO FUNDADOR
CONTROLE I

CONCEITOS
NOVOS

HLB DOS CITROS
O TERCEIRO GRUPO EPIDEMIOLÓGICO
CONTROLE II
OUTROS EXEMPLOS

DOENÇAS POLICÍCLICAS

**PRINCÍPIO
FUNDADOR**

FITOPATOLOGIA TRADICIONAL
DOENÇAS POLICÍCLICAS

- i** O papel da **DISSEMINAÇÃO PRIMÁRIA** é introduzir o patógeno em áreas indenes
- ii** O subsequente desenvolvimento da epidemia é governado pela **DISSEMINAÇÃO SECUNDÁRIA**

dois grupos epidemiológicos

DOENÇAS POLICÍCLICAS

PRINCÍPIO FUNDADOR

MEDIDAS DE CONTROLE IMPLEMENTADAS SOMENTE NA PROPRIEDADE SÃO SUFICIENTES

FITOPATOLOGIA TRADICIONAL DOENÇAS POLICÍCLICAS

- i O papel da **DISSEMINAÇÃO PRIMÁRIA** é introduzir o patógeno em áreas indenes
- ii O subsequente desenvolvimento da epidemia é governado pela **DISSEMINAÇÃO SECUNDÁRIA**

GRUPO
1

MURCHA DE FUSARIUM EM MORANGO

**inóculo primário
clamidósporos**

COM FUNGICIDA

COM FUNGICIDA

SEM FUNGICIDA

**inóculo secundário
uredósporos**

FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA

Phakopsora pachyrhizi

EPIDEMIOLOGIA DE DOENÇAS DE PLANTAS

CONCEITOS
TRADICIONAIS

DEFINIÇÃO E OBJETIVOS
PADRÕES REGULARES
DOIS GRUPOS EPIDEMIOLÓGICOS
PRINCÍPIO FUNDADOR

CONTROLE I

CONCEITOS
NOVOS

HLB DOS CITROS
O TERCEIRO GRUPO EPIDEMIOLÓGICO
CONTROLE II
OUTROS EXEMPLOS

dois grupos epidemiológicos

GRUPO
1

DOENÇAS MONOCÍCLICAS

Plantas infectadas durante o ciclo da cultura não servem de fonte de inóculo para novas infecções no mesmo ciclo

GRUPO
2

DOENÇAS POLICÍCLICAS

Plantas infectadas durante o ciclo da cultura servem de fonte de inóculo para novas infecções no mesmo ciclo

CONTROLE I

TRATAMENTO DO SOLO
ROTAÇÃO DE CULTURAS

INÓCULO
PRIMÁRIO

RESISTÊNCIA GENÉTICA
CONTROLE QUÍMICO

INÓCULO
SECUNDÁRIO

NA PROPRIEDADE
PRINCÍPIO
FUNDADOR

EPIDEMIOLOGIA DE DOENÇAS DE PLANTAS

**CONCEITOS
TRADICIONAIS**

**DEFINIÇÃO E OBJETIVOS
PADRÕES REGULARES
DOIS GRUPOS EPIDEMIOLÓGICOS
PRINCÍPIO FUNDADOR
CONTROLE I**

**CONCEITOS
NOVOS**

**HLB DOS CITROS
O TERCEIRO GRUPO EPIDEMIOLÓGICO
CONTROLE II
OUTROS EXEMPLOS**

HUANGLONGBING DOS CITROS

HUANGLONGBING
DOENÇA DO DRAGÃO AMARELO

Huanglongbing = Doença do Dragão Amarelo

HUANGLONGBING

sintomas

**DOENÇA
SISTÊMICA**

HUANGLONGBING

patógenos

Candidatus Liberibacter asiaticus
Candidatus Liberibacter americanus

Ca. L. asiaticus* no floema de *Citrus

***Candidatus* Liberibacter asiaticus**
em floema de *Citrus* no Brasil

HUANGLONGBING
patógenos

***Candidatus* Liberibacter americanus**
em *Cataranthus* (vinca) no Brasil
- inoculada por meio de enxertia (*Cuscuta*) -

HUANGLONGBING

o vetor

psilídeo – *Diaphorina citri*

HUANGLONGBING

a mais séria doença dos citros

SÃO PAULO

março 2004

Ca. Liberibacter asiaticus

Ca. Liberibacter americanus

Diaphorina presente desde 1942

2004-2014: 38,8 mi erradicadas

MUNDO

Até 1990:

> 100 milhões de árvores:
China, Indonésia, Tailândia,
Vietnã, Arábia Saudita (...)

Só recentemente chegou aos
grandes produtores mundiais:
São Paulo – 2004
Flórida – 2005

TRAGÉDIA ANUNCIADA!

HUANGLONGBING

SITUAÇÃO ATUAL EM SÃO PAULO

número de plantas sintomáticas

plantas sintomáticas %

**TRAGÉDIA
ANUNCIADA!**

HUANGLONGBING

SITUAÇÃO ATUAL NA FLÓRIDA

**PIOR QUE ISSO SÓ A
SITUAÇÃO DA FLÓRIDA**

80% DE INFECÇÃO

SINGERMAN & USECHE (2015)

**PRODUÇÃO 2015-16: 74 MILHÕES DE CAIXAS
A MENOR DESDE 1963/1964**

**PREVISÃO PARA 2026: 27 MILHÕES DE CAIXAS
82% MENOR QUE EM 2005: 150 MILHÕES**

MÍNIMO PARA MANTER INDÚSTRIA: 50-60 MILHÕES

**PERDA PROVÁVEL EM MAIS 5 ANOS:
TODA A INDÚSTRIA CITRÍCOLA**

THE (ex) ORANGE STATE

HUANGLONGBING

a mais séria doença dos citros

O PRODUTOR
desde 2008

QUANDO É QUE VOCÊS
- CIENTISTAS -
VÃO APRESENTAR A SOLUÇÃO
PARA A TRAGÉDIA DO
HUANGLONGBING?

XXXVIII
SEMANA DA
CITRICULTURA

Centro
de Citricultura
Sylvio Moreira

IAC
INSTITUTO AGRONÔMICO

HUANGLONGBING

a mais séria doença dos citros

QUANDO É QUE VOCÊS
- CIENTISTAS -
VÃO APRESENTAR
A SOLUÇÃO PARA A
TRAGÉDIA DO
HUANGLONGBING?

A SOLUÇÃO JÁ EXISTE!
MAS VOCÊS
- PRODUTORES -
NÃO CONSEGUEM
IMPLEMENTÁ-LA.

O CIENTISTA

O HORROR!

EPIDEMIOLOGIA DE DOENÇAS DE PLANTAS

CONCEITOS
TRADICIONAIS

DEFINIÇÃO E OBJETIVOS
PADRÕES REGULARES
DOIS GRUPOS EPIDEMIOLÓGICOS
PRINCÍPIO FUNDADOR
CONTROLE I

CONCEITOS
NOVOS

HLB DOS CITROS
O TERCEIRO GRUPO EPIDEMIOLÓGICO
CONTROLE II
OUTROS EXEMPLOS

RECORDAÇÃO

CONCEITOS BÁSICOS DE EPIDEMIOLOGIA

RECORDAÇÃO

PRINCÍPIO FUNDADOR

MEDIDAS DE CONTROLE IMPLEMENTADAS SOMENTE NA PROPRIEDADE SÃO SUFICIENTES

DOENÇAS POLICÍCLICAS

MANUAL DE FITOPATOLOGIA

1ª. Ed. (1968)
2ª. Ed. (1978)
3ª. Ed. (1995)
4ª. Ed. (2011)

O ESSENCIAL DA FITOPATOLOGIA

L. ZAMBOLIM et al.
Vol. 1 (2012)

FITOPATOLOGIA TRADICIONAL DOENÇAS DE JUROS COMPOSTOS

O papel da **DISSEMINAÇÃO PRIMÁRIA** é introduzir o patógeno em áreas indenes

O subsequente desenvolvimento da epidemia é governado pela **DISSEMINAÇÃO SECUNDÁRIA**

PRINCIPLES OF PLANT INFECTION

E. GÄUMANN
(1950)

PLANT PATHOLOGY

G.N. AGRIOS
3ª. Ed. (1988)
4ª. Ed. (1997)
5ª. Ed. (2005)

O TERCEIRO GRUPO EPIDEMIOLÓGICO

HUANGLONGBING DOS CITROS

TERCEIRO GRUPO DE DOENÇAS:
POLICÍCLICAS COM
DISSEMINAÇÃO PRIMÁRIA CONTÍNUA

GRUPO
3

A epidemia é governada tanto pela
DISSEMINAÇÃO SECUNDÁRIA quanto
pela **DISSEMINAÇÃO PRIMÁRIA CONTÍNUA**

O TERCEIRO GRUPO EPIDEMIOLÓGICO

HUANGLONGBING DOS CITROS

TERCEIRO GRUPO DE DOENÇAS:
POLICÍCLICAS COM
DISSEMINAÇÃO PRIMÁRIA CONTÍNUA

GRUPO
3

A epidemia é governada tanto pela **DISSEMINAÇÃO SECUNDÁRIA** quanto pela **DISSEMINAÇÃO PRIMÁRIA CONTÍNUA**

O TERCEIRO GRUPO EPIDEMIOLÓGICO

HUANGLONGBING DOS CITROS

TERCEIRO GRUPO DE DOENÇAS:
POLICÍCLICAS COM
DISSEMINAÇÃO PRIMÁRIA CONTÍNUA

GRUPO
3

A epidemia é governada tanto pela **DISSEMINAÇÃO SECUNDÁRIA** quanto pela **DISSEMINAÇÃO PRIMÁRIA CONTÍNUA**

O TERCEIRO GRUPO EPIDEMIOLÓGICO

HUANGLONGBING DOS CITROS

TERCEIRO GRUPO DE DOENÇAS:
POLICÍCLICAS COM
DISSEMINAÇÃO PRIMÁRIA CONTÍNUA

GRUPO
3

A epidemia é governada tanto pela **DISSEMINAÇÃO SECUNDÁRIA** quanto pela **DISSEMINAÇÃO PRIMÁRIA CONTÍNUA**

HUANGLONGBING

epidemiologia

EXEMPLO TÍPICO DO TERCEIRO
GRUPO DE DOENÇAS:
POLICÍCLICAS COM DISSEMINAÇÃO
PRIMÁRIA CONTÍNUA

GRUPO
3

HUANGLONGBING

epidemiologia

EXEMPLO TÍPICO DO TERCEIRO
GRUPO DE DOENÇAS:
**POLICÍCLICAS COM DISSEMINAÇÃO
PRIMÁRIA CONTÍNUA**

**GRUPO
3**

**No interior:
controle químico do
vetor eficiente
(pouca disseminação
secundária)**

HUANGLONGBING

epidemiologia

EXEMPLO TÍPICO DO TERCEIRO
GRUPO DE DOENÇAS:
**POLICÍCLICAS COM DISSEMINAÇÃO
PRIMÁRIA CONTÍNUA**

GRUPO
3

DISSEMINAÇÃO PRIMÁRIA CONTÍNUA

No interior:
controle químico do
vetor eficiente
(pouca disseminação
secundária)

HUANGLONGBING

epidemiologia

EXEMPLO TÍPICO DO TERCEIRO
GRUPO DE DOENÇAS:
**POLICÍCLICAS COM DISSEMINAÇÃO
PRIMÁRIA CONTÍNUA**

GRUPO
3

Pequena fonte de
inóculo externa
pode causar epidemia

DISSEMINAÇÃO PRIMÁRIA CONTÍNUA

HUANGLONGBING **epidemiologia**

EXEMPLO TÍPICO DO TERCEIRO
GRUPO DE DOENÇAS:
POLICÍCLICAS COM DISSEMINAÇÃO
PRIMÁRIA CONTÍNUA

GRUPO
3

Controle químico do
vetor deficiente
(disseminação
secundária presente)

HUANGLONGBING

epidemiologia

EXEMPLO TÍPICO DO TERCEIRO
GRUPO DE DOENÇAS:
**POLICÍCLICAS COM DISSEMINAÇÃO
PRIMÁRIA CONTÍNUA**

GRUPO
3

DISSEMINAÇÃO
PRIMÁRIA
CONTÍNUA

Pequenas propriedades
rodeadas por vizinhos
que não fazem o manejo
não têm viabilidade

DISSEMINAÇÃO
PRIMÁRIA
CONTÍNUA

Rod. Laurentino Ma

DISSEMINAÇÃO PRIMÁRIA CONTÍNUA

HUANGLONGBING

epidemiologia

EXEMPLO TÍPICO DO TERCEIRO GRUPO DE DOENÇAS:
POLICÍCLICAS COM DISSEMINAÇÃO PRIMÁRIA CONTÍNUA

GRUPO
3

Área central da fazenda:
fraca influência da disseminação primária
(todas as plantas da fazenda são tratadas com inseticida e plantas sintomáticas são eliminadas)

~~DISSEMINAÇÃO PRIMÁRIA CONTÍNUA~~

VSP-043

VSP-0

HUANGLONGBING

epidemiologia

GRUPO
3

Área central da fazenda:
pouca influência da
disseminação primária
(todas as plantas da fazenda
são tratadas com inseticida e
plantas sintomáticas são eliminadas)

~~DISSEMINAÇÃO
PRIMÁRIA
CONTÍNUA~~

HISTÓRIA DO CONTROLE

HUANGLONGBING

SOLUÇÃO DA CIÊNCIA: PRIMEIRA TENTATIVA

que não deu certo...

= CONTROLE I

AUBERT 1990
UNDP – FAO
p.133-144

MUDA SADIA
INSPEÇÃO & ERRADICAÇÃO
CONTROLE QUÍMICO DO VETOR

medidas a serem tomadas
em conjunto ao
nível da propriedade

HERANÇA DA VISÃO
TRADICIONAL DA
FITOPATOLOGIA

entre nós, aqueles
que acreditaram
nessa solução...

MUDA SADIA

INSPEÇÃO / ERRADICAÇÃO

6 a 12 vezes por ano

**CONTROLE QUÍMICO
DO VETOR**

foliar 12 vezes por ano +
sistêmico duas vezes por ano

**AUBERT 1990
UNDP – FAO
p.133-144.**

OU

MUDA SADIA

INSPEÇÃO / ERRADICAÇÃO

6 a 12 vezes por ano

**CONTROLE QUÍMICO
DO VETOR**

foliar 24 vezes por ano +
sistêmico 2 a 4 vezes por ano

**MAIS DO
MESMO**

**HISTÓRIA DO
CONTROLE**

HUANGLONGBING

CONTROLE: PRIMEIRA TENTATIVA

que não deu certo...

= CONTROLE I

**PORÉM, EM MUITAS SITUAÇÕES EM S. PAULO
(talvez na maioria delas)
MESMO A IMPLEMENTAÇÃO CUIDADOSA
DESSAS TRÊS RECOMENDAÇÕES
(ao nível de propriedade)
NÃO FOI SUFICIENTE
PARA CONTROLAR O HLB**

POR QUÊ?

**HISTÓRIA DO
CONTROLE**

HUANGLONGBING

CONTROLE: PRIMEIRA TENTATIVA

que não deu certo...

= CONTROLE I

MUDA SADIA

INSPEÇÃO / ERRADICAÇÃO

6 A 12 vezes po ano

**CONTROLE QUÍMICO
DO VETOR**

foliar **24** vezes por ano +
sistêmico **2 a 4** vezes por ano

medidas a serem implementadas ao
nível de propriedade

**EFICIENTES APENAS
CONTRA A
DISSEMINAÇÃO
SECUNDÁRIA**

**HERANÇA DA VISÃO
TRADICIONAL DA
FITOPATOLOGIA**

EPIDEMIOLOGIA DE DOENÇAS DE PLANTAS

CONCEITOS
TRADICIONAIS

DEFINIÇÃO E OBJETIVOS
PADRÕES REGULARES
DOIS GRUPOS EPIDEMIOLÓGICOS
PRINCÍPIO FUNDADOR
CONTROLE I

CONCEITOS
NOVOS

HLB DOS CITROS
O TERCEIRO GRUPO EPIDEMIOLÓGICO
CONTROLE II
OUTROS EXEMPLOS

**HISTÓRIA DO
CONTROLE**

HUANGLONGBING

SOLUÇÃO DA CIÊNCIA: SEGUNDA TENTATIVA

CONTROLE II

~~**PRINCÍPIO
FUNDADOR**~~

**GRUPO
3**

**DOENÇAS POLICÍCLICAS COM
DISSEMINAÇÃO PRIMÁRIA CONTÍNUA
NÃO SÃO CONTROLADAS
COM MEDIDAS TOMADAS SOMENTE
DENTRO DA PROPRIEDADE**

**MEDIDAS DE
CONTROLE
DEVEM SER
IMPLEMENTADAS
DENTRO E FORA
DA PROPRIEDADE**

**GRUPO
3**

**A INFECÇÃO PRIMÁRIA SÓ PODE SER
COMBATIDA COM EFICIÊNCIA POR MEIO DA
INSPEÇÃO/ERRADICAÇÃO E DO USO DE INSETICIDAS
EM TODA A REGIÃO CONSIDERADA**

A INFEÇÃO PRIMÁRIA SÓ PODE SER
COMBATIDA COM EFICIÊNCIA POR MEIO DA
INSPEÇÃO/ERRADICAÇÃO E USO DE INSETICIDAS
EM **TODA A REGIÃO** CONSIDERADA

HISTÓRIA DO
CONTROLE

GRUPO
3

ESTA SEGUNDA SOLUÇÃO É A
SOLUÇÃO ATUAL DA CIÊNCIA
PARA CONTROLAR O HLB

CONTROLE II

NO MÉDIO PRAZO ISSO É TUDO O QUE TEREMOS.
ESQUEÇAM A BALA DE PRATA.
ESQUEÇAM OS TRUQUES MÁGICOS.
ESQUEÇAM OS CAMINHOS FÁCEIS.
E, SOBRETUDO,
ESQUEÇAM OS COQUETÉIS MILAGROSOS.

MANEJO REGIONAL

CONTROLE II

GRUPO
3

MANEJO LOCAL

PRIMÁRIA

SECUNDÁRIA

SECUNDÁRIA

TEM EFEITO NA
DISSEMINAÇÃO
PRIMÁRIA E NA
SECUNDÁRIA

TEM EFEITO
SOMENTE NA
DISSEMINAÇÃO
SECUNDÁRIA

HERANÇA DA VISÃO
TRADICIONAL DA
FITOPATOLOGIA

**SÓ O BALDE
NÃO RESOLVE.
É PRECISO
TAMBÉM
UMA ROLHA!**

MEDIDAS DE
CONTROLE
DEVEM SER
IMPLEMENTADAS
DENTRO E FORA
DA PROPRIEDADE

GRUPO
3

ADVERTÊNCIA!

AQUELES QUE TÊM PROPRIEDADES
DE TAMANHO PEQUENO A MÉDIO
COM VIZINHOS DESLEIXADOS
ESTÃO GASTANDO DINHEIRO À TOA
PULVERIZANDO SEUS PRÓPRIOS POMARES.
SEU DESTINO SERÁ INFELIZMENTE...

**SÓ O MANEJO REGIONAL
PODERÁ SALVÁ-LOS!**

ESTRATÉGIA
DO BALDE E
DA ROLHA

MANEJO
REGIONAL?
CONTROLE II

**É EFICIENTE?
É POSSÍVEL?**

AS BASES EXPERIMENTAIS PARA O MANEJO BEM SUCEDIDO DO HLB

CONTROLE II

GRUPO
3

An International Journal of Applied Plant Pathology

plant disease

97:789-796
2013

Editor-in-Chief: Mark L. Gleason

Published by The American Phytopathological Society

[Home](#) > [Plant Disease](#) > [Table of Contents](#) > [Abstract](#)

[Previous Article](#) | [Next Article](#)

June 2013, Volume 97, Number 6

Pages 789-796

<http://dx.doi.org/10.1094/PDIS-03-12-0314-RE>

SEPARATA GRÁTIS:
abergami@usp.br

Research

Efficacy of Area-Wide Inoculum Reduction and Vector Control on Temporal Progress of Huanglongbing in Young Sweet Orange Plantings

Renato B. Bassanezi, **Luiz H. Montesino**, and **Nelson Gimenes-Fernandes**, Departamento Científico, Fundo de Defesa da Citricultura, 14807-040, Araraquara, SP, Brazil; **Pedro T. Yamamoto**, Departamento de Entomologia e Acarologia, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, 13418-900, Piracicaba, SP, Brazil; **Tim R. Gottwald**, United States Department of Agriculture–Agricultural Research Service, USHRL, Fort Pierce, FL 34945; and **Lilian Amorim** and **Armando Bergamin Filho**, Departamento de Fitopatologia e Nematologia, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, 13418-900, Piracicaba, SP, Brazil

PDF Print (643 KB) | PDF with Links (575 KB)

37 km

BAIXA pressão externa de HLB:
No raio de 2 km = 55,6% da área com manejo
e 0,2% sem manejo

ALTA pressão externa de HLB:
No raio de 2 km = 0,7% da área com manejo
e 2,9% sem manejo

BASSANEZI et al. 2013
Plant Disease 97:789-796

A

BASSANEZI et al. 2013
Plant Disease 97:789-796

EXPERIMENTO 1

- citros com manejo
- ▲ citros sem manejo

Exp.
plots

1 km

B

BASSANEZI et al. 2013
Plant Disease 97:789-796

EXPERIMENTO 2

- citros com manejo
- ▲ citros sem manejo

Exp.
plots

1 km

RESULTADOS

BASSANEZI et al. 2013
Plant Disease 97:789-796

HLB %

COM controle LOCAL
COM controle REGIONAL

Pomares vizinhos
sem manejo de HLB

EXPERIMENTO 2 SEM MANEJO REGIONAL

Novembro/2010

76,9%

sem controle local do vetor

com controle local do vetor*

53,1%

BASSANEZI et al. 2013
Plant Disease 97:789-796

* duas aplicações de inseticidas sistêmicos + 18 aplicações quinzenais de inseticidas foliares por ano

Pomares vizinhos
sem manejo de HLB

76,9%

sem controle local do vetor

com controle local do vetor*

53,1%

**EXPERIMENTO 2
SEM MANEJO REGIONAL**

Novembro/2010

6,2%

4,6%

**EXPERIMENTO 1
COM MANEJO REGIONAL**

BASSANEZI et al. 2013
Plant Disease 97:789-796

* duas aplicações de inseticidas sistêmicos + 18 aplicações quinzenais de inseticidas foliares por ano

CONTROLE II

GRUPO

3

EXPERIMENTO 1 COM MANEJO REGIONAL

Novembro/2010

sem controle local do vetor

6,2%

com controle local do vetor

4,6%

BASSANEZI et al. 2013
Plant Disease 97:789-796

EXPERIMENTO 2 SEM MANEJO REGIONAL

Novembro/2010

sem controle local do vetor

76,9%

com controle local do vetor

53,1%

VETORES INFECTIVOS

DESAFIOS PARA O MANEJO

VETORES INFECTIVOS

DISSEMINAÇÃO PRIMÁRIA CONTÍNUA

**DOENÇA POLICÍCLICA COM
DISSEMINAÇÃO PRIMÁRIA CONTÍNUA**

Controle químico do
vetor não é eficiente
para controlar a
disseminação primária

GRUPO

3

**COMO RESOLVER
ESSE PROBLEMA
NA PRÁTICA?**

A EXPERIÊNCIA DA CAMBUHY

MANEJO REGIONAL

~~PRINCÍPIO FUNDADOR~~

INFORMAÇÕES DE TACHIBANA (2015)

MATÃO-SP

CONTROLE II

MEDIDAS DE CONTROLE DEVEM SER IMPLEMENTADAS DENTRO E FORA DA PROPRIEDADE

GRUPO 3

MANEJO REGIONAL

ALÉM DO MANEJO INTERNO
MANEJO EXTERNO
300 HA AO REDOR DA
FAZENDA A PARTIR
DE 2010-2011

RAIO = 4 KM

- MONITORAMENTO SEMANAL DO VETOR
- PULVERIZAÇÃO QUANDO VETOR É DETECTADO
- PULVERIZAÇÃO AÉREA 4-5 VEZES/ANO
- ERRADICAÇÃO NOS VIZINHOS

A EXPERIÊNCIA DA CAMBUHY

MANEJO REGIONAL

A EXPERIÊNCIA DA CAMBUHY

MANEJO REGIONAL

MEDIDAS DE CONTROLE DEVEM SER IMPLEMENTADAS DENTRO E FORA DA PROPRIEDADE

GRUPO 3

CONTROLE II

POSSÍVEL PARA GRANDES PRODUTORES!

MANEJO REGIONAL DE UM SÓ PRODUTOR!

SEGREDO DO MANEJO REGIONAL: IMPEDIR QUE OS VETORES DEIXEM OS POMARES

A COOPERAÇÃO ENTRE PEQUENOS PRODUTORES É MUITO DIFÍCIL!

AÇÃO DO GOVERNO É ESSENCIAL PARA O MANEJO EM REGIÕES DE PEQUENOS PRODUTORES

É PRÓPRIO DOS GOVERNOS ATUAIS NÃO AGIR

CONTROLE II

Um produtor pode ser muito diligente em controlar o vetor e em erradicar as plantas sintomáticas de seu pomar, mas se os vizinhos não aplicarem manejo igualmente diligente, seu pomar será inundado pela **DISSEMINAÇÃO PRIMÁRIA** originada nos pomares vizinhos

GRUPO
3

ESTA CONCLUSÃO É VÁLIDA PARA TODAS AS DOENÇAS DO TERCEIRO GRUPO, OU SEJA, TODAS AS **DOENÇAS POLICÍCLICAS COM DISSEMINAÇÃO PRIMÁRIA CONTÍNUA**

CONTROLE I

**DOENÇAS DE JUROS SIMPLES
OU MONOCÍCLICAS**

**Tratamento do solo
Rotação de culturas**

GRUPO

1

**DOENÇAS DE JUROS COMPOSTOS
OU POLICÍCLICAS**

**Variedades resistentes
Controle químico**

GRUPO

2

GRUPO

3

CONTROLE II

GRUPO

3

HUANGLONGBING DOS CITROS

**MEDIDAS DE
CONTROLE
DEVEM SER
IMPLEMENTADAS
DENTRO E FORA
DA PROPRIEDADE**

GRUPO

3

Variedades resistentes
(se houver)
Controle químico do vetor
(em toda a região)
Eliminação do inóculo
(em toda a região)

**EM TODA A
REGIÃO**

EPIDEMIOLOGIA DE DOENÇAS DE PLANTAS

**CONCEITOS
TRADICIONAIS**

**DEFINIÇÃO E OBJETIVOS
PADRÕES REGULARES
DOIS GRUPOS EPIDEMIOLÓGICOS
PRINCÍPIO FUNDADOR
CONTROLE I**

**CONCEITOS
NOVOS**

**HLB DOS CITROS
O TERCEIRO GRUPO EPIDEMIOLÓGICO
CONTROLE II
OUTROS EXEMPLOS**

OUTROS EXEMPLOS

GRUPO
3

MAIS COMPLICADOS QUE
O HUANGLONGBING

BEGOMOVIROSES

OUTROS EXEMPLOS

GRUPO
3

MAIS COMPLICADOS QUE
O HUANGLONGBING

CRINIVIROSES

Partículas do vírus

Bemisia tabaci

OUTROS EXEMPLOS

GRUPO
3

MAIS COMPLICADOS QUE
O HUANGLONGBING

TOSPOVIROSES

Partículas do vírus

Vetor: tripses

AS BASES TEÓRICAS PARA O MANEJO BEM SUCEDIDO DO GRUPO 3

SEPARATA GRÁTIS:
abergami@usp.br

Bergamin Filho, Inoue-Nagata, Bassanezi, Belasque Jr.,
Amorim, Macedo, Barbosa, Willocquet, Savary

THE IMPORTANCE OF PRIMARY INOCULUM AND AREA-WIDE MANAGEMENT TO CROP HEALTHY AND FOOD SECURITY

GRUPO
3

**8:221-238
2016**

Springer

APOIO

LEITURA RECOMENDADA

Bergamin & Amorim (2011)
Epidemiologia de doenças de plantas
Manual de Fitopatologia, quarta edição (volume 1)
2011 (pp. 101-118)

**TEMA
GERAL**

Bassanezi et al. (2016)
Doenças dos citros: Huanglongbing
Manual de Fitopatologia, quinta edição (volume 2)
2016 (pp. 282-285)

+

Os dois artigos com separata grátis
Plant Disease 97:789-796 (2013)
Food Security 8:221-238 (2016)

SEPARATA GRÁTIS:
abergami@usp.br

GRUPO

3

PERGUNTAS?