9ª Lista de exercícios - Temperatura, calor e primeira lei da termodinâmica

24/11/2016

Cap. 18 Tipler e Mosca, Vol. 1, 4a. edição — Temperatura e gases ideais

2. Como determinar se dois corpos estão ou não em equilíbrio térmico se for impossível pôr um em contato com o outro?
19. Um termistor é um dispositivo de estado sólido cuja resistência varia significativamente com a temperatura, segundo a expressão $R = R_0 \exp(B/T)$, com R em ohms (Ω), T em kelvins e duas constantes R_0 e B . Para determinar essas constantes, mede-se R em dois pontos de calibração, por exemplo, no ponto de gelo e no de vapor.
 - a) Se $R = 7360$ ohm no ponto do gelo e $R = 153$ ohm no de vapor, calcule R_0 e B .
 - b) Qual a resistência do termistor na temperatura $t = 98.6^\circ\text{F}$?
 - c) Qual a taxa de variação dR/dT da resistência com a temperatura no ponto do gelo e no ponto do vapor?
 - d) Em qual temperatura é o termistor mais sensível?
25. Com uma bomba de difusão a óleo, consegue chegar-se a um vácuo de 1×10^{-8} torr. Quantas moléculas há em um 1 cm^3 de um gás sob essa pressão à temperatura de 300 K ?
31. Um pneu de automóvel está cheio até a pressão manométrica (isto é, diferença entre a pressão no pneu e na atmosfera) de 200 kPa na temperatura de 20°C . Depois de o carro rodar a alta velocidade, a temperatura nos pneus é 50°C .
 - a) Admitindo que a o volume do pneu não se altere e que o comportamento do ar seja de gás ideal, calcule a nova pressão manométrica.
 - b) Refaça o item anterior admitindo que o volume do pneu cresce 10% .
32. Um mergulhador está a 40 m de profundidade num lago, a 5°C . As bolhas de ar que ele liberta têm o volume de 15 cm^3 . As bolhas sobem até a superfície, onde a temperatura é 25°C . Qual o volume das bolhas no instante em que emergem (lembre-se de que a pressão nas bolhas também muda durante a subida)?

53. Certo ou errado: se a pressão de um gás aumenta, sua temperatura também aumenta.
76. Um cilindro de 2.4 m de altura está cheio com 0.1 mol de gás ideal nas condições normais de temperatura e pressão (figura abaixo), fechado acima por um pistão de 1.4 kg. Deixa-se o pistão descer até ficar em equilíbrio.

- a) Calcule a altura em que o pistão fica. Admita que a temperatura do gás não se altera à medida que o pistão desce.
- b) O pistão é agora empurrado ligeiramente para baixo, além da posição de equilíbrio, e depois libertado. Admita que a temperatura do gás permaneça constante para determinar a frequência de vibração do pistão.

Cap. 19 Tipler e Mosca, Vol. 1, 4a. edição — Calor, primeira lei, processos em gases ideais

3. O calor específico do alumínio é mais do que o dobro do calor específico do cobre. Numa certa experiência, amostras de cobre e de alumínio, com as mesmas massas, ambas a 20°C , são lançadas num calorímetro com água a 40°C . Quando se atinge o equilíbrio térmico
- a) O alumínio está em temperatura mais alta do que o cobre.
- b) O alumínio absorveu menos energia do que o cobre.
- c) O alumínio absorveu meias energia do que o cobre.
- d) As afirmações (a) e (c) estão corretas.
7. Que quantidade de calor deve ser removida para que 100 g de vapor de água, a 150°C , sejam resfriados e congelados para formar 100 g de gelo a 0°C ? O calor específico do vapor de água é 2.01 kJ/kgK .
10. Um projétil de chumbo, com 30 g, inicialmente a 20°C , é disparado contra o bloco de um pêndulo balístico e fica nele encravado. Vamos admitir que toda a energia cinética do projétil seja convertida em energia térmica do próprio projétil. Se a velocidade do projétil for de 420 m/s, qual a sua temperatura imediatamente após chegar ao repouso.
20. Quer-se determinar o calor específico de um bloco de material de 100 kg. O bloco é colocado num calorímetro de cobre (25 g) que contém 60 g de água. Inicialmente o sistema está em equilíbrio a 20°C . Depois, 120 mL de água, a 80°C , juntam-se

ao calorímetro com o bloco. Atingido o equilíbrio térmico, a temperatura da água é 54°C . Determine o calor específico do material do bloco.

25. Um sistema pode absorver calor sem que sua energia interna se altere?
26. Na equação $Q = \Delta U + W$, as grandezas Q e W representam
- O calor absorvido pelo sistema e o trabalho feito pelo sistema.
 - O calor absorvido pelo sistema e o trabalho feito sobre o sistema.
 - O calor cedido pelo sistema e o trabalho efetuado pelo o sistema.
 - O calor absorvido pelo sistema e o trabalho efetuado sobre o sistema.
28. Um gás se expande e efetua 800 kJ de trabalho. Ao mesmo tempo, absorve 400 kcal de calor. Qual a variação de sua energia interna?
34. Num dia frio, as mãos são aquecidas esfregando-se uma contra a outra.
- Admita que o coeficiente de atrito entre as superfícies das mãos seja 0.5 , que a força normal entre as mãos seja 35 N , e que a velocidade média de esfregamento de uma contra a outra seja de 35 cm/s . Qual a taxa de geração de calor?
 - Vamos admitir, também, que a massa de cada mão seja de 350 g , que o calor específico seja da ordem de 4 kJ/kg K e que todo o calor gerado contribua para a elevação da temperatura das mãos. Durante quanto tempo as mãos devem ser esfregadas para se conseguir uma elevação de 5°C na sua temperatura?
36. Um gás ideal, sob pressão de 1 atm , a 300 K , está confinado numa metade de um vaso termicamente isolado, separada da outra metade (completamente vazia) por uma fina membrana. A membrana é então rompida e se espera que o equilíbrio se re-estabeleça. No equilíbrio, qual das seguintes respostas está correta?
- A pressão é de 0.5 atm e a temperatura, de 150 K ;
 - A pressão é de 1 atm e a temperatura, de 150 K ;
 - A pressão é de 0.5 atm e a temperatura, de 300 K ;
 - Nenhuma das acima.
38. Um gás passa reversivelmente do estado A para o estado C (figura abaixo). O trabalho efetuado pelo gás é

- Maior no processo $A \rightarrow B \rightarrow C$;

- b) Menor no processo $A \rightarrow C$;
 - c) Maior no processo $A \rightarrow D \rightarrow C$;
 - d) O mesmo nos três processos.
41. Um mol de gás tem inicialmente $P_1 = 3 \text{ atm}$, $V_1 = 1 \text{ L}$ e energia interna $U_1 = 456 \text{ J}$. Depois de um processo térmico, e passa a ter $P_2 = 2 \text{ atm}$, $V_2 = 3 \text{ L}$ e energia interna $U_2 = 912 \text{ J}$. O processo é descrito da seguinte forma. O gás se expande isotermicamente até atingir o volume de 3 L e a pressão de 1 atm . Depois é aquecido a volume constante até sua pressão ser de 2 atm .
- a) Mostre o processo em diagrama PV e calcule o trabalho efetuado pelo gás.
 - b) Calcule o calor trocado durante o processo.
46. Um gás ideal, inicialmente a 20°C e 200 kPa , tem 4 L de volume. O gás sofre expansão isotérmica e quase-estática até chegar a 100 kPa . Calcule
- a) O trabalho de expansão do gás;
 - b) O calor cedido para o gás durante a expansão.
56. Quando um gás ideal passa por processo adiabático
- a) Não há trabalho sobre ele;
 - b) O sistema não recebe calor;
 - c) A energia interna permanece constante;
 - d) O calor recebido pelo sistema é igual ao trabalho por ele feito.
57. Um mol de gás ideal ($\gamma = 5/3$) expande-se adiabática e quase-esticamente da pressão de 10 atm e da temperatura de 0°C até a pressão final de 2 atm . Calcule
- a) Os volumes inicial e final;
 - b) A temperatura final;
 - c) O trabalho feito pelo gás.
64. Um gás ideal, no volume V_1 e na pressão P_1 expande-se adiabática e quase-esticamente até o volume V_2 e a pressão P_2 . Calcule o trabalho, via integração de $P dV$. Mostre que o resultado é igual a

$$\frac{P_1 V_1 - P_2 V_2}{\gamma - 1},$$

onde $\gamma = C_P/C_V$.

68. No ponto D da figura abaixo, a pressão e a temperatura de 2 moles de um gás ideal monoatômico são 2 atm e 360 K , respectivamente. O volume do gás no ponto B é três vezes maior do que o volume no ponto D e sua pressão é o dobro da

pressão no ponto C . Os processos AB e CD são adiabáticos. O gás efetua o ciclo $D \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$. Calcule o trabalho efetuado e o calor absorvido pelo gás em cada um dos quatro processos.

71. Um gás ideal com n moles na pressão P_1 , com volume V_1 e na temperatura T_q se expande isotermicamente até a pressão ser P_2 e o volume V_2 . Depois, expande-se adiabaticamente até a temperatura cair a T_f , a pressão ser P_3 e o volume, V_3 . Em seguida, é comprimido isotermicamente até a pressão ser P_4 e o volume, V_4 . Este último se relaciona com o volume V_1 pela igualdade

$$T_f V_4^{\gamma-1} = T_q V_1^{\gamma-1}.$$

O gás é então comprimido adiabaticamente até voltar ao estado inicial para definir o *ciclo de Carnot*.

- Trace o gráfico PV desse ciclo. Cada etapa é quase-estática;
- Mostre que o calor Q_f absorvido durante a expansão isotérmica é

$$Q_f = nRT_q \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right).$$

- Mostre que o calor Q_f cedido durante a compressão isotérmica é

$$Q_f = nRT_f \ln \left(\frac{V_3}{V_4} \right).$$

- Sabendo que $TV^{\gamma-1}$ é constante numa expansão adiabática, mostrar que

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}.$$

- O rendimento de um ciclo de Carnot é a razão entre o trabalho efetuado e o calor absorvido Q_q . Com ajuda da primeira lei da termodinâmica, mostre que o rendimento é

$$\eta = 1 - \frac{Q_f}{Q_q}.$$

f) Com os resultados obtidos, mostre que

$$\frac{Q_f}{Q_q} = \frac{T_f}{T_q}.$$

102. Um cilindro vertical, termicamente isolado, está dividido em duas seções por um pistão móvel de massa m . No estado inicial o pistão é mantido em repouso. A parte superior do cilindro está vazia, e a inferior contém 1 mol de gás ideal diatômico a 300 K. Depois de o pistão ficar livre e de o sistema atingir o equilíbrio, o volume ocupado pelo gás fica dividido pela metade. Calcule a temperatura final do gás.