Instituto de Física USP

Física Moderna Aula 24

Professora: Mazé Bechara

Aula 24 – A equação de Schroedinger para estados estacionários. Aplicação.

1. Completando as propriedades das funções de onda dada a interpretação probabilística. **Aplicação 1: Interpretações da Mecânica Quântica a partir de funções de onda dadas.**
2. **Aplicação 2: os auto estados de energia de uma partícula na “caixa” ou no “poço” de potencial unidimensional:**
 1. as posições e energias dos estados ligados (trajetórias finitas) e não ligados (trajetória infinita) **na física clássica.**

Propriedades das funções de onda decorrentes da interpretação probabilística

1. As **funções de onda** devem ser: **unívocas**, porque a probabilidade (módulo ao quadrado das funções) em cada ponto não pode ter valores diferentes; **contínuas**, porque as probabilidades não podem ter valores indefinidos em nenhum ponto; **finitas em todos os pontos** do espaço, porque probabilidades são finitas.
2. As **funções de onda de estados ligados** (que descrevem partículas que ocupam região finita do espaço) devem ser **normalizadas**, ou seja:

$$\iiint |\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV = 1 \Rightarrow \Psi(\pm\infty, t) = 0$$

No caso de **estados não ligados**, nos quais a partícula pode ir a posições no infinito (infinitamente longe da origem do potencial de interação), **a função de onda deve ser finita em qualquer ponto. A possibilidade de ocupar um espaço infinito torna a função de onda não normalizável.** O que se impõe, nestas situações físicas, é a **conservação da partícula (a ser discutido posteriormente como se faz).**

Propriedades decorrentes Da Interpretação Probabilística

3. As **derivadas espaciais das funções de onda** também devem ser: **unívocas, contínuas e finitas em todo o espaço**. As derivadas estão associadas aos valores das componentes do momento linear p no espaço das funções de onda espaço-temporal, e devem ser unívocos e finitos.

☠ *Cuidado com o caso particular de energia potencial "infinita" em alguns pontos ou regiões do espaço, aproximação no caso de energias potenciais muito maiores do que a energia total, e usada como boa aproximação da realidade. Nestes casos não há continuidade das derivadas das funções de onda. Mas há continuidade das funções de onda!*

Interpretações na mecânica quântica

Uma partícula de massa m tem funções de onda abaixo: Questão Q6 do Guia ao tópico IV

$$\Psi(0 \leq x \leq a, t) = A \sin \frac{n\pi x}{a} \exp\left(-\frac{i\hbar\pi^2}{2ma^2} n^2 t\right) \quad \Psi(x \leq 0 \text{ ou } x \geq a, t) = 0$$

- Determine a constante A que permite tais funções representarem funções de onda na mecânica quântica. Justifique.
- Quais as posições mais prováveis da partícula no estado com $n=1$? E com $n=2$? E as menos prováveis? O que você entende por "posição mais provável" e "posição menos provável" em termos de medidas? Justifique.
- Determine a probabilidade da partícula ser encontrada a um quarto do comprimento da caixa de uma das paredes para qualquer estado n . Mostre no gráfico pertinente, nos estados $n=1$ e $n=2$, o que representa atal probabilidade. Justifique. Sua resposta depende da definição da origem do eixo? Justifique.
- O momento linear é uma constante no movimento da partícula? Justifique formalmente. Se for constante determine os valores do momento linear; se não for constante determine o valor médio. Justifique.
- É o quadrado do momento linear uma constante de movimento? Se for, determine o seu valor. Se não for, determine o valor média.
- Não são contraditórias as respostas aos dois itens anteriores?
- O que é possível prever, usando a função de onda espaço temporal, sobre o resultado de uma única medida das seguintes grandezas físicas da partícula: f_1 posição; f_2 energia; f_3 momento linear? Justifique suas respostas.
- Responda o mesmo que no item anterior no caso de cem (100) medidas. Justifique.
- O que seria mostrar formalmente que as funções de onda dadas são compatíveis com o princípio de incerteza? Demonstre em casa!

A equação de Schroedinger independente do tempo e os estados estacionários

$$\left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \vec{\nabla}^2 + U(\vec{r}) \right\} \varphi(\vec{r}) = E \varphi(\vec{r})$$

$$\left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + U(x) \right\} \varphi(x) = E \varphi(x)$$

$$\left\{ i\hbar \frac{d}{dt} \right\} T(t) = E T(t)$$

$$\frac{dT}{T} = -i \frac{E}{\hbar} dt \rightarrow \int_{T_0}^T \frac{dT}{T} = \int_0^t -i \frac{E}{\hbar} dt \rightarrow T(t) = e^{-i \frac{E}{\hbar} t}$$

APLICAÇÃO

Fig. 6-1 (a) Um elétron que se encontra na região entre as duas grades G não experimenta nenhuma força, já que as grades estão aterradas. Nas regiões entre as grades G e os eletrodos C , porém, existe um campo elétrico cuja intensidade depende do valor da tensão V . (b) Quando V é pequena, o gráfico da energia potencial do elétron em função de x apresenta “paredes” pequenas e com uma inclinação suave. (c) Quando V é grande, as paredes são altas e íngremes, tornando-se intransponíveis quando $V \rightarrow \infty$.

“Poço” de potencial finito unidimensional