Radioisótopos

FÍSICA DAS RADIAÇÕES I

Paulo R. Costa

GRUPO DE
**DOSIMETRIA
DAS RADIAÇÕES**
e FÍSICA MÉDICA

IFUSP - Instituto de Física da USP

Sumário

IFUSP - Instituto de Física da USP

- Introdução
- Isótopos e radioisótopos
- Um pouco de história
- Produção artificial de radioisótopos
- Meia-vida física, biológica e efetiva
- Contaminação ambiental

Introdução

GRUPO DE
**DOSIMETRIA
DAS RADIAÇÕES**
e FÍSICA MÉDICA

IFUSP - Instituto de Física da USP

Aplicações dos Radioisótopos

IFUSP - Instituto de Física da USP

MEDICINA

- **IMAGENS**
- **RADIOTERAPIA**
- **BRAQUITERAPIA**
- **IMUNOTERAPIA**
- **TERAPIA COM FEIXES IÔNICOS**

INDÚSTRIA

- **INSPEÇÃO DE NÍVEIS**
- **GAMAGRAFIA**
- **IRRADIAÇÃO DE ALIMENTOS**

OUTRAS APLICAÇÕES

- **DATAÇÃO**
- **CIÊNCIA FORENSE**
- **OBRAS DE ARTE**

Isótopos e radioisótopos

GRUPO DE
DOSIMETRIA
DAS RADIAÇÕES
e FÍSICA MÉDICA

IFUSP - Instituto de Física da USP

Isótopos e radioisótopos

- Classificação dos elementos

A = número de massa (prótons + nêutrons)

Z = número de prótons ou número atômico

N = número de nêutrons

118 elementos
Químicos
(4 descobertos
recentemente)

O que diferencia um átomo de outro?

TABELA PERIÓDICA () = ESTIMATIVA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 H HIDROGÊNIO 1.00794																	2 He HÉLIO 4.002602
3 Li LÍTIO 6.941	4 Be BERILIO 9.012182	FAMÍLIA										5 B BORO 10.811	6 C CARBONO 12.011	7 N NITROGÊNIO 14.007	8 O OXIGÊNIO 15.9994	9 F FLUOR 18.9984032	10 Ne NEÔNIO 20.1797
11 Na SÓDIO 22.989770	12 Mg MAGNÉSIO 24.3050	☐ 1 M ☐ 2 M ☐ 3 a 12 M										13 Al ALUMÍNIO 26.9815386	14 Si SILÍCIO 28.0855836	15 P FÓSFORO 30.973762	16 S ENXOFRE 32.065	17 Cl CLORO 35.453	18 Ar ARGÔNIO 39.948
19 K POTÁSSIO 39.0983	20 Ca CÁLCIO 40.078	21 Sc ESCÂNDIO 44.955910	22 Ti TÍTÂNIO 47.867											34 Se SELÊNIO 78.96	35 Br BROMO 79.904	36 Kr CRÍPTÔNIO 83.798	
37 Rb RUBÍDIO 85.4678	38 Sr ESTRÔNCIO 87.62	39 Y ÍTRIO 88.90585	40 Zr ZIRCÔNIO 91.224											52 Te TELÚRIO 127.60	53 I IODO 126.90447	54 Xe XENÔNIO 131.293	
55 Cs CÉSIO 132.90545	56 Ba BÁRIO 137.327	Lantanídeos												72 Hf HÁFNIO 178.49	84 Po PÓLÔNIO 209	85 At ASTATO 209.9871	86 Rn RADÔNIO 222.0176
87 Fr FRÂNCÍO 223.0197	88 Ra RÁDIO 226.0254	Actinídeos												104 Rf RIFÉRMIO 261.1088	105 Db DUBNÍO 262.1141	106 Sg SEABÓRGIO 266.1219	107 Bh BOHRÍO 264.12

57 La LANTÂNIO 138.9055	58 Ce CÉRIO 140.116	59 Pr PRASEODÍMIO 140.90765	60 Nd NEODÍMIO 144.24	61 Pm PROMÉCIO 144.9127	62 Sm SAMÁRIO 150.36	63 Eu EUROPIO 151.964	64 Gd GADOLÍNIO 157.25	65 Tb TÉRBIO 158.92534	66 Dy DISPRÓDIO 162.500	67 Ho HÓLMIO 164.93032	68 Er ÉRBIO 167.259	69 Tm TÚLIO 168.93421	70 Yb ÍTERBIO 173.04	71 Lu LUTÉCIO 174.967
89 Ac ACTÍNIO 227.0277	90 Th TÓRIO 232.0381	91 Pa PROTACTÍNIO 231.03588	92 U URÂNIO 238.02891	93 Np NEPTÚNIO 237.0482	94 Pu PLUTÔNIO 244.0642	95 Am AMERICÍO 243.0614	96 Cm CÚRIO 247.0704	97 Bk BERQUÉLIO 247.0703	98 Cf CALIFÓRNIO 251.0796	99 Es EINSTEÍNIO 252.0830	100 Fm FÉRMIO 257.0951	101 Md MENDELEVÍO 258.0984	102 No NOBÉLIO 259.1010	103 Lr LAURÊNCIO 262.1097

IUPAC Periodic Table of the Elements

1 H hydrogen 1.008 [1.0078, 1.0082]																	2 He helium 4.0026
3 Li lithium 6.94 [6.938, 6.997]	4 Be beryllium 9.0122											13 B boron 10.81 [10.806, 10.821]	14 C carbon 12.011 [12.009, 12.012]	15 N nitrogen 14.007 [14.006, 14.008]	16 O oxygen 15.999 [15.998, 16.000]	17 F fluorine 18.998 [18.998, 18.998]	18 Ne neon 20.180
11 Na sodium 22.990	12 Mg magnesium 24.305 [24.304, 24.307]											13 Al aluminium 26.982	14 Si silicon 28.086 [28.084, 28.088]	15 P phosphorus 30.974	16 S sulfur 32.06 [32.059, 32.071]	17 Cl chlorine 35.45 [35.446, 35.457]	18 Ar argon 39.948
19 K potassium 39.098	20 Ca calcium 40.078(4)	21 Sc scandium 44.956	22 Ti titanium 47.867	23 V vanadium 50.942	24 Cr chromium 51.996	25 Mn manganese 54.938	26 Fe iron 55.845(2)	27 Co cobalt 58.933	28 Ni nickel 58.693	29 Cu copper 63.546(3)	30 Zn zinc 65.38(2)	31 Ga gallium 69.723	32 Ge germanium 72.630(8)	33 As arsenic 74.922	34 Se selenium 78.971(8)	35 Br bromine 79.904 [79.901, 79.907]	36 Kr krypton 83.798(2)
37 Rb rubidium 85.468	38 Sr strontium 87.62	39 Y yttrium 88.906	40 Zr zirconium 91.224(2)	41 Nb niobium 92.906	42 Mo molybdenum 95.95	43 Tc technetium	44 Ru ruthenium 101.07(2)	45 Rh rhodium 102.91	46 Pd palladium 106.42	47 Ag silver 107.87	48 Cd cadmium 112.41	49 In indium 114.82	50 Sn tin 118.71	51 Sb antimony 121.76	52 Te tellurium 127.60(3)	53 I iodine 126.90	54 Xe xenon 131.29
55 Cs caesium 132.91	56 Ba barium 137.33	57-71 lanthanoids	72 Hf hafnium 178.49(2)	73 Ta tantalum 180.95	74 W tungsten 183.84	75 Re rhenium 186.21	76 Os osmium 190.23(3)	77 Ir iridium 192.22	78 Pt platinum 195.08	79 Au gold 196.97	80 Hg mercury 200.59 [200.59, 200.59]	81 Tl thallium 204.38 [204.38, 204.38]	82 Pb lead 207.2	83 Bi bismuth 208.98 [208.98, 208.98]	84 Po polonium	85 At astatine	86 Rn radon
87 Fr francium	88 Ra radium	89-103 actinoids	104 Rf rutherfordium	105 Db dubnium	106 Sg seaborgium	107 Bh bohrium	108 Hs hassium	109 Mt meitnerium	110 Ds darmstadtium	111 Rg roentgenium	112 Cn copernicium	113 Nh nihonium	114 Fl flerovium	115 Mc moscovium	116 Lv livermorium	117 Ts tennessine	118 Og oganesson

Key:
atomic number
Symbol
name
conventional atomic weight
standard atomic weight

57 La lanthanum 138.91	58 Ce cerium 140.12	59 Pr praseodymium 140.91	60 Nd neodymium 144.24	61 Pm promethium	62 Sm samarium 150.36(2)	63 Eu europium 151.96	64 Gd gadolinium 157.25(3)	65 Tb terbium 158.93	66 Dy dysprosium 162.50	67 Ho holmium 164.93	68 Er erbium 167.26	69 Tm thulium 168.93	70 Yb ytterbium 173.05	71 Lu lutetium 174.97
89 Ac actinium	90 Th thorium 232.04	91 Pa protactinium 231.04	92 U uranium 238.03	93 Np neptunium	94 Pu plutonium	95 Am americium	96 Cm curium	97 Bk berkelium	98 Cf californium	99 Es einsteinium	100 Fm fermium	101 Md mendelevium	102 No nobelium	103 Lr lawrencium

For notes and updates to this table, see www.iupac.org. This version is dated 28 November 2016. Copyright © 2016 IUPAC, the International Union of Pure and Applied Chemistry.

ISÓTOPOS: mesmo número de **prótons** (define o elemento)

ISÓTONOS : possuem mesmo número de **nêutrons**

ISÓBAROS: possuem mesmo número de massa (**prótons + nêutrons**)

IUPAC Periodic Table of the Elements

INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED CHEMISTRY

For details and conditions for use, see our website: <http://www.chemsoc.org>. This version is dated 13 November 2016. Copyright © 2016 IUPAC, the International Union of Pure and Applied Chemists.

○ Isótopos ? □ Isóbaros ? △ Isótonos ?

Isótopos e radioisótopos

- O núcleo atômico

$Z \Rightarrow$ número de prótons

$N \Rightarrow$ número de nêutrons

$A \Rightarrow$ número de massa ($Z + N$)

- Nuclídeos
 - Identificado por A
- Isótopos
 - Estáveis
 - Instáveis

Fonte: Magill, J; Galy, J Radioactivity
Radionuclides Radiation, 2005

Isótopos e radioisótopos

- Elementos químicos
 - Isótonos
 - Isóbaros
 - Isótopos
 - Radioisótopos
(ou Radionuclídeos)
- Decaimento nuclear

$$A = \frac{dN}{dt} = \lambda N \Rightarrow A = A_0 e^{-\lambda t}$$

- Becquerel – desintegrações/s (dps)
- Curie – $3,7 \times 10^{10}$ dps

Fonte: Mundo Educação

Isótopos e radioisótopos

- Modelo semiclássico do átomo
 - núcleo é constituído de prótons e nêutrons
 - mantidos juntos pela *força nuclear*
 - uma força atrativa intensa de curto alcance
 - configuração desses nucleons determina o estado energético do núcleo
- Radioisótopo
 - configuração dos nucleons → núcleo em *estado instável*
 - essa energia em excesso deve ser emitida
 - *decaimento nuclear* ou *desintegração radioativa*.
- Emissão de energia
 - regras de seleção → vão determinar o seu *modo* de decaimento
 - núcleo radioativo inicial → *nuclídeo pai*
 - núcleo para o qual ele decai → *nuclídeo filho*
- Radionuclídeos naturais
 - majoritariamente na extremidade dos elementos mais pesados
 - todos os núcleos com número atômico Z superior a 82 (chumbo)
 - são radioativos
 - se desintegram até chegarem a um núcleo estável do chumbo

Isótopos e radioisótopos

isótopos estáveis

Tabelas de isótopos

- TABELA

- Exemplos:

- <http://nucleardata.nuclear.lu.se/toi/>
- <http://atom.kaeri.re.kr/>
- <http://www-nds.iaea.org/relnsd/vchart/>
- [http://xdb.lbl.gov/Section1/Periodic Table/X-ray Elements.html](http://xdb.lbl.gov/Section1/Periodic_Table/X-ray_Elements.html)

Um pouco de história

GRUPO DE
DOSIMETRIA
DAS RADIAÇÕES
e FÍSICA MÉDICA

IFUSP - Instituto de Física da USP

Origens e descoberta

- Os elementos gregos e o átomo indivisível

Origens e descoberta

*idéia dos quatro elementos
estava errada*

Atomismo
Moderno
(séc. XVIII)

Lavoisier
Cavendish
Priestly

*água e ar
são compostos*

Dalton

*lei das
proporções
múltiplas*

*base para as
leis quantitativas
modernas da matéria*

átomos
indivisíveis e
indestrutíveis

- átomos dos elementos são similares e têm o mesmo peso
- átomos de elementos diferentes têm pesos diferentes
- os elementos contrutivos básicos (moléculas) são formados por diferentes átomos em proporções definidas
- nas reações químicas não ocorre criação ou destruição de matéria

Origens e descoberta

- Ciência do século XX e o átomo multicorpuscular

Origens e descoberta

Origens e descoberta

- Descoberta da Radioatividade

Röntgen
Nov. 1895

descoberta dos raios X

Amostras de sais de Urânio
embaladas em papel preto e
expostas à luz solar

*registro em
uma placa
fotográfica*

Becquerel
1896

Uma amostra embalada e não exposta
à luz solar apresentava o mesmo efeito

*reprodução do
controno de
objetos (moedas)*

Pierre e
Marie Curie

Tório apresentava o
mesmo efeito do Urânio

Descoberta do Polônio e do Rádio

Rutherford:
Partículas α e β

Origens e descoberta

Modelo atômico de Rutherford

carga positiva do átomo concentrada em um núcleo central

movimento "planetário" dos elétrons negativos em torno do núcleo positivo

maior parte da massa do átomo concentrada no núcleo

mesmo número de cargas negativas e positivas (prótons)

Comprovação experimental por Geiger e Marsden (1913):
Folhas de ouro bombardeadas por partículas α
-Núcleo de $\sim 5 \times 10^{-15} \text{m}$
-Distância entre os núcleos $\sim 10^{-10} \text{m}$

Como os prótons se mantêm agrupados ?

Por que os elétrons em movimento não irradiam e perdem energia cinética ?

como explicar a emissão de linhas espectrais ?

Origens e descoberta

- Modelo atômico de Bohr-Sommerfeld

*radiação de
corpo negro*

Teoria de
Planck
(1900)

*emissão discreta
de energia*

*emissão de elétrons
por metais atingidos
por luz UV*

Efeito
fotoelétrico
(1905)

*energia dos elétrons
emitidos dependia da
frequência da luz incidente*

*emissão de energia
pelos átomos associada
à transição de estados*

Modelo do
Átomo de Bohr
(1913)

*diferentemente da
teoria clássica:
os elétrons não emitem
radiação continuamente*

Origens e descoberta

- O nêutron

Como explicar como os prótons se mantêm no núcleo apesar da força repulsiva ??

Outro problema: o número de massa de átomos mais pesados que o hidrogênio era aproximadamente o dobro do número atômico !!

Descoberta do Nêutron por Chadwick (1932)

força nuclear coesiva de curto alcance

explica também a existência de isótopos (Soddy 1913)

Produção artificial de radioisótopos

GRUPO DE
**DOSIMETRIA
DAS RADIAÇÕES**
e FÍSICA MÉDICA

IFUSP - Instituto de Física da USP

Produção de radioisótopos

- Transmutação artificial → Irène Curie (1934)
 - P-30 e N-13

- Quatro elementos que faltavam na tabela periódica de Mendeléev
 - Segré e Perrier (Itália, 1937) → Tc-99 (Tecnécio)
 - Margarite Perey (França, 1939) → Fr-232 (Frâncio)
 - Grupo de Segré (1940) → As-210 (Astató)
 - Marinsky/Glendenin/Coryell (1945) → Pm-145 (Promécio)

Produção de radioisótopos

IFUSP - Instituto de Física da USP

Métodos

Reatores Cíclotrons Geradores

Produção de radioisótopos

IFUSP - Instituto de Física da USP

Alvo	Reação	Radionuclídeo
Cr-50	(n,γ)	Cr-51
Mo-98	(n,γ)	Mo-99
Xe-124	(n,γ)	Xe-125 $\Rightarrow$ I-125
Te-130	(n,γ)	Te-131 $\Rightarrow$ I-131
Zn-68	$(p,2n)$	Ga-67
Cd-111	(p,n)	In-111
Tl-203	$(p,3n)$	Pb-201 $\Rightarrow$ Tl-201
Te-124	$(p,2n)$	I-123
I-127	$(p,5n)$	Xe-123 $\Rightarrow$ I-123
U-235	(n,f)	Zr-99 $\Rightarrow$ Nb-99 $\Rightarrow$ Mo-99

Produção de radioisótopos

Produção de radioisótopos

Produção de radioisótopos

CICLOTRON

Stanley Livingstone and Ernest Lawrence com seu cíclotron de 8 MeV (1935)

Produção de radioisótopos

Produção de radioisótopos

Produção de radioisótopos

Produção de radioisótopos

- Próton $\rightarrow$ Neutron
 - Z decresce 1, N cresce 1, A permanece constante
 - Ocorre em núclídeos ricos em prótons
- Limiar de energia
 - Massa atômica do pai $>$ Massa atômica do filho + 1.02 MeV
- Pósitron & Neutrino
 - Pósitron é a anti-partícula do elétron
 - Espectro de energias vai de 0 até a energia máxima do β^+
 - Neutrino faz parte do balanço energético
- Alcance do pósitron
 - Aproximadamente 5 mm/MeV na água

Produção de radioisótopos

- Decaimento β^+

Produção de radioisótopos

- Em Medicina Nuclear
 - átomos naturalmente presentes em tecidos ^{11}C , ^{13}N , ^{15}O , ^{18}F , ^{82}Rb
 - moléculas marcadas biologicamente ativas
 - Glicose
 - Água
 - Proteínas
 - Peptídeos
 - neuro-transmissores, etc.

	^{11}C	^{13}N	^{15}O	^{18}F	^{68}Ga	^{82}Rb
Meia-vida $T_{1/2}$ (min)	20,4	9,96	2,07	109,8	68	1,3
Energia Máx (MeV)	0,959	1,197	1,738	0,650	1,899	3,148
Energia Mais Provável (MeV)	0,326	0,432	0,696	0,202	0,843	1,385
Alcance Médio em água (mm)	1,7	2,0	2,7	1,4	1,7	-
Viabilidade	Cíclotron local	Cíclotron local	Cíclotron local	Cíclotron local	Gerador ^{68}Ge - ^{68}Ga	Gerador ^{82}Sr - ^{82}Rb

Métodos de produção de radioisótopos

TABLE 16-1 COMPARISON OF RADIONUCLIDE PRODUCTION METHODS

CHARACTERISTIC	PRODUCTION METHOD			
	LINEAR ACCELERATOR/ CYCLOTRON	NUCLEAR REACTOR (FISSION)	NUCLEAR REACTOR (NEUTRON ACTIVATION)	RADIONUCLIDE GENERATOR
Bombarding particle	Proton, alpha	Neutron	Neutron	Production by decay of parent
Product	Neutron poor	Neutron excess	Neutron excess	Neutron poor or excess
Typical decay pathway	Positron emission, electron capture	Beta-minus	Beta-minus	Several modes
Typically carrier free	Yes	Yes	No	Yes
High specific activity	Yes	Yes	No	Yes
Relative cost	High	Low	Low	Low (^{99m}Tc) High (^{82}Rb)
Radionuclides for nuclear medicine applications	^{11}C , ^{13}N , ^{15}O , ^{18}F , ^{57}Co , ^{67}Ga , ^{68}Ge , ^{111}In , ^{123}I , ^{201}Tl	^{99}Mo , ^{131}I , ^{133}Xe	^{32}P , ^{51}Cr , ^{89}Sr , ^{125}I , ^{153}Sm	^{68}Ga , ^{81m}Kr , ^{82}Rb , ^{90}Y , ^{99m}Tc

Fonte: Bushberg, J.T. et al. – *The Essential Physics of Medical Imaging*, 2012

Geradores de radioisótopos

IFUSP - Instituto de Física da USP

- Radioisótopo mais usado
 - Tecnécio metaestável – ^{99m}Tc
 - Meia-vida: 6h
 - Combinação fácil com vários agentes
 - Energia principal: 140keV

Produção de radioisótopos

– Geradores de Tecnécio

- Isótopo pai
 - ^{99}Mo em alumina (Al_2O_3) ou resina
 - Meia-vida: 67h

• Produto final

- Eluição (lavagem) com solução fisiológica salina
 - » Tc menos ligado na coluna que o Mo
- Produto: pertecnetato de sódio
 - » Combinação com o agente em um kit

Produção de radioisótopos

– Tempos no gerador

- Reestabelecimento do Tc

- Meia-vida (6h)

- Após eluição

- Equilíbrio transiente entre Mo e Tc após 4-5 meias-vidas (24h)

- Retirada do Tc – uma vez por dia

- Durante o equilíbrio

$$A_f(t) = \frac{\lambda_f}{\lambda_f - \lambda_p} \times A_p(0) \times (e^{-\lambda_p t} - e^{-\lambda_f t})$$

- Atividade específica cai com o tempo

- » Utilidade dos geradores: ~ 1 semana

Produção de radioisótopos

Produção de radioisótopos

Meia-vida física, biológica e efetiva

GRUPO DE
**DOSIMETRIA
DAS RADIAÇÕES**
e FÍSICA MÉDICA

IFUSP - Instituto de Física da USP

Meia-vida física, biológica e efetiva

- Meia-vida

$$A = A_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow A = \frac{A_0}{2} \Rightarrow t = T_{1/2}$$

- Vida-média

$$\therefore T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

- Tempo de vida médio do átomo em uma amostra

$$\tau = \frac{1}{\lambda} = 1,44 T_{1/2}$$

- Meia-vida biológica e meia-vida efetiva

$$\frac{1}{T_{1/2}^{efetiva}} = \frac{1}{T_{1/2}^{física}} + \frac{1}{T_{1/2}^{biológica}}$$

Tab. 3.2 MEIAS-VIDAS FÍSICA, BIOLÓGICA E EFETIVA DE VÁRIOS RADIOISÓTOPOS DE INTERESSE NA MEDICINA OU EM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

Radioisótopo	Meia-vida em dias		
	$T_{1/2fis}$	$T_{1/2bio}$	$T_{1/2efetiva}$
^3H	$4,5 \times 10^3$	12	12
^{14}C	$2,1 \times 10^6$	40	40
^{22}Na	850	11	11
^{32}P	14,3	1155	14,1
^{35}S	87,4	90	44,3
^{36}Cl	$1,1 \times 10^8$	29	29
^{45}Ca	165	$1,8 \times 10^4$	164
^{59}Fe	45	600	42
^{60}Co	$1,93 \times 10^3$	10	10
^{65}Zn	244	933	193
^{86}Rb	18,8	45	13
^{90}Sr	$1,1 \times 10^4$	$1,8 \times 10^4$	$6,8 \times 10^3$
^{99m}Tc	0,25	1,0	0,20
^{123}I	0,54	138	0,54
^{131}I	8	138	7,6
^{137}Cs	$1,1 \times 10^4$	70	70
^{140}Ba	12,8	65	10,7
^{198}Au	2,7	280	2,7
^{210}Po	138	60	42
^{226}Ra	$5,8 \times 10^5$	$1,6 \times 10^4$	$1,5 \times 10^4$
^{235}U	$2,6 \times 10^{11}$	15	15
^{239}Pu	$8,8 \times 10^6$	$7,3 \times 10^4$	$7,2 \times 10^4$

Fonte: <<http://hyperphysics.phy-astr.gsu/hbase/nuclear/bchalf.html>>.

Acesso em: abr. 2009

Aplicações em arqueologia

- Datação por C-14
 - Carbono – elemento mais abundante nos seres vivos após o H e o O
 - ^{12}C e ^{13}C – 98,892% e 1,108%
 - ^{14}C instável
 - Interação de nêutrons da radiação cósmica com ^{14}N
 - $^{14}\text{N} + n \rightarrow ^{14}\text{C} + ^1_1\text{H}$
 - Razão entre as abundâncias isotópicas constante
 - $1,3 \times 10^{-12}$ todos os organismos VIVOS com a mesma proporção
 - Após o organismo morrer, a proporção diminui
 - Meia vida do ^{14}C = 5730 anos

Radioisótopos na Medicina

DIAGNÓSTICO

IMAGENS

- *Imagens planares*
- *SPECT*
- *PET*

RADIOIMUNOENSAIO

TERAPIA

BRAQUITERAPIA

- *LDR*
- *HDR*
- *IODOTERAPIA*

TELETERAPIA

- *FONTES*
- *ACELERADORES*

Radioisótopos na Medicina

Meia-vida
biológica

*redução de bioquímicos
ou drogas em sistemas
biológicos*

**muitas vezes
exponencial**

$$M(t) = M_0 e^{-\lambda_{bio} t}$$

*metabolismo
excreção
difusão
doença*

sistemas
reais

$$T_{1/2}^{bio} = \frac{\ln 2}{\lambda_{bio}}$$

$$M(t) = M_0 \left(A_1 e^{-\lambda_{bio}^1 t} + A_2 e^{-\lambda_{bio}^2 t} + A_3 e^{-\lambda_{bio}^3 t} \dots \right)$$

$A_1, A_2, A_3 \dots$ e $\lambda_{bio}^1, \lambda_{bio}^2, \lambda_{bio}^3 \dots$ obtidos experimentalmente

Radioisótopos na Medicina

Meia-vida
efetiva

*em sistemas simples:
combinação dos fenômenos
físico e biológico*

$$\lambda_{ef} = \lambda_{bio} + \lambda$$

$$\frac{1}{T_{\frac{1}{2}}^{efetiva}} = \frac{1}{T_{\frac{1}{2}}^{física}} + \frac{1}{T_{\frac{1}{2}}^{biológica}}$$

EXEMPLOS:

1. A meia-vida biológica do iodo na tireóide humana é de 64 dias e a meia-vida física do ^{131}I é de 8 dias Qual a meia-vida efetiva do ^{131}I na tireóide?

$$\frac{1}{T_{\frac{1}{2}}^{efetiva}} = \frac{1}{T_{\frac{1}{2}}^{física}} + \frac{1}{T_{\frac{1}{2}}^{biológica}} = \frac{1}{8} + \frac{1}{64} = \frac{9}{64} \Rightarrow T_{\frac{1}{2}}^{efetiva} = 7,1 \text{ dias} \approx T_{\frac{1}{2}}^{física}$$

2. O Xenônio-133 é um gás radioativo inerte usado para estudos da função pulmonar. Sua meia-vida física é de 5,3 dias e sua meia-vida biológica nos pulmões é de cerca de 0,35 minutos. Qual sua meia-vida biológica?

$$\frac{1}{T_{\frac{1}{2}}^{efetiva}} = \frac{1}{5,3 \times 24 \times 60} + \frac{1}{0,35} \Rightarrow T_{\frac{1}{2}}^{efetiva} \approx 0,35 \text{ minutos} \approx T_{\frac{1}{2}}^{biológica}$$

Radioisótopos na Medicina

Radiofármacos

Projeto de um radiofármaco

SELEÇÃO DO RADIONUCLÍDEO:

1. Minimização da dose
 - a. $T_{1/2}$ curta (compatível)
 - b. Não emissor α e β
2. Características de detecção da instrumentação
3. Preferencialmente monocromático ($100 < E < 300 \text{keV}$)
4. Economicamente viável

SELEÇÃO DO QUÍMICO:

1. Não-tóxico
2. Incorporação diferencial em situações normais e patológicas
3. Baixa adesão a proteínas plasmáticas

Desenvolvimento de um radiofármaco

Estudos químicos:

1. Melhores métodos de rotulagem

Estudos em animais:

- Biodistribuição
- Estudo de toxicidade

Estudos clínicos em humanos

- Três fases
- Registro no MS

Controle de qualidade de um radiofármaco

Pureza do radionuclídeo:

1. Contaminantes podem deteriorar a qualidade das imagens

Pureza do radioquímico

1. Estabilidade em longo prazo mesmo com ações químicas e da radiação

Pureza química final

Esterilidade

Apirogenicidade

Radioisótopos na Medicina

Teoria dos
Compartimentos

determinação da
taxa de incorporação
de radiofármacos

órgãos
=
compartimentos

complexidade
aumenta com

- *número de compartimentos*
- *sistema aberto ou fechado*

medições
clínicas

- *fluxo entre órgãos*
- *tempo de trânsito do fluxo sanguíneo através dos órgãos*
- *taxa total de fluxo sanguíneo através de um órgão*

Modelo fechado de 3 compartimentos

Radioisótopos na Medicina

Modelo fechado de 3 compartimentos

Condições iniciais (t=0):

$$q_1 = q_0 \text{ e } q_2 = q_3 = 0$$

$$q_0(t) = q_0 \exp(-\lambda t)$$

Injeção do fármaco

q_0

$$\frac{dq_1}{dt} = K_{21}q_2 + K_{31}q_3 - K_{12}q_1 - K_{13}q_1$$

$$\frac{dq_2}{dt} = K_{12}q_1 - K_{21}q_2$$

$$\frac{dq_3}{dt} = K_{13}q_1 - K_{31}q_3$$

se não há transferência reversível de atividade de 2 e 3 de volta para 1

$$K_{21} = K_{31} = 0$$

$$\begin{cases} q_2 = \frac{-K_{12}}{K_{12} + K_{13}} q_0 e^{-(K_{12} + K_{13})t} + C_2 \\ q_3 = \frac{-K_{13}}{K_{12} + K_{13}} q_0 e^{-(K_{12} + K_{13})t} + C_3 \end{cases}$$

Radioisótopos na Medicina

C_2 e C_3 Atividade nos compartimentos
quando $t \rightarrow \infty$

*para minimizar a dose,
deve-se escolher isótopos
com meia-vida dimensionada
para permitir a investigação clínica*

$t \rightarrow 0$

$$C_2 = \frac{K_{12}}{K_{12} + K_{13}} q_0$$

$$C_3 = \frac{K_{13}}{K_{12} + K_{13}} q_0$$

$$q_2 = \frac{K_{12}}{K_{12} + K_{13}} q_0 e^{-\lambda t} \left[1 - e^{-[K_{12} + K_{13}]t} \right]$$

$$q_3 = \frac{K_{13}}{K_{12} + K_{13}} q_0 e^{-\lambda t} \left[1 - e^{-[K_{12} + K_{13}]t} \right]$$

Radioisótopos na Medicina

Radioisótopos na Medicina

Planares

Imagens em
Medicina Nuclear

PET

SPECT

Radioisótopos na Medicina

EMISSORES β -

- mais utilizados em terapia
- permitem uma dose de radiação uniforme

Terapia com radionuclídeos

Radionuclídeos emissores de partículas diretamente ionizantes (partículas α , β , ou *elétrons Auger*) são indicados para tratamento de tumores

EMISSORES α

- pequeno alcance
- 100 radionuclídeos
- a maioria com meia-vida longa
- difícil produção
- apenas três com aplicação terapêutica em estudo.

EMISSORES DE ELÉTRONS AUGER

- capacidade ionizante baixa no citoplasma das células, mas elevada, quando incorporados em compostos que interagem diretamente com o DNA
- não existem radiofármacos comercializados
- área ativa de investigação.

Contaminação ambiental

GRUPO DE
**DOSIMETRIA
DAS RADIAÇÕES**
e FÍSICA MÉDICA

IFUSP - Instituto de Física da USP

O acidente de Goiânia

- Efeitos biológicos das radiações ionizantes. Acidente radiológico de Goiânia
- Emico Okuno
- Estud. av. vol.27 no.77 São Paulo 2013
- <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142013000100014>

Chronology of accident

- 21/09/1987 – Deivar takes into his house the piece of caesium source and distributes the radioactive powder that emits blue light to relatives and friends
- Mara Galvães (wife, 36) with symptoms of vomiting and diarrhea was examined at Hospital S. Lucas
- 23/09/1987 – Ivo Alves Fernaldo (3) and his daughter Leide dos Neves (5) receive a little bit of caesium powder. Leide eats egg with hands contaminated with Cs-137, becoming externally and internally contaminated

Deivar Galvães, 1987
Mara Galvães, 1987
Leide dos Neves, 1987