Ação do Sistema Nervoso Autônomo sobre a fibra muscular

Tanes Imamura de Lima

Departamento de Bioquímica e Imunologia

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-FMRP

Universidade de São Paulo-USP

Obesity and Comorbidities Research Center-OCRC

Universidade de Campinas-Unicamp

Papel do Sistema Nervoso Autônomo

Dupla Inervação do Sistema Nervoso Autônomo

Neuroransmissores e Receptores do Sistema Nervoso Autônomo

Mecanismo de transdução de sinal por proteína G

O Sistema Nervoso Simpático regula uma série de funções no músculo esquelético

1. **Metabolismo de proteína e glicose**
2. **Aumento da atividade da bomba de Na⁺/K⁺**
3. **Aumento da liberação de acetilcolina na sinapse**
4. **Modulação da captação e liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático**

Modulação do metabolismo de glicose

1. Ativação do receptor β_2
2. Ativação da via cAMP/PKA
3. PKA ativa a fosforilase quinase e inibe a glicogênio sintase
4. Redução da glicogênese e aumento da glicogenólise

Modulação da atividade da bomba de Na⁺/K⁺

1. Ativação do receptor β_2
2. Ativação da via cAMP/PKA
3. PKA fosforila FXYD1 e estimula a atividade da bomba Na⁺/K⁺
4. Aumento do potencial de membrana e amplitude de potencial de ação
5. Atenuação da fadiga

Modulação no fluxo de cálcio

1. Ativação do receptor β_2
2. Ativação da via cAMP/PKA
3. PKA fosforila o canal de DHPR, RYR1 e PLB
4. Aumento do fluxo de cálcio
5. Aumento na força contrátil

Modulação do metabolismo de proteína

1. Ativação do receptor $\beta 2$
2. Ativação da via cAMP/PKA e PI3k
3. Ativação de Akt
4. Fosforilação e inativação de FoxO1 e subsequente inativação da expressão de genes atroficos
5. PKA também aumenta a expressão de calpastatina que inibe calpaínas (protease)
6. Aumento de síntese e redução da degradação de proteínas

Vias de sinalização cAMP/PKA em fibras musculares esqueléticas

Localização intracelular de PKA em fibras musculares esqueléticas

Table 3. *AKAPs expressed in skeletal muscle and localization*

AKAP	Localization	Citation
AKAP15	T-tubules	(78)
AKAP-100 (m-AKAP)	Sarcoplasmic reticulum	(159)
Yotiao (AKAP9)	Neuromuscular junction	(144)
D-AKAP1	Mitochondria	(107)
D-AKAP2	Mitochondria, cytosol, nucleus	(29, 106)
Myospryn	Costameres	(187)

Substratos cAMP/PKA em fibras musculares esqueléticas

❖ Substratos de PKA

- ❖ Bomba de Na⁺/k⁺
- ❖ Fosfolamban
- ❖ Glicogênio sintase
- ❖ Fosforilase quinase
- ❖ Receptor de rianodina
- ❖ **Proteína de ligação ao elemento de resposta do cAMP (CREB)**

Proteína de ligação ao elemento de resposta do cAMP (CREB)

❖ Características do CREB

- ❖ Fator de transcrição
- ❖ É ativado por fosforilação (PKA e Camk)
- ❖ Regulação por cofatores (ex: CRTTC2, NCoR1)
- ❖ Se liga em elementos responsivos à AMPc (CRE)
- ❖ Importante para a maioria dos efeitos da ativação do PKA
- ❖ Em células musculares esqueléticas controla:
 - ❖ Biogênese mitocondrial
 - ❖ Metabolismo oxidativo
 - ❖ Hipertrofia
 - ❖ Miogênese

Via PKA/CREB controla o trofismo da fibra muscular

1. Ativação do receptor β2
2. Ativação da via PKA/CREB e PI3k
3. Ativação de Akt e inativação de genes atroficos
4. PKC fosforila CREB e aumenta a expressão de calpastatina
5. Aumento de síntese e redução da degradação de proteínas
6. Hipertrofia muscular

Agonista- β adrenérgico controla o trofismo da fibra muscular

Agonista- β adrenérgico controla o trofismo da fibra muscular

S1- Anabolic agents
Clenbuterol

June 15, 2011

WADA statement on clenbuterol

Following current media interest in relation to clenbuterol, WADA wishes to clarify the following: 1. Clenbuterol is a prohibited substance and there is no threshold under which ...

Via PKA/CREB/PGC-1 α controla a biogênese mitocondrial da fibra muscular

1. Ativação do receptor β 2
2. Ativação da via PKA/CREB
3. Expressão de PGC-1 α
4. Ativação de MEF-2, PPARs, ERRs e NRFs
5. Expressão de genes mitocôndrias
6. $\uparrow$ Biogênese mitocondrial
7. $\uparrow$ Metabolismo oxidativo

Agonista- β adrenérgico modula genes do metabolismo oxidativo

Table 1: Significant differentially expressed genes in skeletal muscle after acute systemic administration of β_2 -AR agonist

Gene Name	Genebank ID	1 HOUR		4 HOURS		Potential Relevant Function
		change	p-value	change	p-value	
Metabolism and mitochondrial related						
PPAR γ coactivator 1 alpha (Pgc-1 α)	NM_008904.1	+ 1.53	NS	+ 5.25	0.022	Mitochondrial biogenesis
Pyruvate dehydrogenase kinase 4 (Pdk4)	NM_013743.1	+ 1.35	NS	+ 2.88	0.016	Pyruvate metabolism
Protein phosphatase 1 regulatory subunit 3C (Ppp1r3c)	NM_016854.1	+ 1.34	NS	+ 2.55	0.021	Glycogen maintenance
Uncoupling protein 3 (Ucp3)	NM_009464.2	+ 1.42	NS	+ 2.37	0.017	Mitochondrial uncoupling
Forkhead box O1 (FoxO1)	NM_019739.2	- 1.03	NS	+ 2.29	0.025	Lipid metabolism
Kinesin family member 1B (Kif1b), transcript variant 1	NM_008441.1	1.00	NS	- 2.28	0.034	Mitochondrial transport
Hexokinase 2 (Hk2)	NM_013820.1	+ 1.53	NS	+ 2.18	0.006	Glycolysis
Phosphomevalonate kinase (Pmvk)	NM_026784.1	+ 1.31	NS	+ 2.07	0.012	Cholesterol/steroid synthesis
Plasma membrane associated protein (S3-12)	NM_020568.1	- 1.02	NS	+ 2.03	0.041	Lipid droplet protein
Lipin 1 (Lpin1)	NM_015763	+ 1.16	NS	+ 2.03	0.011	Lipid metabolism
ATPase, H ⁺ transporting, V1 subunit B, isoform 2 (Atp6v1b2)	NM_007509.2	+ 1.19	NS	+ 2.02	0.012	ATPase
Sorbin and SH3-domains containing 1 (Sorbs1)	NM_009166	+ 1.38	NS	+ 2.01	0.006	Insulin signaling
Scavenger receptor class B member 1 (Scarb1)	NM_016741.1	- 1.40	NS	- 1.91	0.008	Regulation of blood lipids
Peroxisome proliferator activator receptor delta (Ppar δ)	NM_011145	+ 1.06	NS	+ 1.87	0.040	Lipid metabolism

Administração aguda de Formoterol

Agonista β -adrenérgico ativa o metabolismo oxidativo

Papel da via β -adrenérgica/CREB no controle da diferenciação da fibra muscular

Biogênese mitocondrial durante a diferenciação da fibra muscular

Vias enriquecidas durante a diferenciação da fibra muscular

Ativação da via cAMP/PKA durante a diferenciação

Ativação da hipertrofia muscular durante a diferenciação

Sinalização da insulina e metabolismo de proteínas durante a diferenciação

Vias enriquecidas durante a diferenciação

Papel da ativação aguda e crônica da via PKA/CREB na fibra muscular

Ação do Sistema Nervoso Simpático na fibra muscular

Neurobiology of Disease

Volume 85, January 2016, Pages 11–24

Review

β_2 -Adrenoceptor agonists as novel, safe and potentially effective therapies for Amyotrophic lateral sclerosis (ALS)

The role of β -adrenoceptor signaling in skeletal muscle: therapeutic implications for muscle wasting disorders

René Koopman¹, James G. Ryall², Jarrod E. Church and Gordon S. Lynch

Neurology. 2004 Mar 23;62(6):1006-8.

Pilot trial of albuterol in Duchenne and Becker muscular dystrophy.

Fowler EG¹, Graves MC, Wetzel GT, Spencer MJ.

Physiological Reviews®

Role of β -Adrenoceptor Signaling in Skeletal Muscle: Implications for Muscle Wasting and Disease

Neurology. 2008 Jan 8;70(2):137-43. Epub 2007 Oct 17.

Albuterol increases lean body mass in ambulatory boys with Duchenne or Becker muscular dystrophy.

SCIENTIFIC REPORTS

/ABOUT
/EDITORIAL BOARD
/FOR AUTHORS

Sci Rep. 2017; 7: 41046.

PMCID: PMC5259768

Published online 2017 Jan 24. doi: [10.1038/srep41046](https://doi.org/10.1038/srep41046)

Beta-agonist stimulation ameliorates the phenotype of spinal and bulbar muscular atrophy mice and patient-derived myotubes

The International Journal of Biochemistry & Cell Biology

Volume 45, Issue 10, October 2013, Pages 2309–2321

Review

β_2 -Adrenergic agonists and the treatment of skeletal muscle wasting disorders ☆