Testes paramétricos: médias variâncias, testes t e F

- Uma questão que aparece frequentemente quando se tem dois conjuntos de dados, ou conjunto e um modelo é se eles diferem em relação à locação e/ou espalhamento.
- Os testes mais conhecidos que lidam com essas questões são o teste *t de student* (comparação de médias) e o teste F (comparação de variâncias). Ambos supões que os dados se distribuem Normalmente.
- Para contrastar os métodos clássicos e bayesianos de teste de hipótese olharemos para o caso mais simples, o de comparação de médias.
- Suporemos também distribuições gaussianas por comodidade.

Testes paramétricos: médias variâncias, testes t e F

- Suponha que temos n dados X_i , tirados de uma distribuição gaussiana de média μ_x e outros conjunto com m dados, com distribuição gaussiana de mesma variância que a anterior, mas de médias μ_y . Calcule a variância comum σ^2
- O método bayesiano é calcular a distribuição posterior conjunta:

$$\text{prob}(\mu_x, \mu_y, \sigma) \propto \frac{1}{\sigma^{n+m+1}} \exp \left[-\frac{\sum_i (x_i - \mu_x)^2}{2\sigma^2} \right] \left[-\frac{\sum_i (y_i - \mu_y)^2}{2\sigma^2} \right],$$

no qual usamos o *a priori* de Jeffreys para a variância ($\text{prob}(\sigma) = 1/\sigma$).

- Integrando sobre o parâmetro 'irrelevante' σ , obtemos a probabilidade conjunta $\text{prob}(\mu_x, \mu_y)$ e podemos usar isso, por exemplo, para calcular a probabilidade de μ_x ser maior do que μ_y .
- A partir disso pode se obter a distribuição de probabilidades de $\mu_x - \mu_y$ (Lee, 2004, cap. 5). O resultado depende dos dados via a quantidade:

$$t' = \frac{(\mu_x - \mu_y) - (\bar{X} - \bar{Y})}{s\sqrt{m^{-1} + n^{-1}}},$$

onde:

$$s^2 = \frac{nS_x^2 + mS_y^2}{\nu},$$

com as usuais médias quadráticas $S_x = \sum (X_i - \bar{X})^2 / n$, similarmente para S_y e $\nu = n + m - 2$

Testes paramétricos: médias variâncias, testes t e F

- A distribuição de t' é

$$\text{prob}(t') = \frac{\Gamma[\frac{\nu+1}{2}]}{\sqrt{\pi}\Gamma[\nu+1]} \left(1 + \frac{t'^2}{\nu}\right)^{-(\nu+1)/2}$$

- Por essa rota não estamos realmente fazendo um teste de hipóteses. Os dados são supostos fixos e $\mu_x - \mu_y$ como a variável e simplesmente calculamos a probabilidade de qualquer diferença nas médias.
- Se ao invés disso usarmos a linha de pensamento clássica não tratamos os μ 's como variáveis. Supomos que a diferença nas médias $\bar{X} - \bar{Y}$ é a estatística que procuramos e calculamos a distribuição da hipótese nula ($\mu_x = \mu_y$)
- Encontramos que:

$$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{s\sqrt{m^{-1} + n^{-1}}},$$

que segue a distribuição t com ν graus de liberdade.

Testes paramétricos: médias variâncias, testes t e F

- De modo análogo podemos chegar ao teste F para as variâncias. Novamente supondo distribuições gaussianas. A hipótese nula é $\sigma_x = \sigma_y$, os dados são $X_i (i = 1, \dots, N)$ e $Y_i (i = 1, \dots, N)$ e a estatística teste é:

$$\mathcal{F} = \frac{\sum(X - \bar{X})^2 / (N - 1)}{\sum(Y - \bar{Y})^2 / (M - 1)}$$

- Isso segue uma distribuição F com $N - 1$ e $M - 1$ graus de liberdade e o procedimento de teste é o mesmo do teste t de Student.

- Claramente essa estatística é particularmente sensível à hipótese de gaussianidade.

Testes paramétricos: o teste de Bahrens-Fisher

- É possível derivar a distribuição da diferença entre médias sem a suposição da igualdade da variâncias. A distribuição resultante é chamada de *Bahrens-Fisher*.
- Esse é uma raro exemplo em estatística de uma análise bayesiana sem análogo clássico. Não existe teste clássico para o caso de variâncias diferentes.
- A forma analítica da distribuição de Bahrens-Fisher é complicada e envolve uma integração numérica, de modo que podemos usar o computador já num primeiro momento para fazer o cálculo a partir do teorema de Bayes.
- Suponha que os nossos dados foram gerados a partir de distribuições gaussianas de média μ e variâncias σ^2 . A distribuição conjunta do posterior, usando o *a priori* de Jeffreys em σ é

$$\begin{aligned} \text{prob}(\mu_x, \mu_y, \sigma_x, \sigma_y) &\propto \frac{1}{\sigma^{n_x+1}} \exp \left[-\frac{\sum_i (x_i - \mu_x)^2}{2\sigma_x^2} \right] \\ &\times \frac{1}{\sigma^{n_y+1}} \exp \left[-\frac{\sum_i (y_i - \mu_y)^2}{2\sigma_y^2} \right] \end{aligned}$$

Testes paramétricos: o teste de Bahrens-Fisher

- Temos uma integração multidimensional para livrar-nos dos *parâmetros irrelevantes* (σ_x e σ_y) e para nos assegurarmos que a distribuição conjunta resultante está normalizada apropriadamente.
- Até o desenvolvimento, relativamente recente, da técnica de *Monte Carlo - Markov Chain* (MCMC), essa integral para distribuições não-gaussianas era um grande obstáculo ao uso de métodos bayesianos.
- A derivação analítica da distribuição de Bahrens-Fisher elimina todas, menos uma integração numérica.
- Essa teste ilustra dois pontos. Primeiro de que complicações relativamente inócuas de questões clássicas levem a problemas muito complexos conceitualmente, algebricamente ou ambos. Segundo, que o uso da força-bruta para resolver o teorema de Bayes pode requerem o uso de grandes recursos para resolver as integrações numéricas.

Testes paramétricos: o teste de Bahrens-Fisher

- Conceitos de erros e força do teste t clássico.

Exemplo W&J P. 101

Força *versus* erro do tipo I para um teste t simples, onde a diferença verdadeira das médias varia entre 1 (linhas de baixo) e 3 (linhas de cima). As linhas tracejadas correspondem a um aumento de 25% no desvio padrão das gaussianas a partir das quais as amostras foram geradas.

- Até agora, nesse tópico, supusemos apenas medidas sem ruído. Podemos ver o efeito do ruído ao aumentarmos o desvio padrão das distribuições (linhas tracejadas). Nota-se como o ruído aumenta a força do teste e ilustra a utilidade do conceito de força.

Testes paramétricos: teste paramétrico não-gaussiano

- Quando não se conhece a distribuição dos pontos a suposição usual é que ambos conjuntos de ponto obedecem a uma mesma distribuição, ainda que desconhecida.
- Caso tenhamos alguma informação sobre as distribuições podemos usar métodos bayesianos. O truque é usar uma generalização multiparamétrica de uma distribuição familiar, que tem parâmetros extra para acomodar as distorções em sua forma. Finalmente marginaliza-se sobre esses parâmetros no intervalo de valores que supomos *a priori* que eles se encontram.
- O exemplo mais comum desse tipo de generalização é a chama da série de Gram-Charlier:

$$\exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \left(1 + \sum_i a_i H_i(x)\right),$$

onde $H(x)$ são os polinômios de Hermite e os coeficientes a_i são os parâmetros livres.

Testes paramétricos: teste paramétrico não-gaussiano

- O efeito desses termos extra é o de alargar e distorcer a gaussiana.

Distribuições resultantes do uso de apenas dois termos numa distribuição Gram-Charlier. A curva contínua é uma gaussiana pura.

- *A priori* nesses parâmetros devem ser ajustados por julgamento. Os polinômios de ordem par tem como efeito mudanças de escala, de modo que o *a priori* de Jeffreys deve ser usado. Os de ordem ímpar mudam ambos, locação e escala, de modo que o procedimento é menos óbvio.

Testes paramétricos: teste paramétrico não-gaussiano

- Esse procedimento esclarece o problema que os testes não-paramétricos tem que resolver. Suponha que fixemos que nossos dados são realisticamente representados com uma expansão de Gram-Charlier com dois termos.
- Para o conjunto de dados 1 a probabilidade posterior $prob(\mu^{(1)}, \sigma^{(1)}, a_1^{(1)}, a_2^{(1)})$, e de modo similar para o conjunto 2.
- Se a nossa pergunta a esses dados for: "esses dados foram gerados a partir da mesma distribuição?", teríamos que testar várias possibilidades (2^4 de fato) tais como: $\mu^{(1)} > \mu^{(2)}$ e $\sigma^{(1)} > \sigma^{(2)}$ e $a_1^{(1)} > a_1^{(2)}$ e $a_2^{(1)} > a_2^{(2)}$, o que seria bastante tedioso.
- Uma pergunta mais simples seria "estão essas distribuições em posições diferentes independentemente de seus espalhamentos?", que requereria a marginalização dos σ 's e a_2 's, já que a localização numa expansão de Gram-Charlier é uma combinação simples de μ e a_1 .
- Fim da aula 7