Biofarmacotécnica FBF0304

Correlação *in vitro-in vivo* CIVIV

Profa. Dra. Valentina Porta

Introdução

desempenho terapêutico

eficácia terapêutica
segurança

Introdução

Absorção de fármacos

Introdução

Desempenho terapêutico:

- ✓ estudos farmacodinâmicos
- ✓ estudos clínicos
- ✓ estudos farmacocinéticos

Introdução

Estudos farmacocinéticos:

- ✓ limitações financeiras
- ✓ limitações éticas
- ✓ estudos *in vitro*

CIVIV

- ✓ **USP:** é o estabelecimento, para uma forma farmacêutica, de uma relação entre uma de suas **propriedades biológicas**, ou um parâmetro derivado de uma propriedade biológica, e uma de suas **características físico-químicas**.
- ✓ **Anvisa:** estabelecimento de uma relação racional entre as **propriedades biológicas**, ou parâmetros derivados destas, produzidas por uma forma farmacêutica e suas propriedades ou **características físico-químicas**.

CIVIV

Permeabilidade

Solubilidade

Parâmetros básicos que controlam a absorção dos fármacos

> **Classificação Biofarmacêutica**

SCB

Sistema de Classificação Biofarmacêutica

Os fármacos são divididos em quatro classes, de acordo com suas **solubilidade** e **permeabilidade**:

- ✓ **Classe I:** alta **sol** e alta **per**;
- ✓ **Classe II:** baixa **sol** e alta **per**;
- ✓ **Classe III:** alta **sol** e baixa **per**;
- ✓ **Classe IV:** baixa **sol** e baixa **per**.

SCB e Solubilidade

RESOLUÇÃO - RDC Nº 37, DE 3 DE AGOSTO DE 2011

Dispõe sobre o Guia para isenção e substituição de estudos de biodisponibilidade relativa/bioequivalência e dá outras providências.

Art. 9º Um fármaco será considerado altamente solúvel se sua maior dose administrada oralmente como uma formulação de liberação imediata (dose máxima por administração descrita em bula) solubiliza-se completamente em até 250 ml de cada uma das soluções tampão utilizadas dentro da faixa de pH fisiológico (1,2 a 6,8), a 37 ± 1°C.

§ 1º Deverão ser testadas, no mínimo, três condições de pH (1,2; 4,5 e 6,8), utilizando-se, no mínimo, três replicatas para cada condição, devendo o coeficiente de variação (CV%) ser menor que 5% (cinco por cento). Caso o número de amostras utilizado seja maior do que três (n>3), todas as replicatas deverão ser consideradas no cálculo do desvio médio.

SCB e Solubilidade

Waiver of In Vivo Bioavailability and Bioequivalence Studies for Immediate-Release Solid Oral Dosage Forms Based on a Biopharmaceutics Classification System
Guidance for Industry
DRAFT GUIDANCE

U.S. Department of Health and Human Services
Food and Drug Administration
Center for Drug Evaluation and Research (CDER)
May 2015
Biopharmaceutics

The solubility class boundary is based on the highest strength of an IR product that is the subject of a bioequivalence study. A drug substance is considered *highly soluble* when the highest strength is soluble in 250 mL or less of aqueous media over the pH range of 1-6.8. The volume estimate of 250 mL is derived from typical BE study protocols that prescribe administration of a drug product to fasting human volunteers with a glass (about 8 ounces) of water.

SCB e Solubilidade

emea
European Medicines Agency

London, 20 January 2010
Doc. Ref.: CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. 1/Corr **

COMMITTEE FOR MEDICINAL PRODUCTS FOR HUMAN USE
(CHMP)

GUIDELINE ON THE INVESTIGATION OF BIOEQUIVALENCE

III.1 Solubility

The pH-solubility profile of the drug substance should be determined and discussed. The drug substance is considered highly soluble if the highest single dose administered as immediate release formulation(s) is completely dissolved in 250 ml of buffers within the range of pH 1 – 6.8 at 37±1 °C. This demonstration requires the investigation in at least three buffers within this range (preferably at pH 1.2, 4.5 and 6.8) and in addition at the pKa, if it is within the specified pH range. Replicate determinations at each pH condition may be necessary to achieve an unequivocal solubility classification (e.g. shake-flask method or other justified method). Solution pH should be verified prior and after addition of the drug substance to a buffer.

SCB e Solubilidade

Tabela 47 - Solubilidade do besilato de anlodipino em diferentes meios a 37,0 °C.

pH	Solubilidade (mg/mL)	Dose:solubilidade (mL)	pH ao final do experimento
pH 1,2	6,94	1,44	1,16
pH 4,5	2,35	4,24	4,45
Água pH 5,5	2,28	4,38	5,46
pH 6,8	1,10	9,09	6,77
pH 7,5	0,88	11,36	7,50

Tabela 48 - Solubilidade do fluconazol em diferentes meios a 37,0 °C

Meios avaliados	Solubilidade (mg/mL)	Dose:solubilidade (mL)	pH ao final do experimento
pH 1,2	14,40	13,88	1,69
pH 4,5	9,16	21,83	4,99
Água pH 5,5	8,80	22,72	6,05
pH 6,8	8,34	23,98	6,62
pH 7,5	8,22	24,33	7,49

Tabela 49 - Solubilidade do cloridrato de fluoxetina em diferentes meios a 37°C

Meios avaliados	Solubilidade (mg/mL)	Dose:solubilidade (mL)	pH ao final do experimento
pH 1,2	12,93	1,55	1,30
pH 4,5	44,11	0,45	4,55
Água pH 5,5	44,36	0,45	5,00
pH 6,8	7,16	2,79	6,83
pH 7,5	5,12	3,91	7,48

Dosagens:

- Besilato de anlodipino: 10 mg;
- Fluconazol: 200 mg;
- Fluoxetina: 20 mg

SCB e Solubilidade

Pharmaceutical Research, Vol. 12, No. 2, 1993

A Theoretical Basis for a Biopharmaceutic Drug Classification: The Correlation of *in Vitro* Drug Product Dissolution and *in Vivo* Bioavailability

Geordan L. Amidon,^{1,2} Hans Lennmark,³ Vinod P. Shah,^{2*} and John R. Crison²

Table I. Calculated Parameters for Representative Drugs

Drug	Dose (mg)	C_p^{min} (mg/ml) ^a	V_{diss} (ml) ^b	D_0^c	D_0^d (estimated intrinsic)
Piroxicam	20	0.007	2.857	11.4	0.15
Glyburide	20	<0.100	200	>40.800	0.78
Cimetidine	800	6.000	133	0.53	129
Chlorthalidate	500	0.786	636	2.54	17.0
Digoxin	0.5	0.024	20.8	0.08	0.52
Griseofulvin	500	0.015	33.333	133	0.32
Carbamazepine	200	0.260	769	3.08	5.61

^a Minimum physiologic solubilities were determined in the physiological pH range (1-8) and temperature (31, 32).

^b Volume of solvent required to completely dissolve the dose at minimum physiologic solubility.

^c $D_0 = \text{Dose}/V_d C_p^{min}$, initial gastric volume, $V_d = 250$ ml.

^d Assumptions: $r_a = 25$ μm , $D = 5 \times 10^{-6}$ cm^2/sec , $\rho = 1.2$ gm/cm^3 , $(L_{eff})_0 = 180$ min. (33).

SCB e Permeabilidade

A passagem do fármaco presente no lúmen do trato gastrointestinal para a circulação sistêmica ocorre por diversos mecanismos de absorção, ao mesmo tempo em que é dificultada pelas barreiras existentes no TGI.

SCB e Permeabilidade

- ✓ absorção transcelular
 - ✓ difusão passiva
 - ✓ transporte mediado por carreador (passivo ou ativo)
- ✓ absorção paracelular
- ✓ endocitose
 - ✓ fagocitose: partículas superiores a 0,2 μm
 - ✓ pinocitose: fluido contendo fármaco

Fig. 1. GI membrane transport. The transport through the enterocyte barrier can be generally divided into active, passive and specialized transport; and into a paracellular and transcellular route.

R. Löbenberg, G.L. Amidon

European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 50 (2000) 3-12

SCB e Permeabilidade

- ✓ membrana celular de características lipídicas

SCB e Permeabilidade

- ✓ muco:
 - ✓ reveste as células epiteliais intestinais
 - ✓ camada de água pode dificultar a absorção de fármacos altamente lipofílicos
 - ✓ apresenta espessura de 100 a 500 μm
 - ✓ ligação de fármacos ao muco pode diminuir sua absorção (tetraciclina, cefalosporinas, fenilbutazona)

SCB e Permeabilidade

- ✓ junções íntimas

SCB e Permeabilidade

Proteínas de efluxo:

- ✓ proteínas transportadoras
- ✓ transportam seu substrato contra gradiente de concentração
- ✓ são expressas nos enterócitos, contribuindo para a função de barreira bioquímica do intestino (juntamente com o metabolismo intestinal)

BCS e Dissolução

Para ser registrado, o medicamento deve passar por uma série de ensaios físico-químicos, entre os quais incluem-se os ensaios de dissolução.

Estes ensaios também devem ser realizados na ocorrência de alterações pós-registro e incluem:

- ✓ teste de dissolução;
- ✓ perfil de dissolução nas condições farmacopéicas;
- ✓ perfil de dissolução em diversas condições.

Teste de dissolução

É realizado submetendo-se a forma farmacêutica a condições padronizadas de dissolução, durante intervalo de tempo pré-determinado, efetuando-se uma única coleta de amostra ao final deste intervalo e determinando-se a porcentagem total de fármaco dissolvido.

Eventualmente, no caso de formas farmacêuticas de liberação modificada, realiza-se coleta de duas amostras.

O resultado é expresso na forma de porcentagem do fármaco presente na forma farmacêutica dissolvido no intervalo de tempo.

Perfil de dissolução

É realizado submetendo-se a forma farmacêutica a condições padronizadas de dissolução, durante intervalo de tempo pré-determinado, efetuando-se diversas coletas de amostras durante o intervalo.

O resultado é expresso na forma de uma curva de porcentagem do fármaco presente na forma farmacêutica dissolvido em função do tempo.

Condições de dissolução

Aparatos de dissolução:

- ✓ Aparato 1: cesta
- ✓ Aparato 2: pás

Condições de dissolução

Aparatos de dissolução:

- ✓ Aparato 3: cilindros recíprocos (Bio-Dis)

Condições de dissolução

Aparatos de dissolução:

- ✓ Aparato 4: célula de fluxo

Perfil de dissolução

ABELA VIII - Quantidade média de fluocortolona dissolvida (%) em função do tempo, ao se utilizar os perfis A, B e C à dissolução (aparato 1, FHC 0,1 N, 100 rpm e 37 °C).

Tempo (min)	Quantidade dissolvida (%)					
	A		B		C	
0,0	NQ	NQ	NQ	NQ	NQ	NQ
2,5	16,3	3,0	21,7	4,6	NQ	NQ
5,0	39,6	25,9	72,5	64,8	2,1	5,5
7,5	55,7	40,5	96,2	95,3	8,0	16,4
10,0	70,0	54,0	98,2	98,2	11,9	23,8
15,0	91,4	74,9	100,0	99,9	17,1	31,4
20,0	100,8	89,1	100,0	100,4	23,8	46,3
30,0	103,8	100,2	99,6	103,5	32,7	62,8

NQ = não quantificável

FIG. 8A.1 - Quantidade média de fluocortolona dissolvida (%) em função do tempo, ao se utilizar os perfis A, B e C à dissolução (aparato 1, FHC 0,1 N, 100 rpm e 37 °C).

Avaliação biofarmacética in vitro de comprimidos de fluocortolona

Valentina Portet, Fátima Yamamoto, Mônica Aragão

Departamento de Farmácia, Faculdade de Ciências Farmacéuticas, Universidade de São Paulo

Revista Brasileira de Ciências Farmacéuticas

Volume 10 Número 1 (Abril/Junho) 2002

Vol. 10 - N. 1 - Jul/Abr. 2002

Condições de dissolução

Volume de meio:

- ✓ cesta (Aparato 1) e pá (Aparato 2): 900 mL
- ✓ bio-dis: 250 mL
- ✓ célula de fluxo: 1000 mL a ...
- ✓ deve garantir condições *sink*: volume do solvente 3 ou mais vezes maior em relação ao volume da solução com concentração de saturação.
- ✓ fármacos pouco solúveis: cubas de 4 L; uso de surfactantes.

Condições de dissolução

Agitação:

- ✓ difusão das moléculas do soluto através da camada de difusão é diretamente proporcional à mobilidade das moléculas e inversamente proporcional à sua espessura
- ✓ agitação: diminui espessura da camada de difusão e mantém condições *sink*
- ✓ altas velocidades de agitação: perda da capacidade de diferenciação entre perfis
- ✓ Cesta (Aparato 1): 50 a 100 rpm
- ✓ Pás (Aparato 2): 50 a 100 rpm
- ✓ Bio-Dis (Aparato 3): 5 a 40 rpm
- ✓ Células de fluxo (Aparato 4): 5 a 30 mL/min

Condições de dissolução

Temperatura:

- ✓ solubilidade é dependente da temperatura: influência sobre solubilidade e velocidade de dissolução
- ✓ maioria dos sólidos tem dissolução favorecida pelo aumento de temperatura
- ✓ temperatura empregada nesses testes normalmente é padronizada em $37,0 \pm 0,5$ °C

Condições de dissolução

Composição do meio:

- ✓ características da forma farmacêutica, solubilidade do fármaco, condições *in vivo*.
- ✓ pH, presença de tensoativos, presença de ar.
- ✓ água, suco gástrico artificial, suco entérico artificial, meios biorrelevantes.

Meios biorrelevantes

O emprego de ensaios de dissolução vem evoluindo do tradicional teste de controle de qualidade para um teste *in vitro* substituto da bioequivalência.

Neste contexto, surgiram os meios de dissolução biorrelevantes:

- ✓ FaSSIF: Fasted State Simulated Intestinal Fluid
- ✓ FeSSIF: Fed State Simulated Intestinal Fluid

Meios biorrelevantes

	Quantidade para 1L	
	FaSSIF	FeSSIF
NaH ₂ PO ₄	3,9 g	-
NaOH	pH 6,5 (qs)	pH 5 (qs)
Taurocolato Na	3 mM	15 mM
Lecitina	0,75 mM	3,75 mM
NaCl	7,7 g	11,874 g
Ácido acético	-	8,65 g

Comparação de perfis de dissolução f1 e f2

- ✓ f1
fator de diferença (f1) indica a diferença entre dois perfis de dissolução
- ✓ f2
fator de similaridade (f2) indica a similaridade entre dois perfis de dissolução

f1

$$f_1 = \left[\frac{\sum_{t=1}^n |R_t - T_t|}{\sum_{t=1}^n R_t} \right] \cdot 100$$

Onde:

- ✓ n = número de pontos;
- ✓ R_t = dissolução do referênciã no tempo t;
- ✓ T_t = dissolução do teste no tempo t

Curvas semelhantes: f1 = 0 a 15

f2

$$f_2 = 50 \log \left\{ \left[1 + \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n w_t (R_t - T_t)^2 \right]^{-0.5} \right\} \cdot 100$$

Onde:

- ✓ n = número de pontos;
- ✓ R_t = dissolução do referênciã no tempo t;
- ✓ T_t = dissolução do teste no tempo t

Curvas semelhantes: f2= 50 a 100

Pré - requisitos

- ✓ mínimo de 3 a 4 pares de pontos;
- ✓ mesmos tempos;
- ✓ somente um par acima de 85 % de dissolução;
- ✓ CV < 20 % para os primeiros pontos
- ✓ CV < 10 % para os últimos pontos

CIVIV

Qual é a característica *in vitro* mais indicada para estabelecer CIVIV?

CIVIV

Característica físico-químicas dissolução *in vitro*

CIVIV

Propriedades biológicas absorção *in vivo*

CIVIV A

Teoria estatística dos momentos Tempo Médio de Dissolução

CIVIV B

Teoria estatística dos momentos Tempo Médio de Residência

Parâmetros de dissolução *in vitro* Q_{diss} , T_{diss} , ED

CIVIV C

Parâmetros de absorção *in vivo* C_{max} , T_{max} , ASC

Desenvolvimento de Correlação IVIV

Característica físico-químicas dissolução *in vitro*

Propriedades biológicas absorção *in vivo*

1 Considerações relativas às formulações

- ✓ três ou mais formulações;
- ✓ diferentes velocidades de liberação: lenta, moderada e rápida;
- ✓ diferença entre as velocidades deve ser adequada (>10%).

1 Considerações relativas às formulações

Formulações de comprimidos de diclofenac de sódio (DCL) obtidos por compressão direta

Componente	Quantidade por comprimido (mg)		
	100	150	200
DCL	100	150	200
HPMC	20	35	55
Lactose	77	204	143,15
Calcólio microcristalino	-	-	61,25
Estereato de Magnésio	3	10,5	10,5
Sol aquoso PVP 10%	-	-	-
Total	200	350	350

Formulações de comprimidos de diclofenaco de sódio (DCL) obtidos por granulação via úmida

Componente	Quantidade por comprimido (mg)											
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	F1	F2	F3
DCL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
HPMC	15	165	165	165	165	207	207	207	207	132,5	132,5	132,5
Lactose	147	48	48	68,75	68,75	134,75	110,25	68,75	110,25	110,25	110,25	110,25
Calcólio microcristalino	63	42	42	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Estereato de Magnésio	5	5	5	-	-	-	-	-	-	11,5	11,5	11,5
Sol aquoso PVP 10%	0,4	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PVP (sol a 20%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,75	8,75	8,75
HPMC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,25	6,25	6,25
Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5
Total	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350

dureza inadeq. dureza inadeq. dureza inadeq.

dificuldades de granulação

2 Método *in vitro*

- ✓ mesmo sistema para todas as formulações a serem testadas;
- ✓ método discriminatório.

2 Metodologia *in vitro*

Aparato 2, 50 rpm, pH 6,8

2 Metodologia *in vitro*

Aparato 2, 100 rpm, pH 6,8

2 Metodologia *in vitro*

Aparato 3, 15 rpm

2 Metodologia *in vitro*

Aparato 4, 20 mL/min, pH 6,8, sistema fechado

1 Considerações relativas às formulações

Formulações de comprimidos de diclofenaco de sódio (DCL) obtidos por granulação via úmida

Componente	Quantidade por comprimido (mg)														
	A1	A2	A3	B3	C3	D3	E1	E2	E3	F1	F2	F3	G1	G2	G3
DCL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
HPMC	35	105	175	105*	105	105	35*	70*	105*	35*	52,5*	60*	70*	100*	100*
Lactose	147	98	49	98	85,75	85,75	134,75	110,25	85,75	122,5	110,5	105	98	74	110,5
Celulose microcristalina	63	42	21	42	36,75	36,75	57,75	47,25	36,75	52,5	47	73	70	32	47
Starch 1500	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
PVP (sd a 10%)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-	17,5	17,5	17,5	17,5	35
PVP (sd a 30%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
Água	-	-	-	-	-	-	17,5	17,5	17,5	17,5	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
Total	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350

*dividido em 2 sações (intragranulo e extragranulo)

3 Ensaio *in vivo*

- ✓ Ensaios do tipo aberto, cruzado e aleatório;
- ✓ 6 a 36 voluntários saudáveis;
- ✓ Seleção de voluntários;
- ✓ Padronização do ensaio;
- ✓ Coleta de amostras biológicas;
- ✓ Inclusão de tratamento de referência (solução IV);
- ✓ As diferenças observadas *in vivo* deveriam ser as mesmas observadas *in vitro*.

3 Ensaio *in vivo*

4 Estabelecimento da correlação

- ✓ Definir os parâmetros *in vivo* e *in vitro* para a correlação;
- ✓ Caso o teste *in vitro* permita diferenciar as diferentes formulações, mas não permita estabelecer correlação, devem-se testar outros métodos *in vitro*.

Variáveis *in vivo*

- ✓ Perfil de absorção:

- ✓ Métodos modelo-dependentes:
 - ✓ Wagner-Nelson (modelo monocompartimental);
 - ✓ Loo-Riegelman (modelo multicompartmental).
- ✓ Métodos modelo-independentes:
 - ✓ Convolução e deconvolução.

Variáveis *in vivo* – Wagner-Nelson

$$A_{abs} = A_i + A_{el} \quad \rightarrow \quad A_{abs} = V_D \cdot C_i + k_{el} \cdot V_D \cdot AUC_0^t$$

Mas:

$$A_i = V_D \cdot C_i$$

E:

$$\frac{dA_{el}}{dt} = k_{el} \cdot A_i$$

$$\frac{dA_{el}}{dt} = k_{el} \cdot V_D \cdot C_i$$

$$dA_{el} = k_{el} \cdot V_D \cdot C_i \cdot dt$$

$$A_{el} = k_{el} \cdot V_D \cdot AUC_0^t$$

A_{abs} = qtd. absorvida
 A_i = qtd. no organismo
 A_{el} = qtd. eliminada

V_D = vol. distribuição
 C_i = conc. plasmática

k_{el} = cle. de vel. eliminação

AUC = área sob a curva Cxt

Variáveis *in vivo* – Wagner-Nelson

$$A_{abs} = V_D \cdot C_i + k_{el} \cdot V_D \cdot AUC_0^t$$

$$A_{abs} = V_D \cdot (C_i + k_{el} \cdot AUC_0^t)$$

$$\frac{A_{abs}}{A_{\infty}} = \frac{V_D \cdot (C_i + k_{el} \cdot AUC_0^t)}{A_{\infty}}$$

$$\frac{A_{abs}}{A_{\infty}} = \frac{V_D \cdot (C_i + k_{el} \cdot AUC_0^t)}{k_{el} \cdot V_D \cdot AUC_0^{\infty}}$$

$$\frac{A_{abs}}{A_{\infty}} = \frac{C_i + k_{el} \cdot AUC_0^t}{k_{el} \cdot AUC_0^{\infty}}$$

$A_{\infty} = F \cdot D$ F = biodisponibilidade
 D = dose

$$Cl = \frac{V_D \cdot C_{50}}{E \cdot D} \quad Cl = clearance$$

$$F \cdot D = Cl \cdot AUC_0^{\infty}$$

$$Cl = k_{el} \cdot V_D$$

$$F \cdot D = k_{el} \cdot V_D \cdot AUC_0^{\infty}$$

Variáveis *in vivo* – Wagner-Nelson

Fração absorvida:

$$F_1 = \frac{A_{abs}}{A_e} = \frac{C_i + k_{el} \cdot AUC_0^i}{k_{el} \cdot AUC_0^e}$$

Fração a ser absorvida:

$$F_{iabs} = 1 - \frac{A_{el}}{A_e}$$

Decaimento plasmático

Gráfico Wagner-Nelson

www.uv.es/~mbermejo/DissolutionC

Variáveis *in vivo* – Loo-Riegelman

$$A_{abs} = A_{t1} + A_{t2} + A_{el}$$

Fração absorvida:

$$F_1 = \frac{C_i + k_{el} \cdot AUC_{0-i} + X_{p1} / V_c}{k_{el} \cdot AUC_{0-\infty}}$$

Decaimento plasmático

Gráfico Loo-Riegelman

www.uv.es/~mbermejo/DissolutionC

Variáveis *in vivo* – Deconvolução

- ✓ **Deconvolução:** permite calcular a percentagem de absorção *in vivo* a partir dos dados obtidos após administração oral e IV do mesmo fármaco.
- ✓ **Convulsão:** é a operação inversa, que permite calcular as concentrações plasmáticas a partir dos dados de percentagem de absorção *in vivo*.

Variáveis *in vivo* – Deconvolução

Equação geral:

$$C_{VOm} = \frac{1}{D_{IV}} \sum_{i=1}^n \frac{\Delta A_i}{\Delta t_i} \cdot \Delta AUC_{IV}^{(m-i)}$$

concentração por via oral (points to C_{VOm})
dose IV (points to D_{IV})
velocidade de absorção (quantidade absorvida no intervalo de tempo) ? (points to $\frac{\Delta A_i}{\Delta t_i}$)
fração da ASC IV (points to $\Delta AUC_{IV}^{(m-i)}$)

Variáveis *in vivo* - Deconvolução

Variáveis *in vivo* - Deconvolução

$$C_{VOm} = \frac{1}{D_{IV}} \sum_{i=1}^n \frac{\Delta A_i}{\Delta t_i} \cdot \Delta AUC_{IV}^{(m-i)}$$

tempo	C_{VO}	C_{IV}
0	0	0
t1	C_{VO1}	C_{IV1}
t2	C_{VO2}	C_{IV2}
tn	C_{VO_n}	C_{IV_n}

Variáveis *in vivo* - Deconvolução

Variáveis *in vivo* - Deconvolução

Variáveis *in vitro* - Dissolução

Correlação nível A

Correlação nível A

Variáveis *in vivo* - TMR

$TMR = \frac{AUMC}{AUC}$

Time (h)	Conc (µg/mL)	AUC (µg ² /h/L)	Conc*t (µg ² /h/mL)	AUMC (µg ² h ² /L)
0,00	0,00		0,00	
0,50	0,21	0,05	0,10	0,03
1,00	0,09	0,08	0,09	0,05
1,50	0,13	0,06	0,19	0,07
2,00	0,39	0,11	0,65	0,21
2,50	0,35	0,17	0,67	0,38
3,00	0,37	0,18	1,12	0,50
3,50	0,48	0,21	1,67	0,70
4,00	0,74	0,30	2,96	1,16
5,00	1,07	0,90	5,35	4,15
6,00	0,65	0,86	3,91	4,63
7,00	0,31	0,48	2,17	3,04
8,00	0,24	0,27	1,89	2,03

AUC (µg²h/L)= 3,68 AUMC (µg²h²/L)= 16,95

TMR (h)= 4,60

Variáveis in vitro - TMD

$$TMD = \frac{ABC}{Q_{diss}^{\infty}}$$

Correlação nível B

Formulação	TMD (h)	TMR (h)
F1	2,60	3,54
F2	5,36	5,16
F3	7,65	5,57

$$TMR = 0,4084 \cdot TMD + 2,6318$$

Variáveis in vivo

- ✓ Concentração máxima (Cmax);
- ✓ Área sob a curva "concentração plasmática vs tempo" parcial e total (AUC_{0-t}, AUC_{-∞});
- ✓ Tempo para atingir Cmax (Tmax);
- ✓ Constante de velocidade de absorção.

Variáveis in vitro

- ✓ Quantidade dissolvida;
- ✓ Tempo de dissolução;
- ✓ Constante de velocidade de dissolução.

Variáveis in vitro

Ordem zero: $Q_t = Q_0 + k_d t$

Primeira ordem: $\log Q_t = \log Q_0 + \frac{k_1 t}{2,303}$

Higuchi: $Q_t = k_{H1} \sqrt{t}$

Hixson-Crowell: $\sqrt[3]{Q_t} - \sqrt[3]{Q_0} = k_3 t$

Korsmeyer-Peppas: $\frac{M_t}{M_{\infty}} = k_k t^n$

Q_t: quantidade dissolvida
 Q₀: quantidade inicial dissolvida
 Q_i: quantidade inicial n.f.f.
 Q_r: quantidade remanescente na f.f.
 M_t/M_∞: fração dissolvida
 k₀: constante de ordem zero
 k₁: constante de primeira ordem
 k_H: constante de Higuchi
 k₃: constante de Hixson-Crowell
 k_k: constante de Korsmeyer

Correlação nível C

Formulação	Q _{diss} 6h (%)	C _{max} (mg/L)
F1	95,0	1,08
F2	69,2	0,72
F3	52,1	0,42

$$C_{max} = 0,0153 \cdot Q_{diss6h} - 0,3636$$

5 Avaliação da correlação obtida

- ✓ Previsibilidade interna: baseada nos dados utilizados para definir o modelo de correlação IVIV;
- ✓ Previsibilidade externa: baseada em conjuntos de dados adicionais.

Correlação nível A - Convolução

Correlação nível A - Convolução

Equação geral:

$$C_{VOm} = \frac{1}{D_{IV}} \sum_{i=1}^n \frac{\Delta A_i}{\Delta t_i} \cdot \Delta AUC_{IV}^{(m-i-1)}$$

concentração por via oral ?
 dose IV
 velocidade de absorção (obtida a partir da correlação IVIV)
 fração da ASC IV

Correlação nível A - Previsibilidade interna

Correlação nível A - Previsibilidade interna

Correlação nível A - Previsibilidade externa

Correlação nível B

$$TMR = 0,4084 \cdot TMD + 2,6318$$

Formulação	TMD (h)	TMR _{obs} (h)	TMR _{prev} (h)	Erro (%)
F1	2,60	3,54	3,69	4,4
F2	5,36	5,16	4,82	-6,6
F3	7,65	5,57	5,75	3,3

Correlação nível C

$$C_{max} = 0,0153 \cdot Q_{diss\ 8h} - 0,3636$$

Formulação	Q _{diss 8h} (%)	C _{max obs} (mg/L)	C _{max prev} (mg/L)	Erro (%)
F1	95,0	1,08	1,09	0,7
F2	69,2	0,72	0,69	-4,0
F3	52,1	0,42	0,43	3,5
Ranbaxy	77,5	1,00	0,82	-17,8
Voltaren Retard	61,5	0,81	0,58	-28,7

Correlação nível C

$$C_{max} = 0,0169 \cdot Q_{diss\ 8h} - 0,6774$$

Formulação	Q _{diss 8h} (%)	C _{max obs} (mg/L)	C _{max prev} (mg/L)	Erro (%)
F1	100,7	1,08	1,02	-5,0
F2	88,0	0,72	0,81	12,0
F3	63,1	0,42	0,39	-7,0
Ranbaxy	95,4	1,00	0,94	-6,5
Voltaren Retard	71,1	0,81	0,52	-35,3

Informações adicionais

SCB e CIVIV

Movimento do fármaco através do TGI*:

SCB e CIVIV

SCB e CIVIV

Classe	Sol.	Per.	Expectativa de correlação IVIV
I	Alta	Alta	Positiva para vel. diss. < vel. esv. gástrico
II	Baixa	Alta	Positiva se vel. diss. <i>in vitro</i> ≈ vel. diss. <i>in vivo</i>
III	Alta	Baixa	Limitada ou negativa
IV	Baixa	Baixa	Limitada ou negativa

SCB e CIVIV

- ✓ fármaco:
 - ✓ classe biofarmacêutica
 - ✓ a dissolução **deve ser** o fator limitante da absorção

CIVIV

- ✓ FDA: corresponde a uma relação causal entre dois parâmetros, no caso, a **velocidade de dissolução *in vitro*** e a **velocidade de entrada *in vivo***.