Universidade de São Paulo (USP)
Escola de Engenharia de Lorena (EEL)
Engenharia Ambiental

Cloroplasto e Fotossíntese

Disciplina: Biologia Geral
Prof: Tatiane da Franca Silva

Fotossíntese: Captura da Energia Luminosa

- ✓ Energia solar é fonte de toda a energia biológica
- ✓ Conversão de Energia Luminosa em Energia Química

Organismos Fotossintetizantes

❖ Eucarioto – Algas e Plantas

Presença de organela especializada: **Cloroplasto**

✓ Origem da organela: teoria do Endossimbionte

✓ *Hatena arenicola* e seu Endossimbionte *Nephroselmis*

Figure 1. *Hatena arenicola* gen. et sp. nov. A. Ventral view of a symbiont-bearing cell showing two flagella and an ovoid of the symbiotic organism. B,C. Symbionts. D. The same cell as in different focal plane, showing two rows of conspicuous, typical apicoplasts. E. A cell lacking the symbiont. F. A cell with an "immature" symbiont. G-L. Cell division in *Hatena arenicola*, where the apicoplast is distributed to one of the daughter cells. Each panel shows a different individual at a different stage in cell division. N: nucleus. S: symbiont. The scale bar is 10 μm in A, D, E.

Protist, Vol. 157, 401–415, August 2006
<http://www.elsevier.com/locate/ympro>
Published online date 7 August 2006

Estrutura do Cloroplasto

- ✓ Membrana Externa
- ✓ Membrana Interna
- ✓ Estroma
- ✓ Tilacóides
- ✓ Grana

Mitocôndria X Cloroplasto

Procaríotos Fotossintetizantes

- ❖ Bactérias fotossintéticas
- Ex: Cianobactérias

Reações Luminosas: Fotossistemas

❖ Unidades fotossintéticas localizadas na membrana do Tilacoide

Pigmentos Fotossintetizantes

Moléculas capazes de absorver a energia do Sol

- ✓ Clorofila A
- ✓ Clorofila B
- ✓ Carotenóides

Estrutura dos Fotopigmentos

- ❖ Estrutura policíclica
- ❖ Cadeia lateral hidrofóbica

Transferência de Energia

Reações Luminosas: Fotossistemas

- ✓ **Complexo Antena:** captura a energia da Luz
- ✓ **Centro de Reação:** sítio onde a energia da Luz pode ser utilizada

Dois Tipos de Fotossistemas

- ✓ **Fotossistema I (PSI):** Absorve na faixa de 700 nm
- ✓ **Fotossistema II (PSII):** Absorve na faixa de 680nm
- ✓ Diferem quanto ao doador de elétrons

Fotossistemas I e II

✓ PSII e PSI : Conectados pela Cadeia Transportadora de Elétrons

Fotossistema II: Fotólise da Água

Fotossíntese Artificial

- ❖ Reprodução artificial de um dos Fotossistemas
- ❖ Fotólise da água
- ❖ Geração de Oxigênio e Hidrogênio

Carreador Energético

❖ NADPH: Nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato

Figure 3-35 Essential Cell Biology, 2/e. (© 2004 Garland Science)

Reações Luminosas

- ❖ Transporte de elétrons gera gradiente de prótons
- ❖ ATPsintase
- ❖ Produtos : O_2 , $NADPH$ e ATP

Reações Luminosas

- ❖ Acúmulo de Prótons no espaço do Tilacoide
- ❖ Síntese de ATP no Estroma

Reações de Fixação do CO_2 ou Ciclo de Calvin

- ❖ 1 molécula de Ribulose fixa 1 CO_2
- ❖ Fixação de $3CO_2$ produz: 1 Gliceraldeído 3 fosfato

Ciclo de Calvin: Estágio de Fixação do Carbono

Rubisco

✓ Rubisco (Ribulose-Bisfosfato Carboxilase Oxigenase)

Oxigenase?

CO₂ e O₂ competem pela Rubisco

Quando a Rubisco utiliza O₂ no lugar de CO₂

Fotorrespiração

Fotossíntese X Fotorrespiração

✓ Reações simultâneas e competidoras

Carboxilação e Oxigenação

Fotorrespiração reduz a eficiência da **Fotossíntese!!**

Fotorrespiração e Fotossíntese

✓ O balanço é determinada por fatores Ambientais como :
Temperatura, [O₂] e [CO₂]

Concentração de CO₂ ao longo do tempo

Fotorrespiração e Fotossíntese

✓ O balanço é determinada por fatores Ambientais como :
Temperatura, [O₂] e [CO₂]

Metabolismo C4 em Plantas Tropicais

✓ **Mesófilo:** Fixação do CO₂ em Molécula de 4 C (Oxalacetato ou Aspartato)

✓ **Bainha:** Descarboxilação :liberação do CO₂ para o Ciclo de Calvin

✓ **Separação espacial**

Fotossíntese e Respiração

✓ **Ponto de Compensação:**

CO₂ produzido na Respiração = CO₂ usado na Fotossíntese

Como o CO₂ chega até as células fotossintetizantes?

✓ Caminho de difusão do CO₂ é o mesmo do vapor de água e O₂

✓ Através de estruturas conhecidas como **Estômatos**

Estômatos abertos:

CO₂ ← **Entra**
H₂O → **Sai**

✓ **Desafio das Plantas:** Absorver CO₂ sem perder Água

Metabolismo CAM

✓ Controle de perda de água e diminuição da

Fotorrespiração

✓ Modificações na abertura dos estômatos

✓ Abrem os **Estômatos a noite**

• Temporal: Dia e noite

• Espacial: Vacúolo e Cloroplasto

FIGURE 6.12 Crassulacean acid metabolism (CAM). Temporal separation of CO₂ uptake from photosynthetic reactions. CO₂ uptake and fixation take place at night, and decarboxylation and refixation of the internally released CO₂ occur during the day. The adaptive advantage of CAM is the reduction of water loss by transpiration, achieved by the stomatal opening during the night.

Eficiência no Uso da Água

✓ Distribuição do Uso da Água no Brasil

Fonte: SANASA – Sociedade de Abastecimento de Água 2011

Gramas de Água perdida / para cada grama de CO2 fixado

1º Lugar: CAM- 50 a 100 g

2º Lugar : C4-250 a 300g

3º Lugar : C3- 400 a 400 g

Metabolismo	C3	C4	CAM
Distribuição	Ampla	Tropical, Subtropical	Desértico
Produto da Fixação de CO2	Fosfoglicerato	Malato , Aspartato	Malato
Fotorrespiração	40% da Fotossíntese	Não se detecta	Baixa
Crescimento (g/m ² dia)	5-20	40-50	0,2
Produtividade (t/ha ano)	10-30	60-80	<10
Exemplos	Trigo, cevada	Milho, Cana-de-açúcar	Abacaxi, cactos