QFL4520 – Química Ambiental II

Parte I – Conceitos sobre o Meio Ambiente

Prof. Dr. Reinaldo C. Bazito

bazito@iq.usp.br

Parte I - Conceitos sobre o Meio Ambiente

- *A Terra;*
- *Meio Ambiente / Compartimentos Ambientais;*
- *Ciclos Biogeoquímicos;*
- *Compostos de importância ambiental;*
- *Influência Humana sobre o Meio Ambiente (poluição, Química Verde)*

Aula 3:

- *Compostos de importância ambiental;*

Introdução à Química Ambiental

- *Influência Humana sobre o Meio Ambiente*
- *Espécies químicas de interesse ambiental;*
- *Classes de compostos de interesse;*
- *Distribuição dessas espécies no Meio Ambiente*

Influência Humana sobre o Meio Ambiente

Percepção da Influência Humana

Industrialização

**Efeitos sobre
habitat e saúde**

**Preocupação
Ambiental**

<http://www.nickelinthemachine.com/wordpress/wp-content/uploads/smog-e.jpg>

- 1952: Grande Smog de Londres
- 1956: Clean Air Act (UK)

Contaminação

Origem

**Liberação de
poluente/contaminante**

Efeitos Diversos

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2011/04/14/article-0-005C279C00000258-805_634x440.jpg

Derrame de Petróleo

Bifenilas Policloradas (PCBs)

Bifenila policlorada

- Persistentes
- Distribuição Global
- Bioacumulação

Bifenilas Policloradas (PCBs)

Bio-magnificação

Áreas Contaminadas em SP

Espécies químicas de interesse ambiental

Espécies químicas no desodorante

ciclometicona *α-isometil ionona* *propileno carbonato* *"butilfenil propional"*
2-(4-tert-butilbenzil)propionaldeído *cumarina* *geraniol* *linalol* *citral* *cloreto de alumínio*

Espécies químicas no repelente

Condição sob pressão. Guardar em ambiente fresco e ventilado.
Ingrediente ativo: Diethyl Toluamide - 15%
COMPOSIÇÃO: Diethyl Toluamide, Alcohol, Parfum, Isobutane /Propane, Benzyl Salicylate, Coumarin, Hydroxycitronellal, Limonene, Linalool, Butylphenyl Methylpropional.

DEET (dietil toluamida)

salicilato de benzila

hidroxicitronelal

limoneno

Espécies químicas no creme dental

triclosano

sorbitol

Copolímero PVM/MA

Copolímero poli(vinilmetiléter)-alt-(anidrido maleico)

sacarina

laurilsulfato de sódio (SDS)

dióxido de titânio

carrageenan

FD&C Azul no. 1 (Brilliant Blue FCF)

A poluição interior, por David Ewing Duncan

*“Na verdade, sou um escritor empenhado em uma jornada de autodescoberta química. No outono passado, fui submetido a exames para detectar **320 substâncias químicas** que poderia ter ingerido juntamente com alimentos e bebidas, com o ar que respiro e através de produtos que entram em contato com a minha pele. Eles incluem substâncias químicas a que posso ter sido exposto décadas atrás, como o **DDT** e as bifenilas policloradas (**PCBs**, polychlorinated biphenyls); poluentes, como **chumbo**, **mercúrio** e **dioxinas**; **pesticidas** mais recentes; **ingredientes de plástico**; e os compostos quase milagrosos que nos espreitam a vida moderna, como xampus cheirosos, panelas antiaderentes e tecidos resistentes à água e ao fogo.”*

National Geographic

Edição 79/ Outubro de 2006

<http://viajeaqui.abril.com.br/materias/a-poluicao-interior>

OS EXAMES REALIZADOS PELO AUTOR

David Ewing Duncan submeteu-se a uma bateria de exames de sangue e urina para detectar resquícios de substâncias químicas, metais e poluentes acumulados desde seu nascimento. Seu perfil químico nada deixa a desejar a uma plantação de cereais no meio-oeste americano em termos de variedade de pesticidas – de 28 testados, 16 estavam em seu corpo. Também não convém atear fogo a ele, pois seu sangue é rico em BDE-47, retardante de fogo que está sendo retirado do mercado. Será que isso faz de Duncan uma anomalia numa época em que somos tão dependentes de produtos químicos? De maneira nenhuma. Na verdade, é possível que não haja nada de extraordinário em seu perfil. Seus dados estão dentro dos níveis médios dos americanos.

320 SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TESTADAS | 165 SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS ENCONTRADAS

UMA DIETA TÓXICA

● **BDE-47 (tetra)**
Resultado: 249 ppb*
Média segundo os CDC: n/d

EFEITOS NA SAÚDE (PROVÁVEIS)

- tireóide
- desenvolvimento neurológico

Em processo de retirada do mercado, o retardante de fogo está presente em muitos produtos.

● **Dieldrin**
Resultado: 5,11 ppb
Média segundo os CDC: n/d

EFEITOS NA SAÚDE

- sistema neurológico
- rins

Pesticida antes usado contra cupim e outros insetos, ainda é comum.

● **p,p-DDE**
Resultado: 256 ppb
Média segundo os CDC: 295 ppb

EFEITOS NA SAÚDE (PROVÁVEIS)

- sistema reprodutor
- fígado

Subproduto do DDT que se acumula no corpo, com efeitos similares aos do pesticida, proibido.

● **mMeP**
Resultado: 34,8 ppb
Média segundo os CDC: 1,15 ppb

EFEITOS NA SAÚDE (PROVÁVEIS)

- sistema reprodutor

Faz parte de um grupo de substâncias, os ftalatos, usadas em plásticos.

● **Mercúrio**
Primeiro exame: 5 mg/l
Segundo exame: 12 mg/l
Limite de envenenamento segundo os CDC: 10 mg/l

EFEITOS NA SAÚDE

- sistema neurológico
- sistema reprodutor

O nível desse metal em Duncan dobrou depois de ele comer linguado-gigante e peixe-espada.

* PARTES POR BILHÃO

A poluição interior,
David Ewing Duncan
National Geographic

Edição 79/ Outubro de 2006, p. 106

↑ > Current Issue > vol. 110 no. 42 > Stephen J. Trumble, 16922–16926, doi: 10.1073/pnas.1311418110

Blue whale earplug reveals lifetime contaminant exposure and hormone profiles

Stephen J. Trumble^a, Eleanor M. Robinson^b, Michelle Berman-Kowalewski^c, Charles W. Potter^d, and Sascha Usenko^{b,e,1}

Author Affiliations

Edited by George M. Woodwell, retired, Woods Hole, MA, and approved August 13, 2013 (received for review June 27, 2013)

Blue whale earplug reveals lifetime contaminant exposure and hormone profiles

Stephen J. Trumble, Eleanor M. Robinson, Michelle Berman-Kowalewski, Charles W. Potter, and Sascha Usenko
PNAS 2013: 110 (42), p.16922-16926; doi:10.1073/pnas.1311418110

<http://www.pnas.org/content/110/42/16922.full>

<http://phenomena.nationalgeographic.com/2013/09/16/biography-of-a-blue-whale-told-through-ear-wax/>

Compostos do Ciclo do Carbono no meio ambiente

Fig. 1.

Illustration of a blue whale earplug.

(A) Schematic diagram showing the location of the earplug within the ear canal: (a) whale skull, (b) tympanic bulla, (c) pars flaccida/tympanic membrane (“glove finger”), (d) cerumen (earplug), (e) external auditory meatus, (f) auditory canal, (g) muscle tissue, (h) blubber tissue, and (i) epidermis.

(B) Extracted blue whale earplug; total length 25.4 cm.

(C) Earplug longitudinal cross-section.

(D) View (20×) of earplug cross-section showing discrete laminae.

Compostos do Ciclo do Carbono no meio ambiente

Fig. 2.

Reconstructed chemical profiles measured in a blue whale earplug. Each measurement reflects the mean concentration during lamina production. (A) Cortisol levels increased with age, whereas testosterone peaked at 120 mo (~100× increase).

(B) PBDE 47 profiles demonstrate considerable depuration from mother during periods of early development. (C) Historic-use pesticide profiles of DDT and metabolites and nonachlor compounds.

(D) PCB profiles showed trends similar to the other pesticides with the highest levels measured in the first lamina.

(E) Total mercury and organic contaminant deposition accumulation rate.

(F) Life span mercury profile shows two unique peaks at 60–72 and 120–126 mo.

Compostos do Ciclo do Carbono no meio ambiente

Fig. 3.

Male blue whale blubber (left axis) and earplug (right axis) contaminant profiles. Blubber was sampled near muscle blubber interface and compared with the lamina corresponding to 72–78 mo in the earplug, which represents a midpoint in the organism lifespan.

Classes de compostos orgânicos de interesse ambiental

Hidrocarbonetos

alifáticos saturados

metano

etano

butano

**decomposição microbiana anaeróbica
atividade industrial**

n-alcanos (impar)

**cera epicuticular de plantas
ambientes limpos**

alcanos ramificados

combustão veicular

cíclicos e insaturados (inúmeras fontes)

eteno (etileno)

**plantas (atividade hormonal em plantas)
combustão de madeira, carvão, etc.**

isopreno

α -pineno

mircenno

plantas

limoneno

Hidrocarbonetos

derivados do benzeno

benzeno

tolueno

o, m e p-xileno

etil benzeno

estireno

bifenila

BTEX

evaporação de gasolina, combustão de diesel

indeno

tetralina

poliaromáticos (HPA)

naftaleno

antraceno

fenantreno

perileno

pireno

benzo[a]pireno

combustão incompleta de compostos orgânicos (automóveis, cigarro, churrasco, torrada, etc.)

Álcoois, fenóis e éteres

4-nonilfenol

metanol

etanol

intermediário químico, solvente, combustível

etileno glicol

intermediário químico, solvente, agente anticongelamento

fenol

clorofenol (m = 1-5)

intermediário químico, biocidas

DBPC
2,6-di-*t*-butil-*p*-cresol
antioxidante

bisfenol A

intermediário químico

4-nonilfenol

metabólito de surfactantes não iônicos

éter etílico

1,4-dioxano

MTBE
metil-*t*-butil éter

solventes

aditivo para gasolina

epicloridrina

intermediário químico

dibenzo-*p*-dioxinas policloradas
(175 representantes)

produtos secundários da produção de fenóis clorados

dibenzo-furanos policlorados
(135 representantes)

difenil éteres polibromados
retardante de chama

degradação microbiológica em estações de tratamento de esgoto

intermediários persistentes danosos ao meio ambiente

Aldeídos, cetonas, ésteres e ácidos

formaldeído

desinfetante
intermediário químico

acetaldeído

solvente
intermediário químico

isobutiraldeído

solvente
intermediário químico
produto secundário do
tratamento de água

acroleína

intermediário químico

benzaldeído

solvente
intermediário químico

acetona

2-butanona

solventes
intermediários químicos

acetofenona

solvente
plastificante

ftalatos ($R_1, R_2 = C_1$ a C_{10})

acetato de etila

solvente

ácido tricloroacético

herbicida
produto de quebra
de compostos clorados
na atmosfera

(R,S)-mecoprop

herbicida

conservante alimentício
intermediário químico

ácido benzóico

2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético)

Compostos nitrogenados

anilina e anilinas substituídas

intermediários químicos

N,N'-dialquil/aril *p*-fenilenodiaminas

antioxidantes

triethylamina

**solvente, agente umectante,
inibidor de corrosão
propelente**

sais quaternários de amônio

surfactantes

atrazina
herbicida

azobenzeno

**intermediário químico
pesticida**

1-nitropireno
combustão

2,4-dinitro-*o*-cresol

herbicida

Dispersive Blue 79
pigmento têxtil

nitroglicerina

explosivos

TNT

RDX

Compostos sulfurados

Compostos fosforados

Glifosato ("Round Up")

[Política](#) | [Economia](#) | [Movimentos Sociais](#) | [Cidades](#) | [Internacional](#) | [Meio Ambiente](#) | [Mídia](#) | [Cult](#)
[Editoriais](#) | [Blog do Emir](#) | [Primeiros Passos](#) | [Colunistas](#) | [Opinião](#) | [Fóruns](#) | [Especiais](#) | [Principis](#)

Meio Ambiente

[Home](#) > [Meio Ambiente](#) > [Monsanto: 25 doenças que podem ser causadas pelo agrotóxico glifosato](#)

17/02/2015 - Copyleft

Monsanto: 25 doenças que podem ser causadas pelo agrotóxico glifosato

Cientistas descobriram que pessoas doentes tinham maiores níveis de glifosato em seu corpo do que as pessoas saudáveis. Conheça os resultados destas pesquisas

[Recomendar](#) 15 mil [Tweeter](#) 27 [Compartilhar](#) 0 [G+1](#) 53

A A+

Alexis Baden-Mayer - Sin Permiso

<http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-Ambiente/Monsanto-25-doencas-que-podem-ser-causadas-pelo-agrotoxico-glifosato/3/32891>

Glifosato realmente causa tudo isso?

6) **Câncer cerebral:** em um estudo comparativo entre crianças saudáveis e crianças com câncer cerebral, os pesquisadores detectaram que, se um dos pais estivera exposto ao Roundup dois anos antes do nascimento da criança, as possibilidades de ela desenvolver câncer no cérebro dobravam.

18) **Doença de Lou Gehrig:** a deficiência de sulfato no cérebro foi associada à Esclerose Lateral Amiotrófica. O glifosato altera a transmissão de sulfato do aparelho digestivo ao fígado, e poderia levar a uma deficiência de sulfato em todos os tecidos, incluindo o cérebro.

19) **Esclerose múltipla:** encontrou-se uma correlação entre uma incidência aumentada de inflamação de intestino e a Esclerose Múltipla. O glifosato poderia ser um fator causal. A hipótese é que a inflamação intestinal induzida pelo glifosato faz com que bactérias do aparelho digestivo se infiltrem no sistema circulatório, ativando uma reação imune e, como consequência, uma desordem autoimune, resultando na destruição da bainha de mielina.

Compostos halogenados

clorofórmio

bromofórmio

iodofórmio

diclorometano

1,2-dicloroetano

1,2-dibromoetano

**emissões vulcânicas
fermentação**

algas

solvente

**solvente
agente antichoque**

**combustão da vegetação
tratamento de água
combustão veicular
S_N2 com CH₃I (algas)**

1,1,1-tricloroetano

1,1,2-tricloroetano

tetracloroetano

lavagem a seco

bifenilas cloradas (PCBs)
209 representantes

terfenilas cloradas (PCTs)
8149 representantes

HCB

**tintas para impressão
papel carbono**

**capacitores e tranformadores (ascarel)
lâmpadas fluorescentes, etc.**

pesticidas

Dieldrin

Endrin

DDT

HCH

herbicidas

Defensivos agrícolas complexos e fármacos

oxadiazon
herbicida

cipermetrina
inseticida

aldicarb
inseticida, acaricida e nematocida

17-etinil estradiol
hormônio, anticoncepcional

17a-acetóxi-progesterona
hormônio

penicilina V
antibiótico

levotiroxina
hormônio

Pyriproxyfen

Governo do RS suspende larvicida Pyriproxyfen depois de relatório que associa produto à microcefalia

ONG argentina indica que a má-formação cerebral detectada em bebês que vivem em áreas onde o produto é utilizado "não é coincidência"

REDAÇÃO ÉPOCA
13/02/2016 - 16h05 - Atualizado 16/02/2016 20h17

<http://epoca.globo.com/tempo/filtro/noticia/2016/02/governo-do-rs-suspende-larvicida-pyriproxyfen-depois-de-estudo-que-associa-produto-microcefalia.html>

Microcefalia é causada por:

Pyriproxyfen?

Vacina?

Vírus Zika?

**O que ocorre com os
compostos orgânicos
no meio ambiente?**

Processos químicos, físicos e biológicos no meio ambiente

Processos químicos, físicos e biológicos no meio ambiente

Processos químicos, físicos e biológicos no meio ambiente

Processos químicos, físicos e biológicos no meio ambiente

Qual o destino de uma espécie no meio ambiente?

1) Permanecer intacto no local atual

2) Ser levado para outros locais/compartimentos por processos de partição/transporte:

- a) Para outras fases (ar, água, solo) por volatilização, dissolução, adsorção, ou precipitação;
- b) Na mesma fase, por gravidade, difusão ou advecção;
- c) Em seres vivos, por bioacumulação.

3) Transformar-se em outras espécies químicas por processos químicos ou biológicos naturais:

- a) “Intemperismo” – série de processos químicos não biológicos (redox, ácido-base, hidratação, hidrólise, complexação, fotólise, etc);
- b) Biodegradação – processos biológicos

Reconhecer:

- processos importantes numa dada situação;
- Como a estrutura química afeta esses processos;
- Fatores inerentes ao composto;
- Fatores inerentes ao sistema

Avaliação do comportamento ambiental de espécies

Avaliação do comportamento ambiental de espécies

- Quais são as propriedades relevantes de um composto orgânico?
- Como a estrutura influencia tais propriedades ?
- Como quantificar/estimar essas propriedades ?

Propriedades importantes de uma espécie

- Estado Físico
- Solubilidade – em água e solventes orgânicos
- Volatilidade
- Densidade
- Reatividade Química (“grupos funcionais”, redox, ácido base, etc)
- Biodegradabilidade
- Propriedades de “Partição” (tendência de adsorção a sólidos, partição em líquidos, etc)

Propriedades importantes de uma espécie

Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2^a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003

Propriedades importantes de um sistema ambiental

Dependem do sistema específico: ar, corpos de água ou solo!

Atmosfera, por exemplo:

- Concentração/pressão dos gases;
- Tipo de espécies presentes;
- Radiação presente (intensidade e comprimento de onda);
- Transporte;
- Temperatura.

Corpos de água:

- Temperatura
- Qualidade (composição química, pH, potencial redox, alcalinidade, dureza, turbidez, oxigênio dissolvido, BOD, coliformes fecais)
- Velocidade e padrão de fluxo
- Presença de sólidos ou outras fases líquidas

Propriedades importantes de um sistema ambiental

Corpos de água:

Table 1.7. Global Distribution of Water

	Volume (km ³)	%
Oceans	1.37×10^9	97.3
Ice caps, glaciers	3.0×10^7	2.1
Lakes	1.2×10^5	8×10^{-3}
Rivers	1.2×10^4	8×10^{-4}
Ground water	8.3×10^6	0.6
Soil moisture	2.5×10^4	1.8×10^{-3}
Atmosphere	1.3×10^4	9×10^{-4}
	1.41×10^9	100.0

Table 1.8. Principal Ionic Constituents of Sea Water

Ion	Concentration (g/kg)	Molarity
Cl ⁻	19.4	0.55
Na ⁺	10.8	0.47
SO ₄ ²⁻	2.7	0.03
Mg ²⁺	1.3	0.05
Ca ²⁺	0.4	0.01
K ⁺	0.4	0.01
HCO ₃ ⁻	0.14	0.002
Br ⁻	0.07	0.001
BO ₃ ³⁻	0.024	4×10^{-4}
CO ₃ ²⁻	0.012	2×10^{-4}
Sr ²⁺	0.0088	1×10^{-4}
F ⁻	0.0013	7×10^{-5}
Al ³⁺	0.0011	4×10^{-5}
NO ₃ ⁻	0.0012	2×10^{-5}
Li ⁺	0.00014	2×10^{-5}
PO ₄ ³⁻	0.0014	1.5×10^{-5}

Table 1.9. Mean Inorganic Composition of the World's Rivers

	mg/L	M	meq/L
<i>Anions</i>			
HCO ₃ ⁻	55.9	9.2×10^{-4}	0.92
SO ₄ ²⁻	10.6	1.1×10^{-4}	0.22
Cl ⁻	8.1	2.3×10^{-4}	0.23
NO ₃ ⁻	0.84	1.4×10^{-5}	0.01
			1.38
<i>Cations</i>			
Ca ²⁺	15.0	3.8×10^{-4}	0.76
Mg ²⁺	3.9	1.6×10^{-4}	0.32
Na ⁺	6.9	3.0×10^{-4}	0.30
K ⁺	2.1	5.4×10^{-5}	0.05
Fe ³⁺	0.41	7.3×10^{-6}	0.02
			1.45
<i>Neutral</i>			
SiO ₂	13.1	2.2×10^{-4}

Propriedades importantes de um sistema ambiental

Corpos de água:

Epitácio Pessoa/AE. Rio Tiête, Pirapora do Bom Jesus - SP

Material Húmico Aquático

1. Maior concentração de hidrogênio e nitrogênio,
2. Menor número de estruturas aromáticas e muito conjugadas,
3. Maior quantidade de carboidratos, proteínas e moléculas pigmentas inalteradas.

	subterrânea	lagos e rios	oceanos	poluída
pH	6-8	6,0-8,4 (80%)	8,2	0 (minas) 12,3 (lagos eutrofizados)
DOC	0,7 mg/L	5-6 mg/L	1 mg/L	300 mg/L

Carbono Orgânico Dissolvido (DOC): determinado como C por análise elementar (TOC).

Propriedades importantes de um sistema ambiental

Corpos de água:

Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2^a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003

Propriedades importantes de um sistema ambiental

Solos:

- Composição mineral
- Quantidade de matéria orgânica
- Capacidade de sorção (coeficiente de sorção)
- Mobilidade de sólidos
- Porosidade
- Distribuição de tamanho de partículas
- Condutividade hidráulica
- Presença de fluidos

Propriedades importantes de um sistema ambiental

Solos:

Perfil do Solo - Horizontes

- O) **Matéria orgânica:** camada de restos de plantas relativamente não decompostas (0-5 cm).
- A) **Solo superficial:** camada de solo mineral com a maior acumulação de matéria orgânica e vida. Pode sofrer eluviação, diminuindo as quantidades de ferro, argila, alumínio, compostos orgânicos e outras substâncias solúveis em água (5-25 cm).
- B) **Subsolo:** esta camada acumula as substâncias que foram eluviadas (25-80 cm).
- C) **Substratum:** acumula as substâncias mais solúveis que conseguiram passar por B (80-120 cm).

http://www.wpclipart.com/geography/features/soil/Soil_profile_horizons.png.html

<http://nesoil.com/images/haven2.jpg>

Propriedades importantes de um sistema ambiental

Solos: **Matéria húmica**
originária da decomposição de lignina

ácido fúlvico. Sóluvel em qualquer pH

ácido húmico. Sóluvel somente em pH > 2

humina. insolúvel em água

degradação da matéria húmica

formação da matéria húmica

Propriedades importantes de um sistema ambiental

Solos:

Material húmico do solo

Material húmico da água do mar

Material húmico:

Table 1.15. Distribution of Oxygen Functional Groups in Humic Materials

Group	meq/g	% of Total O (range)
-COOH	5.1	13.6-65.0
Phenolic -OH	3.6	9.1-38.0
Aliphatic -OH	3.0	0.9-16.4
C=O	3.2	4.1-28.7
-OCH ₃	0.5	1.0-9.4

Source: Mean of 7-11 determinations reported by Schnitzer and Khan (1972).

Ácido húmico

Figure 1.23. Flaug's model for humic acid structure. From Swain (1963). Reprinted by permission of Pergamon Press.

Ácido fúlvico

Figure 1.26. Leenheer's "average structural model" for freshwater fulvic acid. Reprinted from R. C. Averett et al., "Humic Substances in the Suwanee River, Georgia: Interactions, Properties, and Proposed Structures," U.S. Geological Survey report #87-557.

Figure 1.27. Gessing's (1976) "eclectic" concept of humic material. Reprinted by permission of Lewis Publishers.

Figure 1.24. Schnitzer and Kahn's (1972) model for fulvic acid structure. Reprinted by permission of Marcel Dekker, Inc.

Propriedades importantes de um sistema ambiental

Solos:

Propriedades importantes de um sistema ambiental

Solos:

Interação de espécies com material húmico

Propriedades importantes de um sistema ambiental

Solos: *Interação de espécies com material húmico*

dipolo induzido-dipolo induzido

ligação de hidrogênio

Propriedades importantes de um sistema ambiental

Solos: *Interação de material húmico com minerais*

Exercícios

Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2^a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003 – Capítulo 2

Q 2.9

What are the major sources of the BTEX compounds in the environment? Why are these compounds considered to be a problem?

Q 2.10

What are the major sources of PAHs in the environment? What are the major problems connected with this class of compounds?

Q 2.11

Why do so many high-volume production chemicals contain several halogen atoms? Why are polyhalogenated hydrocarbons rather persistent in the environment?

Q 2.12

Give at least five examples of polyhalogenated hydrocarbons and explain what kind of environmental problems they cause.

Q 2.17

For which major purpose(s) are sulfonic acid groups introduced into man-made organic chemicals?

Q 2.18

What are the characteristics and the major uses of surfactants? Give some examples of important commercially available surfactants.

Exercícios

Environmental Organic Chemistry, Schwarzenbach, Gschwend, Imboden, 2^a ed., Wiley, Hoboken, NJ, EUA, 2003 – Capítulo 2

Q 2.20

What are the most common phosphorus-containing functional groups encountered in environmentally relevant compounds? What are the major uses of such compounds?