



**Curso de Ciencias Biologicas
Disciplina BMI-296 – Imunologia basica**



**Aula 9 – Geraçao e
ativaçao dos linfóцитos B**

Alessandra Pontillo

Lab. Imunogenetica/Dep.Imunologia/ICB/USP

Linfocitos B




**Producao de anticorpos
Imunidade adquirida humoral**

**AC produzidos por um L.B tem todos
a mesma especificidade (V) que é identica
aqua da proprio BCR**


**Reconhecem Ag e medeiam varias
funções efetoras**

Desenvolvimento Linfocitos B



Formação do receptor
→ elevada especificidade de cada clone
→ tolerância a "self"

Desenvolvimento Linfocitos B



Desenvolvimento Linfocitos B

Construção do BCR






Figure 7-15 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

Desenvolvimento Linfocitos B




Desenvolvimento Linfocitos B


Early ProB	ProB or preB	Immature B
<ul style="list-style-type: none">DJ H chain recombinationStart of VDJ H chain recombination	<ul style="list-style-type: none">Complete VDJ H chain recombinationClonal expansionVJ L chain recombination	<p>Seleção negativa:</p> <ul style="list-style-type: none">- sinal de morte aos LB com BCR com elevada afinidade aos peptideos proprios → tolerância ao "proprio" (T. central)- Edição do receptor



Ativação dos Linfocitos B



Ativação Linfocitos B




Recirculação dos linfocitos "naive"
Encontro com Ag
→ Ativação do linfocito
→ Resposta ao Ag
→ Geração de memória

Ativação Linfocitos B


RECONHECIMENTO DO Ag

- * Ag solueis <70kDa chegam a zona de B pelos condutos e interagem diretamente com os B
- * Mø subcapsular e DC medullar capturam Ag maiores ou microrganismos inteiro e podem ativar os B
- * Complexos Ag/Ac+complemento liga Rec (CR2)



Ativação Linfocitos B


EXPANSÃO CLONAL



Ativação Linfocitos B


Diferentes tipos de sinal do Ag

Baço e outros OL




T-dependente:
plasmacell de vida
longa, isotipo
switchado, Ac de
elevada afinidade

Mucosas,
cavidade
peritoneal




T-independente:
plasmacell de vida
curta, **IgM**



T-independente:
plasmacell de vida
curta, **IgM**

Ativação Linfocitos B


Diferentes tipos de sinal do Ag



T-dependente:


- ✓ CD4+ ativado e diferenciado ajuda a ativação do LB
- ✓ estimulam troca de isotipo, maduração de afinidade e geração de plasmacel de vida longa e cel de memória → mais “sofisticada” resposta humoral
- ✓ Ag proteicos! (Ag/MHC-II)

Ativação Linfocitos B




Ativação T-dependente...tem lugar

(a)




Ativação Linfocitos B

ATIVAÇÃO EXTRA-FOLICULO (3-4 dd)



CENTRO GERMINAL (6-10 dd)



Mudança de isotipo;
Hipermutação somática limitada;
Afinidade de AC baixa;
Plasmocitos de vida curta (3d)


Mudança de isotipo;
Hipermutação somática elevada;
Maturação da afinidade → AC com alta afinidade
Plasmocitos de vida longa & Cel B memória

Ativação Linfocitos B


CENTRO GERMINAL

L.B.


- ✓ Proliferação
- ✓ Hipermutacão somática (\rightarrow BCR testado pelas FDC)
- ✓ Switch isotípico (\rightarrow classe depende do tipo de patógeno)



Ativação AID e hipermutação




Hipermutação & Switch isotípico



Switch isotípico

Heavy chain genes in IgM-expressing cells




Ativação Linfocitos B TD e TI

TABLE 12-4 Functional differences among mature B-cell subsets

Attribute	Conventional B2 B cells	B-1 B cells	Marginal zone B cells
Major sites	Secondary lymphoid organs	Pleural and peritoneal cavity; also spleen	Marginal zones of spleen in mice; primates also have MZ cells in other locations
V region diversity	Highly diverse	More restricted diversity	Moderate diversity
Rapidity of antibody response	Slow; plasma cells appear 7–10 days post stimulation	Rapid; plasma cells appear as early as 3 days after stimulation	Rapid; plasma cells appear as early as 3 days after stimulation
Surface IgD?	High levels of IgD	Low levels of IgD	Low levels of IgD
Somatic hypermutation	Yes	No	Yes in primates; possibly in rodents
Requirements for help from other cell types	Provided by T cells	No, although T and other cells can enhance response	Dendritic cells and neutrophils can enhance response (see Box 12-2)
Participate in germinal center reaction?	Yes	No	Possibly, although with slower kinetics than follicular B cells
Isotypes produced	All isotypes	Predominantly IgM	Predominantly IgM
Immunological memory	Yes	Very little	Yes; source of IgM-producing memory cells


Ativação Linfocitos B e AC

Tipo de CD4+ e isotipos




Funcao efetora dos Linfocitos B

= FUNCAO EFETORA DOS AC




Função efetora dos Linfócitos B



Ativação dos linfocito B

Activation of naive lymphocytes and initiation of adaptive immune responses




Secondary (peripheral) lymphoid organs

Lymph node

Activation of effector T cells in infected tissues


Mucosa/skin

Antigens/microbes




linfocitos B diferenciam a plasmacelulas e produzem Ac


Anticorpos no sitio de infecçao



Cinética da ativação Linfocitos B



Resposta mediada por Linfocitos B



Linfocitos B & AC & idade

