

Questionário de acompanhamento
Da disciplina LFN0321 - Microbiologia

STOA - 13/03/2018 até 16/03/2018

Participe!

Procariotos I

Biologia e importância

Leitura:

Pelczar v. 1 - capítulos 4 (pags. 100-123) & 9

Brock - Evolução e diversidade das células microbianas (p. 5)
Flagelos e motilidade natatória (p. 56-59).
(STOA)

Roteiro da aula:

Módulo I

- Generalidades e morfologia bacteriana
- Variabilidade genética em bactérias
- Procariotos: Bacterias
- Procariotos: Archaea

Módulo II

- Curiosidades científicas sobre os procariotos


O Sistema de Woese

Procaríotos


Bacteria

Archaea


Eukarya



Raíz da árvore



(a)



Procariotos: Aparecimento na Terra

3,5 bilhões de anos



....5:00 AM.....

230 milhões de anos



.....10:00 PM.....

50-60 mil anos



.....11:59 PM



tempo

Estromatólitos: os fósseis mais antigos da Terra (3.5 bilhões de anos)






Shark Bay - Austrália

A célula procariótica: tamanho




Morfologia e agrupamentos bacterianos






Bacilo

ASM MicrobeLibrary.org©Chamberlain



Estafilococos

A célula procariótica




Monótrica



Lofótrica




Anfítrica



Perítrica

O motor flagelar bacteriano



Experimento de Silverman & Simon, 1974

Plasmídeos

São pequenos cromossomos circulares dispensáveis à célula hospedeira.

Podem ser transferidos entre bactérias até mesmo de gêneros diferentes pelos mecanismos geradores de variabilidade (ver adiante).



Carregam genes que podem conferir vantagens adaptativas, como por exemplo resistência a antibióticos.

Podem ser usado como vetores de genes.

Células procarióticas e eucarióticas

	procarioto	eucarioto
Núcleo	ausente	presente
Cromossomo	circular um	linear vários
Mitocôndria e Cloroplasto	ausentes	presentes
Meiose	ausente	presente
Parede celular	peptideoglicano (Bacteria) variada (Archaea)	celulose (plantas) quitina (fungos)
RER	ausente	presente

Divisão da célula procariótica por fissão binária



Genética: mecanismos de variabilidade







Mecanismos de variação genética


1. Conjugação (reprodução sexuada)
2. Transformação
3. Transdução

Além da mutação, que é comum a todos os seres vivos...


Variabilidade genética: conjugação




Variabilidade genética: conjugação



Variabilidade genética: transformação



Variabilidade genética: transdução



Variabilidade genética em bactérias: problemas...



Infecção bacteriana da garganta

Fasciite necrosante



O que uma doença tem a ver com a outra?



Ambas são causadas pela mesma bactéria: *Streptococcus pyogenes*

Mas como?



A que causa FN “ganhou” um gene (transdução?) que codifica para uma supertoxina.

A parede celular
bacteriana...

Gram-negativas



Gram-positivas



Penicilina interfere na síntese do peptideoglicano!

ATENÇÃO!! Coloração de Gram na aula prática!!

Atenção: há bactérias sem
parede celular, embora
compreendam um grupo bem
pequeno

Micoplasmas, Fitoplasmas, Espiroplasmas


Não perca a aula teórica da próxima semana, Prof. Ivan !!!

Procariotos: Archaea

Arqueas: procariotos extremófilos








Arqueas *versus* Bactérias: parede celular


Parede celular: bactérias = peptideoglicano; archaea = variada




Arqueas versus Bactérias: membrana celular

Membrana	<i>Bacteria</i>	<i>Archaea</i>	<i>Eukarya</i>
Conteúdo protéico	alto	alto	baixo
Composição lipídica	fosfolipídeos	Sulfolipídeos, glicolipídeos, hidrocarbonetos ramificados, isoprenoídeos, fosfolipídeos	Fosfolipídeos
Estrutura dos lipídeos	cadeia linear	cadeia ramificada	cadeia linear
Ligação dos lipídeos	éster	éter (di e tetraeter)	éster

Cadeia fosfolipídica de Archaea , Bacteria e Eukarya




Archaea



Bacteria e
Eukarya

Archaea : similaridades com Eukarya

DNA de ambos é protegido pelas histonas



Resumindo

Archaeae:

Ausência de carioteca – como Bacteria
Forma e tamanho das células - como Bacteria
Reprodução - como bactéria
Cromossomo - como Bacteria (apenas um, circular)

Histonas associadas ao genoma = Eukarya

Membrana celular – diferente de Bacteria
Parede celular – diferente de Bacteria
Sequência do gene RNAr – diferente

Procariotos: importância (no contexto florestal e agrícola)

-Importância direta das arqueas – metanogênicas no rúmen.

-Importância direta das bactérias – múltipla.

-Exs: fitopatogênicas (gram positivas e negativas)
simbióticas (fixação de N – Rhizobium)
do ácido láctico (gram positivas)
entéricas e esporogênicas (infecções /intoxicações alimentares)

... ETC

BACTÉRIAS DE IMPORTÂNCIA

Ex. 1: Fitopatogênicas

Pseudomonas

Xanthomonas


Erwinia



Clavibacter

Xylella



Ralstonia



Leaf scald (*Xanthomonas albilineans*) symptoms on sugarcane.
Courtesy Tom Isakeit, TAEX, Weslaco, 1996.



Ex. 2: Bactérias esporogênicas (causam intoxicação/infecção alimentar)



Clostridium,
Bacillus

Módulo II

Curiosidades sobre Procariotos

Prepare-se para desafiar tudo o que você aprendeu até agora sobre os limites da vida



Condições extremas de temperatura e pressão



Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

Buscar: [

Home | A Instituição | Formas de Apoio | Apoio ao Usuário | Publicações | Notícias | Eventos

AGÊNCIA FAPESP
Divulgando a cultura científica

Agência de Notícias da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

Divulgação
Científica

Micróbios que vivem a 121 graus Celsius

22/08/2003 14:51

Agência FAPESP - Até então, o micróbio *Pyrolobus fumarii* era a forma de vida mais resistente às altas temperaturas. Os cientistas haviam registrado exemplares desses organismos vivendo a 113 graus Celsius. Uma nova descoberta, nas profundezas do Pacífico, mostra que os limites da vida em condições adversas ainda não são definitivos.

Derek Lovley e Kazem Kashefi, ambos da Universidade de Massachusetts, Estados Unidos, identificaram uma arqueobactéria (a forma mais primitiva de vida que se conhece) a 121 graus Celsius. O nome científico do micróbio ainda não foi definido. O resultado da pesquisa foi publicado na edição de 15/8 da revista *Science*.

A amostra que continha as arqueobactérias foi coletada a 2,4 quilômetros de profundidade, por intermédio de um submarino operado por controle remoto. O equipamento foi enviado às profundezas do oceano em um local a 330 quilômetros da costa.

"O limite máximo de temperatura para a vida é uma chave importante para se delimitar quando e onde ela teria surgido na Terra", escreveram os cientistas.




Foto: Universidade de Massachusetts

Arquea

Por quanto tempo um endósporo pode sobreviver?

Condições extremas de longevidade

Neste capítulo, discutiremos as condições de latência e resistência dos endósporos bacterianos, salientando que eles podem sobreviver por longos períodos em um estado de dormência. Entretanto, qual a duração desse período?

Evidências quanto à longevidade dos endósporos sugerem que essas estruturas podem permanecer viáveis (isto é, capazes de germinar, originando células vegetativas) por pelo menos várias décadas ou, provavelmente, por muito mais tempo. Por

exemplo, uma suspensão de endósporos da bactéria *Clostridium acetivum* (Figura 1a) preparada em 1947 foi inoculada em um meio de cultura estéril em 1981, após 34 anos, e, em menos de 12 horas, foi possível observar o crescimento celular, resultando em uma cultura robusta. A bactéria

C. acetivum foi originalmente isolada pelo cientista holandês K. T. Wieringa, em 1940, porém acreditava-se que havia sido perdida, até que o frasco contendo endósporos de *C. acetivum* foi encontrado em um depósito na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e eles foram capazes de germinar.¹ *C. acetivum* é um organismo acetogênico, uma bactéria que sintetiza acetato a partir de $\text{CO}_2 + \text{H}_2$ ou a partir de glicose (Seção 21.9).

Outros exemplos extremos da longevidade de endósporos foram documen-







Figura 1 Longevidade de endósporos. (a) Um tubo contendo endósporos da bactéria *Clostridium acetivum*, preparado em 7 de maio de 1947. Após permanecerem dormentes por mais de 30 anos, os endósporos foram suspensos em um meio de cultura, apresentando crescimento em 12 horas. (b) Bactérias halofílicas aprisionadas no interior de cristais de sal. Estes cristais (de aproximadamente 1 cm de diâmetro) foram cultivados em laboratório na presença de células de *Halobacterium* (laranja) que permaneceram viáveis no interior dos cristais. Foram descritos cristais similares a estes, porém da era Permiana (≈ 250 milhões de anos), contendo bactérias halofílicas endosporulantes viáveis.

tos. Bactérias do gênero *Thermoactinomyces* são termófilas, formadoras de endósporos, amplamente distribuídas no solo, em restos vegetais e compostos vegetais em decomposição. O exame microbiológico de um sítio arqueológico romano, localizado no Reino Unido, datado de mais de 2.000 anos, revelou números significativos de endósporos viáveis de *Thermoactinomyces* em vários fragmentos das ruínas. Além disso, endósporos de *Thermoactinomyces* foram recuperados de frações de sedimento de um lago de mais de 7.000 anos, em Minnesota. Embora a contaminação seja sempre considerada como uma possibilidade em estudos desse tipo, em ambos os casos as amostras foram processadas de maneira a virtualmente excluir a contaminação por endósporos "recentes".² Portanto, provavelmente os endósporos são capazes de perdurar por milhares de anos, mas será esse o limite?

Que fatores poderiam limitar a idade de um endósporo? A radiação cósmica foi considerada como um principal fator, uma vez que introduz mutações no DNA.² Sugeriu-se que, ao longo de milhares de anos, os efeitos cumulativos da radiação cósmica poderiam introduzir tantas mutações no genoma de um organismo que mesmo estruturas altamente resistentes à radiação, como os endósporos, sucum-



Procariotos multicelulares???
No Rio de Janeiro????




Candidatus Magnetoglobus multicellularis

International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology

***Candidatus Magnetoglobus multicellularis*, a multicellular, magnetotactic prokaryote from a hypersaline environment.**


Abreu, F.; Martins, JL, Silveira, TS; Keim, CN, Barros, HG, Filho, FG, Lins, U.



"O organismo é capaz de realizar tipos de movimentos complexos e nadar numa velocidade de cerca de 50 micrômetros por segundo". "O fato só é possível devido à troca de informações entre as células."

Nanomotor melhor que Ferrari!!!

O motor flagelar bacteriano




Estrutura flagelar

Composto de três partes:

1. Filamento (flagelina)
2. Gancho
3. Corpo basal: série de anéis e motor




www.youtube.com/watch?v=5RmS_n_bq04
Para entender o motor flagelar



Curiosidades sobre o motor flagelar bacteriano

- Motor tem mais de 30 partes, montadas sequencialmente
- Cada parte é fundamental para o funcionamento (“complexidade irreduzível”)
- Velocidade variável (até 18.000 rpm)
- Inversão da rotação rapidamente (1/4 de volta)
- 1000 prótons para cada rotação
- A célula desloca-se a cerca de 0,00017 Km/h
(guepardo: 25 comprimentos/s; bactéria: até 60 comprimentos celulares/s)
Se a bactéria tivesse o tamanho de um guepardo, atingiria incríveis 260 Km/h

O motor flagelar e a seleção natural



" A seleção natural atua somente aproveitando pequenas variações sucessivas. Nunca pode haver um grande salto repentino, mas tem de avançar a passos curtos e seguros, apesar de lentos"

Charles Darwin

" Se pudéssemos demonstrar que tal órgão complexo existisse, o qual não pudesse ter sido formado por pequenas modificações sucessivas, minha teoria iria totalmente por água abaixo"

Charles Darwin



Explicações darwinistas para a evolução do flagelo:

<http://www.youtube.com/watch?gl=BR&hl=pt&v=SdwTwNPyR9w>

Canal do Pirula - YouTube: Série Criacionismo, especialmente o video #9 (Complexidade Irredutível)



