

Universidade de São Paulo (USP)
Escola de Engenharia de Lorena (EEL)
Engenharia Bioquímica



Aula 5 e 6

Regulação Gênica em Eucariotos

Elisson Romanel


- 1. Regulação da Expressão Gênica**
- 2. Fatores transcrpcionais**
- 3. Promotor e elementos regulatórios**
- 4. Regulação Pós-Transcricional**
- 5. Regulação Epigenética**

Regulação Gênica Eucariótica


Ambiente x Desenvolvimento x Genoma



Expressão gênica



Regulação Gênica Eucariótica




- Anatomia e fisiologia
 - Órgãos e tecidos
 - Temporal e Espacial
- Sistema elaborado de membranas

Transcrição do DNA é controlada
Recomposição alternativa de RNA
Estabilidade e controle do RNA


RNA polimerase

TABLE 9.2 *Plant nuclear RNA polymerases and their products.*

RNAP	RNA synthesized
I	5.8S, 18S and 28S rRNAs
II	mRNAs, miRNAs, snRNAs, ta-siRNAs
III	5S rRNA, tRNAs, snRNAs
IV	siRNAs
V	noncoding RNAs




Genes x Expressão Gênica




- Genes de expressão constitutiva
- Genes de expressão específica (desenvolvimento, tecido, celular)

Genes x Expressão Gênica


- Genes induzidos por calor



- Genes reguladores por transdução de sinal



Controle Molecular da Transcrição




Promotores e elementos regulatórios


TABLE 9.4 *Examples for DNA sequence motifs bound by Arabidopsis transcription factors, and their functions in plant growth and development.*

Motif name	Sequence	Bound by	Function
ABA-responsive element (ABRE)	CACGTGGC	ABRE-binding factors (bZIP proteins)	ABA response
Auxin response element (ARE)	TGTCTC	Auxin response factors	Auxin response
CArG box	CC(A/T) ₆ GG	MADS domain proteins	Flower development, etc.
Evening element	AAAATATCT	Certain MYB proteins	Gene regulation by the circadian clock
G box	CACGTG	bZIP and bHLH proteins	Light response, etc.
GATA promoter motif	(A/T)GATA(G/A)	GATA transcription factors	Various

Controle Molecular da Transcrição




Promotores e elementos regulatórios




Fator de Transcrição

- Domínio de ligação ao DNA (DNA-binding domain)
- Domínio de ativação da transcrição (Transactivating domain)
- Sequencia de localização nuclear (Nuclear localization sequence-NLS)



Homeodomínio

Helix-turn-helix motif



Fator de Transcrição


ligação ao DNA

	Class 1	Helix I	Helix II	Turn	Helix III
Maize	KN1	S K K K K K G K L P K E A R Q Q L L S W W D Q H Y K W P Y P	S E T Q K V A L A E S T G L D L K Q I N N W F I N Q R K R H W K P S		
Rice	OSH1	S K K K K K G K L P K D A R Q Q L L N W W E L H Y K W P Y P	S E S Q K V A L A E S T G L D L K Q I N N W F I N Q R K R H W K P S		
Maize	RS1	S K K K K K G K L P K E A R Q K L L H W W E L H Y K W P Y P	S E T E K I A L A E S T G L D Q K Q I N N W F I N Q R K R H W K P S		
Maize	KNOX4	S K K K K K G K L P K E A R Q K L L H W W E L H Y K W P Y P	S E T E K I A L A E A T G L D Q K Q I N N W F I N Q R K R H W K P S		
Arabidopsis	KNAT1	S K K K K K G K L P K E A R Q K L L T W W E L H Y K W P Y P	S E S E K V A L A E S T G L D Q K Q I N N W F I N Q R K R H W K P S		
Maize	KNOX8	S K R K K K G K L P K E A R Q K L L H W W E L H Y K W P Y P	S E T E K M A L A E T T G L D P K Q I N N W F I N Q R K R H W K P A		
Maize	KNOX3	C K K R K K D K L P K E A R Q K L L S W W E L H Y R W P Y P	S E M E K I A L A E S T G L E Q K Q I N N W F I N Q R K R H W K P S		
Soybean	SBH1	M K K R K K G K L P K E A R Q Q L L E W W N R H Y K W P Y P	S E S Q K L A L A E S T G L D Q K Q I N N W F I N Q R K R H W K P S		
Arabidopsis	KNAT2	S K K K K K G K L P R E A R Q A L L D W W N V H N K W P Y P	T E G D K I S L A E E T G L D Q K Q I N N W F I N Q R K R H W K P S		
Maize	KNOX10	S R K K K K G K L P R D A R Q K L L H W W Q L H Y R W P Y P	S E L E K A A L A E S T G L E A K Q I N N W F I N Q R K R H W K Q A		
Maize	LG3	L K K R K K G K L P K D A R T V L L E W W N T H Y R W P Y P	T E E D K V R L A A M T G L D P K Q I N N W F I N Q R K R H W K P S		
Maize	KNOX5	L K K R K K G K L P K D A R S A L M D W W N T H Y R W P Y P	T E E D K V R L A A M T G L D P K Q I N N W F I N Q R K R H W K P S		
Maize	KNOX11	L K K R K K G K L P K D A R S A L M D W W N T H Y R W P Y P	T E E D K V R L A A A T G L D P K Q I N N W F I N Q R K R H W K P S		
	Class 2				
Maize	KNOX1	L R K R R A G K L P G D T T S I L K Q W W Q E H S K W P Y P	T E D D K A K L V E E T G L Q L K Q I N N W F I N Q R K R N W H N N		
Maize	KNOX2	L R K R R A G K L P G D T A S T L K A W W Q A H S K W P Y P	T E E D K A R L V Q E T G L Q L K Q I N N W F I N Q R K R N W H N N		
Maize	KNOX6	M R K R R A G K L P G D T A S V L K A W W Q A H S K W P Y P	T E D D K A R L V Q E T G L Q L K Q I N N W F I N Q R K R N W H S N		
Maize	KNOX7	M R K R R A G K L P G D T A S V L K A W W Q A H S K W P Y P	T E D D K A R L V Q E T G L Q L K Q I N N W F I N Q R K R N W H S N		
N. napus	BNHD1	M R K R R A G K L P G D T T T V L K N W W Q Q H C K W P Y P	T E D D K A K L V E E T G L Q L K Q I N N W F I N Q R K R N W H S N		
	Other				
Arabidopsis	ATH1	Q I W R P Q R G L P E K S V S V L R N W M F Q N F L H P Y P K D S E K H L L A I R S G L T R S Q V S N W F I N A R V R I L W K P M			
Human	PNX-1	L P K H A T N V M R S W L F Q H I G H P Y P T E D E K K Q I A A Q T N L T L L Q V N N W F I N A R R R I L Q P M			




Homeodomínio

Helix-turn-helix motif




Fator de Transcrição

bHLH



bZIP




Homo ou heterodímero (Complexidade x expressão gênica)

Fator de Transcrição

Organism	Total number of genes	Genes coding for transcriptional regulators	
		Total number	Percentage of total number of genes
<i>A. thaliana</i>	~26,000	1533	5.9
<i>S. cerevisiae</i>	~6,000	209	3.5
<i>C. elegans</i>	~19,000	669	3.5
<i>D. melanogaster</i>	~14,000	635	4.5

Family	<i>Arabidopsis</i>	Rice (<i>Oryza sativa</i>)	Plant specific
AP2/ERF	147	161	No*
bZIP	74	94	No
GRAS	32	57	Yes
MADS	108	77	No
MYB	198	182	No
NAC	100	149	Yes
WRKY	71	109	No*



*But predominantly found in plants.




Riechmann et al., 2000 (Science); Buchanan et al., 2015 (Cap. 9)

Duplicação Gênica e Evolução

Genoma de *Arabidopsis thaliana*



Duplicação Gênica, Evolução e Expressão



Regulação pós-transcricional

- Interferência de RNA (RNAi)



The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2006



Photo: L. Cicero
Andrew Z. Fire
Prize share: 1/2




Photo: J. Mottern
Craig C. Mello
Prize share: 1/2

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2006 was awarded jointly to Andrew Z. Fire and Craig C. Mello *"for their discovery of RNA interference - gene silencing by double-stranded RNA"*



Regulação pós-transcricional


- Interferência de RNA (RNAi)



STEP 1 A large double-stranded RNA molecule is diced into small, double-stranded interfering RNAs 21-28 base pairs long.


STEP 2 The small interfering RNAs and proteins assemble into ribonucleoprotein particles.

STEP 3 The small interfering RNA in a ribonucleoprotein particle is unwound to produce an RNA-Induced Silencing Complex (RISC).



Regulação pós-transcricional

- Interferência de RNA (RNAi)



Vídeo

RNA Animation


Regulação pós-transcricional

- Interferência de RNA (RNAi)

NATURE | VOL 391 | 19 FEBRUARY 1998

Potent and specific genetic interference by double-stranded RNA in *Caenorhabditis elegans*

Andrew Fire*, SiQun Xu*, Mary K. Montgomery*,
Steven A. Kostas*†, Samuel E. Driver‡ & Craig C. Mello‡



Selvagem




dsRNA





Organização da cromatina e Expressão gênica - Epigenética



- Variação por efeito de posição



Inversion places *white⁺* close to heterochromatin.



Wild-type eye




Organização da cromatina e Expressão gênica - Epigenética

- Remodelagem da Cromatina



- Histona acetiltransferase (Lisina)
- Quinases (serina)
- Histona desacetilases (HDAC)
- Histona metiltransferase (HMT)




Organização da cromatina e Expressão gênica - Epigenética

- Remodelagem da Cromatina



- Histona acetiltransferase (Lisina)
- Quinases (serina)
- Histona desacetilases (HDAC)
- Histona metiltransferase (HMT)




Organização da cromatina e Expressão gênica - Epigenética

- Remodelagem da Cromatina



- Histona acetiltransferase (Lisina)
- Quinases (serina)
- Histona desacetilases (HDAC)
- Histona metiltransferase (HMT)




Organização da cromatina e Expressão gênica - Epigenética

- Remodelagem da Cromatina



- Histona acetiltransferase (Lisina)
- Quinases (serina)
- Histona desacetilases (HDAC)
- Histona metiltransferase (HMT)

Arabidopsis thaliana



Organização da cromatina e Expressão gênica - Epigenética


- Remodelagem da Cromatina



- Histona acetiltransferase (Lisina)
- Quinases (serina)
- Histona desacetilases (HDAC)
- Histona metiltransferase (HMT)
- SWI/SNF (Switching-inhibited/Sucrose nonfermenter)



- Deslizamento das histonas





Organização da cromatina e Expressão gênica - Epigenética

- Metilação do DNA




- Animais 40% CG; 2 a 7% são metilados
- Plantas = CHG e CHH (H=C, T ou A); 20% metilados
- Enzimas de restrição sensível e insensível a metilação (*HpaII* - CCGG)
- Ilhas CpG, início da transcrição
- DNA metilado, ligação de MeCP2 e modificação da cromatina
- DNA metiltransferase




Organização da cromatina e Expressão gênica - Epigenética

- Metilação do DNA



- Animais 40% CG; 2 a 7% são metilados
- Plantas = CHG e CHH (H=C, T ou A); 20% metilados
 - Enzimas de restrição sensível e insensível a metilação (*HpaII* - CCGG)
 - Ilhas CpG, início da transcrição
 - DNA metilado, ligação de MeCP2 e modificação da cromatina
 - DNA metiltransferase



Organização da cromatina e Expressão gênica - Epigenética

- Metilação do DNA



Jeff

O esforço para saber por qu



Carly



Diana Bozza tranquiliza sua gêmea univitelina, Deborah Faraday, em uma casa de repouso em Front Royal, na Virgínia. Diagnosticada há oito anos com o mal de Alzheimer, hoje Deborah está incapacitada; já Diana não apresenta nenhum sintoma da doença.



Lily



Cole



Jackie



A – pode ser útil para todos nós.



Christopher

Organização da cromatina e Expressão gênica - Epigenética

- Metilação do DNA



3 Anos

50 Anos

Epigenetic differences arise during the lifetime of monozygotic twins

Mario F. Fraga*, Esteban Ballestar*, Maria F. Paz*, Santiago Ropero*, Fernando Setien*, Maria L. Ballestar†, Damia Heine-Suñer‡, Juan C. Cigudosa§, Miguel Urioste¶, Javier Benítez¶, Manuel Boix-Chornet†, Abel Sanchez-Aguilera†, Charlotte Ling||, Emma Carlsson||, Pernille Poulsen**, Allan Vaag**, Zarko Stephan††, Tim D. Spector††, Yue-Zhong Wu††, Christoph Plass††, and Manel Esteller*§§

*Epigenetics, †Cytogenetics, and ‡Genetic Laboratories, Spanish National Cancer Centre (CNIO), Melchor Fernandez Almagro 3, 28029 Madrid, Spain; †Department of Behavioral Science, University of Valencia, 46010 Valencia, Spain; †Molecular Genetics Laboratory, Genetics Department, Son Dureta Hospital, 07014 Palma de Mallorca, Spain; †Department of Clinical Sciences, University Hospital Malmö, Lund University, S-205 02 Malmö, Sweden; **Steno Diabetes Center, 2820 Gentofte, Denmark; ††Twin Research and Genetic Epidemiology Unit, St. Thomas' Hospital, London SE1 7EH, United Kingdom; and ††Human Cancer Genetics Program, Department of Molecular Virology, Immunology, and Medical Genetics, Ohio State University, Columbus, OH 43210

Edited by Stanley M. Gartler, University of Washington, Seattle, WA, and approved May 23, 2005 (received for review January 17, 2005)



Monozygous twins share a common genotype. However, most monozygotic twin pairs are not identical; several types of phenotypic discordance may be observed, such as differences in susceptibilities to disease and a wide range of anthropomorphic features. There are several possible explanations for these observations, but one is the existence of epigenetic differences. To address this issue, we examined the global and locus-specific differences in DNA methylation and histone acetylation of a large cohort of monozygotic twins. We found that, although twins are epigenetically indistinguishable during the early years of life, older monozygous twins exhibited remarkable differences in their overall content and genomic distribution of 5-methylcytosine DNA and histone acetylation, affecting their gene-expression portrait. These findings indicate how an appreciation of epigenetics is missing from our understanding of how different phenotypes can be originated from the same genotype.

Organização da cromatina e Expressão gênica - Epigenética

- Imprinting (Estampagem)




- Depende da origem parental



- *Igf2* (Insulin-like growth factor) = expressão paterna
- *H19* = expressão materna

Organização da cromatina e Expressão gênica - Epigenética

- Imprinting (Estampagem)



Tumor de Wilm

Ocorre expressão de
IGF2 materno

Múltiplos Níveis Regulatórios

