

## PSI5005 Fotônica e Eletrônica Molecular

### Primeira lista de exercícios

1.- Determinar os níveis de energia dos estados estacionários de uma partícula de massa “m” confinada em uma caixa de potencial tridimensional de lado igual a L.

2.- Determinar o coeficiente de transmissão (T) e reflexão (R) de uma partícula de massa “m” e energia “E” que incide em uma barreira de potencial de altura  $V_0$  e largura “L”, quando:

(a)  $0 < E < V_0$

(b)  $E > V_0$

(c) Obter o gráfico de T em função de E para uma partícula de massa igual a  $0,4m_e$  e  $V_0 = 224 \text{ meV}$ ,  $L = 50 \text{ \AA}$

(d) Obter o gráfico de T em função de L para uma partícula de massa igual a  $0,067 m_e$  e  $E = (3/4)V_0$ .

3.- (a) Determinar a energia do estado fundamental e o primeiro estado excitado de uma partícula de massa  $= 0,4m_e$  confinado no seguinte poço de potencial:

$$V(x) = 0 \text{ para } |x| > L/2$$

$$V(x) = -V_0 \text{ para } |x| < L/2$$

Considerar  $V_0 = 150 \text{ meV}$  e  $L = 100 \text{ \AA}$

(b) Calcular a probabilidade de encontrar a partícula fora da região do poço de potencial.

4.- Para a partícula do problema (3), determinar os coeficientes T e R quando a energia da partícula E é maior que zero.