Introdução à Cosmologia Física

* 1a Lista de Exercícios - para 25/8 !

Hoje:

- A Relatividade Geral de Einstein
- As Equações de Einstein
- Buracos Negros
- A métrica FLRW e as Equações de Friedmann
- Cinemática em espaços-tempo FLRW

Introdução à Cosmologia Física - Aulas 5 e 6

Nas teorias "covariantes" da gravidade (p. ex., a Relatividade Geral), a **gravidade** é uma manifestação da **curvatura do espaço-tempo**

Nessas teorias, a **métrica** do espaço-tempo (i.e., sua **geometria**) tem dois papéis:
ela **determina** a trajetória da matéria... ..e é **curvada** pela matéria

- O que significa uma "geometria" do espaço-tempo?
- O que determina essa geometria?
- Como podemos fazer medidas que testam essa teoria?

Introdução à Cosmologia Física - Aulas 5 e 6

Lobachevski mostrou que existem espaços "curvos", infinitos, onde existem muitas linhas por P:

Espaço de Gauss-Lobachesvki-Bolyai

1. Plano, infinito (Euclidean)

2. Curvo, finito (fechado/elíptico)

3. Curvo, infinito (aberto/hiperbólico)

Introdução à Cosmologia Física - Aulas 5 e 6

Visão "global" das geometrias plana (curvatura nula), fechada (curvatura positiva) e aberta (curvatura negativa):

Um aspecto crucial dessas geometrias é que **todos os pontos** desses espaços são **equivalentes**. Ou seja, não há **nenhuma posição privilegiada**, nem **nenhuma direção privilegiada**. Isso não é necessariamente verdade em outras geometrias, p. ex.:

Introdução à Cosmologia Física - Aulas 5 e 6

Espaços planos (Euclidianos), fechados (i.e., esféricos) e abertos (GLB) são as únicas variedades que satisfazem um princípio simples: elas são homogêneas e isotrópicas.

Homogeneidade: o espaço tem as mesmas propriedades em todo lugar

Homogeneidade sem isotropia

Isotropia: todas as direções do espaço são equivalentes

Isotropia sem homogeneidade

Princípio cosmológico: o espaço é o mesmo em todo lugar, e em todas as direções

* Ehlers, Gehren & Sachs (1968): se todos os observadores inerciais medirem as mesmas propriedades da **matéria** (p. ex., a radiação cósmica de fundo), então o universo é homogêneo e isotrópico.

Introdução à Cosmologia Física - Aulas 5 e 6

O espaço de Lobachevski foi uma das motivações para Georg B. Riemann, em 1854, propor sua visão global da Geometria como o estudo das variedades com qualquer número de dimensões, em qualquer tipo de espaço.

Essas geometrias são **essencialmente não-Euclidianas**: as distâncias entre dois pontos são dadas em termos de uma métrica, que é uma função diferenciável qualquer:

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

A métrica tem um papel dual:

- i) ela serve para medir a distância entre dois pontos quaisquer; e
- ii) ela determina (pelas conexões afins) como se deve transportar quantidades geométricas ao longo de um caminho suave na variedade - p. ex.:

aceleração

$$\frac{dV_\mu}{d\lambda} = \Gamma_{\mu\nu}^\alpha \frac{dx^\nu}{d\lambda} V_\alpha$$

$$\Delta V_\mu = \frac{1}{2} R_{\beta\mu\nu}^\alpha V_\alpha \oint dx^\mu dx^\nu$$

Introdução à Cosmologia Física - Aulas 5 e 6

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\alpha} = \frac{1}{2}g^{\alpha\beta} \left(\frac{\partial g_{\beta\mu}}{\partial x^{\nu}} + \frac{\partial g_{\beta\nu}}{\partial x^{\mu}} - \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^{\beta}} \right)$$

$$\frac{D V^{\alpha}}{D x^{\beta}} = V^{\alpha}_{;\beta} = \frac{\partial V^{\alpha}}{\partial x^{\beta}} + \Gamma_{\mu\beta}^{\alpha} V^{\mu}$$

$$R^{\alpha}_{\beta\mu\nu} = \frac{\partial \Gamma_{\beta\mu}^{\alpha}}{\partial x^{\nu}} - \frac{\partial \Gamma_{\beta\nu}^{\alpha}}{\partial x^{\mu}} + \Gamma_{\sigma\nu}^{\alpha} \Gamma_{\beta\mu}^{\sigma} - \Gamma_{\sigma\mu}^{\alpha} \Gamma_{\beta\nu}^{\sigma}$$

$$\frac{D V_{\alpha}}{D x^{\beta}} = V_{\alpha;\beta} = \frac{\partial V_{\alpha}}{\partial x^{\beta}} - \Gamma_{\alpha\beta}^{\mu} V_{\mu}$$

A liberdade de escolha das coordenadas implica que, em qualquer ponto, podemos sempre usar o Elevador de Einstein, ir para um sistema no qual a métrica é, localmente, aquela de Minkowski, e assim fazer com que as conexões se anulem:

$$g_{\mu\nu} \rightarrow \eta_{\mu\nu}, \quad \Gamma_{\mu\nu}^{\alpha} \rightarrow 0$$

Entretanto, se o espaço é curvo, as derivadas das conexões não podem também se anular...

$$\partial_{\beta} \Gamma_{\mu\nu}^{\alpha} \neq 0 \quad !$$

Portanto, nunca podemos "anular" a curvatura!

Introdução à Cosmologia Física - Aulas 5 e 6

Agora, suponha que nos é dado um espaço com uma determinada métrica.

O que define um referencial em "queda livre" (inercial) em algum lugar desse espaço?

⇒ A **aceleração** em trajetórias que passam por aquele lugar deve **se anular**:

$$\frac{D^2 X^\alpha}{D\lambda^2} = 0 \Rightarrow \frac{d^2 X^\alpha}{d\lambda^2} + \Gamma_{\mu\nu}^\alpha \frac{dX^\mu}{d\lambda} \frac{dX^\nu}{d\lambda} = 0$$

Equação da geodésica

$X^\alpha(\lambda)$

A dashed red curve representing a geodesic path. A small grey circle marks a point on the curve, with a red label $X^\alpha(\lambda)$ next to it. The curve starts from the bottom left and curves upwards and to the right.

Note que a equação da geodésica determina tanto as coordenadas **espaciais e temporais** do observador inercial

⇒ "Tempo próprio" é o $X^0 = \tau$ ao longo da geodésica!

Limite Newtoniano

Pequenas velocidades... $\frac{d^2 x^\alpha}{d\tau^2} + \Gamma_{\mu\nu}^\alpha \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} \approx \frac{d^2 x^\alpha}{d\tau^2} + \Gamma_{00}^\alpha \frac{dt}{d\tau} \frac{dt}{d\tau} = 0$

$$g_{00} = 1 - 2\phi$$

Métrica estática, quase Minkowski...

$$\Gamma_{\mu\nu}^\alpha \rightarrow \Gamma_{00}^i = -\frac{1}{2} \nabla^i g_{00} \Rightarrow \begin{cases} \frac{d^2 x^i}{d\tau^2} = \frac{1}{2} \nabla^i g_{00} \left(\frac{dx^0}{d\tau} \right)^2 \\ \frac{d^2 x^0}{d\tau^2} = 0 \end{cases}$$

Introdução à Cosmologia Física - Aulas 5 e 6

Podemos também perguntar como duas geodésicas que passam pelo mesmo ponto se desviam uma da outra:

$$\frac{D^2 \delta X^\alpha}{D\tau^2} = R^\alpha_{\beta\mu\nu} \delta X^\mu \frac{dX^\beta}{d\tau} \frac{dX^\nu}{d\tau}$$

Esta é a **equação do desvio geodésico**. (Relacionada com a **Equação de Raychaudhuri**.)
Seja $u(\tau)$ uma geodésica do tipo-tempo, $u^\mu u_\mu = -1$, e sua 4-divergência:

$$\theta = D_\mu u^\mu = u^\mu_{;\mu}$$

Essa divergência obedece a Equação de Raychaudhuri:

$$\frac{d\theta}{d\tau} = -\frac{1}{3}\theta^2 + \omega_{\mu\nu}\omega^{\mu\nu} - \sigma_{\mu\nu}\sigma^{\mu\nu} - R_{\mu\nu}u^\mu u^\nu$$

$R_{\mu\nu} = R^\alpha_{\mu\alpha\nu}$

onde o tensor de rotação é: $\omega_{\mu\nu} = \frac{1}{2} (u_{\mu;\nu} - u_{\nu;\mu})$

e o tensor de cisalhamento é: $\sigma_{\mu\nu} = \frac{1}{2} (u_{\mu;\nu} + u_{\nu;\mu}) - \frac{1}{3}\theta(g_{\mu\nu} + u_\mu u_\nu)$

Problema #1

Seja u uma curva geodésica. Mostre que: $u^\mu u_{\nu;\mu} = 0$

Problema #2

Seja $u(t,s)$ uma família de geodésicas, e $v(t,s)$ o vetor de desvio para essa família:

$$u^\mu = \frac{dX^\mu(t,s)}{dt}, \quad v^\mu = \frac{dX^\mu(t,s)}{ds}$$

Isso implica que: $[u, v]^\mu = u^\nu v^\mu_{;\nu} - v^\nu u^\mu_{;\nu} = 0$

Use isso para calcular a aceleração de v no tempo t :

$$\frac{D^2 v^\mu}{D t^2} = u^\alpha D_\alpha (u^\beta D_\beta v^\mu)$$

e derive a equação do desvio geodésico.

(N.B.: aqui t é apenas um parâmetro, e não x^0 !)

Problema #3

Tome uma geodésica tipo-tempo, $U^\mu U_\mu = -1$, num espaço-tempo de métrica $g_{\mu\nu}$.

Mostre que $h_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} + U_\mu U_\nu$ é a métrica genuína das hipersuperfícies do tipo-espaço, definidas por essa geodésica - e que $h_{\mu\nu}$ é um operador de projeção nesse sub-espaço.

Problema #4

(a) Resolva a Equação de Raychaudhuri para θ , supondo $\omega = \sigma = R = 0$. - i.e., Minkowski.

(b) Mostre que a família de geodésicas tipo-tempo $U^\mu = \gamma(v)[1, v]$, com $v = r/t$, são soluções para o θ calculado no item (a)

(c) Qual a interpretação de θ ? Ele é bem definido para qualquer r e qualquer t ?

Buracos negros

Leitura adicional sugerida (divulgação científica):

Kip S. Thorne, "Black holes and time warps: Einstein's outrageous legacy"

Isaac Asimov, "O colapso do universo"

Buracos negros

Segundo Newton, a aceleração da gravidade da Terra é: $g_1 = \frac{GM}{r_1^2} \simeq 10 \text{ m/s}^2$

É mais interessante calcular o potencial:

$$\phi_1 = \frac{GM}{r_1} \simeq (8,2 \times 10^3 \text{ m/s})^2$$

Agora imagine que toda a massa da Terra fosse compactada no tamanho de uma bolinha de gude.

Aí o potencial gravitacional na vizinhança da bolinha seria:

$$\phi_2 \simeq (2.8 \times 10^8 \text{ m/s})^2$$

Buracos negros

Na Relatividade Geral, uma massa M "pontual" gera uma **métrica** do espaço-tempo conhecida como **Métrica de Schwarzschild (1916)**:

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2GM}{r c^2} \right) c^2 dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{r c^2} \right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

$c=1$ (unidades "naturais")

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2GM}{r} \right) dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{r} \right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

O que acontece quando temos uma grande massa concentrada em um volume muito pequeno, menor que o **Raio de Schwarzschild**?

$$R_s = \frac{2GM}{c^2} \rightarrow 2GM$$

Introdução à Cosmologia Física - Aulas 5 e 6

Vamos primeiro examinar o que acontece com o **cone de luz futuro** no espaço-tempo de Schwarzschild.

Fora do Raio de Schwarzschild, temos a situação usual: o cone de luz futuro aponta para... o futuro! (Ou seja, na direção de t crescendo.)

Porém, dentro do Raio de Schwarzschild o cone de luz futuro aponta na direção radial! Ou seja, o futuro de qualquer partícula, de qualquer corpo material, não importa as suas "particularidades", aponta para o ponto $r=0$ (onde está a massa M).

Em outras palavras: uma vez dentro do buraco negro, não há saída — nem para a luz!

No ponto $r=0$ a curvatura do espaço-tempo é infinita, e temos o que é conhecido como **singularidade**.

Agora vamos ver o que acontece com as **trajetórias** de massas-teste no espaço-tempo de Schwarzschild.

Lembre-se: é **trivial** (mesmo!) calcular as trajetórias, dada uma métrica — basta utilizar a **Equação da Geodésica!**

Notebook Mathematica...

Introdução à Cosmologia Física - Aulas 5 e 6

Buracos negros existem - e eles estão mais próximos do que você imagina!!!

Year: 1995.0

$$M \simeq 4.1 \times 10^6 M_{\odot}$$

The Acceleration of Stars Orbiting
the Milky Way's Central Black Hole

Data: Andrea Ghez, Jessica Lu (UCI/A)
Visualization: Dinoj Surendran, Randy Landsberg,
Mark Subbarao (UChicago / Adler / KICP)

UCLA/Keck Galactic Center Group

20/Agosto: as Equações de Einstein

Matéria e gravidade têm que funcionar dentro de uma **dinâmica consistente**

⇒ **Simetrias básicas implicam em leis de conservação (Teorema de Noether)**

Introdução à Cosmologia Física - Aulas 5 e 6

Simetrias e leis de conservação

Invariância sob translações/reparametrizações do **tempo** $\rightsquigarrow$ Conservação de **energia**

Invariância sob translações/reparametrizações do **espaço** $\rightsquigarrow$ Conservação de **momento**

Invariância sob **rotações** $\rightsquigarrow$ Conservação de **momento angular**

Mas e quanto aos **boosts** (rotações t-x)? Eles também são simetrias...

Além disso, elas misturam energia e momento! $P^\mu = mU^\mu$, $P'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} P^\alpha$

Conservação de momento para partículas pontuais (não-relativ.):

$$t \rightarrow t + \delta t$$

$$q \rightarrow q + \dot{q} \delta t$$

$$\dot{q} \rightarrow \dot{q} + \ddot{q} \delta t + \dot{q} \delta \dot{t}$$

$$S = \int dt L(q, \dot{q}) \quad , \quad L(q, \dot{q}) = \frac{1}{2} \dot{q}^2 - V(q)$$

$$\delta S = \int dt \left[\frac{\partial L}{\partial q} \delta q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} \right] = \int dt \left[\dot{q} (\ddot{q} \delta t + \dot{q} \delta \dot{t}) - \frac{dV}{dq} \dot{q} \delta t \right]$$

$$\delta S_i^f = \cancel{[\dot{q}^2 \delta t]_i^f} - \int_i^f dt \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} \dot{q}^2 + V(q) \right] \delta t = 0$$

Energia = "carga" conservada
 $t \rightarrow t + \delta t$: simetria "global"

Simetria de gauge (local) das teorias covariantes: transformações de coordenadas

$$x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + \xi^\mu$$

Sob uma transformação de coordenadas, a métrica muda como:

$$g^{\mu\nu} \rightarrow g'^{\mu\nu} = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\beta} g^{\alpha\beta} = g^{\mu\nu} + \underbrace{\xi^{\mu;\nu} + \xi^{\nu;\mu}}_{\delta g^{\mu\nu}} + \mathcal{O}(\xi^2)$$

Em particular, se a métrica é invariante sob uma tal transformação, então ξ é um **vetor de Killing** (uma direção associada com alguma simetria).

Problema #5

Tome o espaço 3-dimensional de curvatura constante (GLB) em coordenadas esféricas:

$$d\Sigma_3^2 = \frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\Omega^2$$

Quantos vetores de Killing existem nesse espaço? Quais os seus significados?

Introdução à Cosmologia Física - Aulas 5 e 6

A **dinâmica** da matéria deveria ser independente do sistema de coordenadas, e portanto a **ação da matéria** deveria ser **invariante** sob uma transformação de coordenadas:

$$S_m = \int d^4x \sqrt{-g} \mathcal{L}_m$$

$$\delta_\xi S_m = \int d^4x \left[\frac{\partial \sqrt{-g} \mathcal{L}_m}{\partial g^{\mu\nu}} \delta g^{\mu\nu} + \frac{\partial \sqrt{-g} \mathcal{L}_m}{\partial (\partial_\alpha g^{\mu\nu})} \partial_\alpha \delta g^{\mu\nu} \right]$$

$$\delta_\xi S_m = \int d^4x \frac{\sqrt{-g}}{2} T_{\mu\nu} (\xi^{\mu;\nu} + \xi^{\nu;\mu}) = \int d^4x \sqrt{-g} T^{\mu\nu} \xi_{\mu;\nu}$$

Mas como: $T^{\mu\nu} \xi_{\mu;\nu} = (T^{\mu\nu} \xi_\mu)_{;\nu} - T^{\mu\nu}_{;\nu} \xi_\mu = \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\nu (\sqrt{-g} T^{\mu\nu} \xi_\mu) - T^{\mu\nu}_{;\nu} \xi_\mu$

$$\delta_\xi S_m = \int d^4x \left[\partial_\nu (\sqrt{-g} T^{\mu\nu} \xi_\mu) - T^{\mu\nu}_{;\nu} \xi_\mu \right] \rightarrow 0$$

Então, temos as leis de **conservação**: $T^{\mu\nu}_{;\nu} = 0$

$$V^\mu_{;\mu} = \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\mu (\sqrt{-g} V^\mu)$$

$$\Rightarrow \int_{\mathcal{V}} d^4x \sqrt{-g} V^\mu_{;\mu} = (\sqrt{-g} V^\mu \mathcal{N}_\mu)_{\mathcal{N}_\mu: \mathcal{S}(\mathcal{V})}$$

É OK assumir que isso se anula. Mas por quê?...

- $T_{\mu\nu}$:
- Energia
 - Momento
 - Estresses/fluxos de energia

Introdução à Cosmologia Física - Aulas 5 e 6

O Tensor de Energia e Momento (TEM)

Em geral, é mais informativo construir o TEM de primeiros princípios.

Num meio contínuo, as quantidades relevantes são: a **4-velocidade**, a **densidade de energia**, a **pressão isotrópica**, e o **estresse de cisalhamento**.

Considere um elemento de fluido:

Introdução à Cosmologia Física - Aulas 5 e 6

No espaço-tempo de **Minkowsky** um fluido em repouso, sem nenhum estresse, fica determinado completamente em termos de sua **densidade de energia e pressão**:

$$\begin{aligned} T^{00} &= \rho & T^{0i} &= 0 \\ T^{ij} &= p \delta^{ij} & U^\mu &= (1, 0, 0, 0) \end{aligned}$$

Ou, em termos da 4-velocidade: $T^{\mu\nu} = (\rho + p)U^\mu U^\nu + p \eta^{\mu\nu}$

Para um fluido em movimento basta substituir a 4-velocidade por:

$$U^\mu \rightarrow \gamma(v)(1, \vec{v})$$

Nós temos então que:

$$\begin{aligned} T^{00} &= \gamma^2(\rho + p) - p = \frac{\rho + p v^2}{1 - v^2} \\ T^{0i} &= \frac{\rho + p}{1 - v^2} v^i & \Rightarrow \partial_\mu T^{\mu 0} &= \frac{\partial}{\partial t} \frac{\rho + p v^2}{1 - v^2} + \frac{\partial}{\partial x^i} \frac{(\rho + p) v^i}{1 - v^2} \\ T^{ij} &= \frac{\rho + p}{1 - v^2} v^i v^j + p \delta^{ij} \end{aligned}$$

Introdução à Cosmologia Física - Aulas 5 e 6

No limite não-relativístico [i.e., jogamos fora termos $O(v^2)$], a conservação do TEM resulta na famosa **equação da continuidade**:

$$\partial_\mu T^{\mu 0} = \frac{\partial}{\partial t} \frac{\rho + p v^2}{1 - v^2} + \frac{\partial}{\partial x^i} \frac{(\rho + p) v^i}{1 - v^2}$$
$$\simeq \dot{\rho} + \vec{\nabla} \cdot [(\rho + p) \vec{v}] \simeq \dot{\rho} + (\rho + p) \vec{\nabla} \cdot \vec{v}$$

Por quê é OK desprezar $\vec{\nabla}(\rho + p) \cdot \vec{v}$?

Isso é também equivalente à **conservação de energia** que herdamos da Termodinâmica:

$$dE + p dV = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{V} \frac{d(\rho V)}{dt} + p \frac{1}{V} \frac{dV}{dt} = \frac{d\rho}{dt} + (\rho + p) \frac{1}{V} \frac{dV}{dt} = 0$$

onde o volume muda de acordo com a divergência da velocidade:

$$\frac{1}{V} \frac{dV}{dt} = \vec{\nabla} \cdot \vec{v}$$

Conservação do TEM: $\left\{ \begin{array}{l} \bullet \text{ Conservação de energia} \\ \bullet \text{ Equação de Euler} \end{array} \right.$

Problema #6

(a) Um campo escalar tem uma Lagrangeana:

$$L = \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - V(\phi) \right]$$

Encontre o seu TEM. Dica: $\delta(\sqrt{-g}) = \frac{1}{2} \sqrt{-g} g^{\mu\nu} \delta g_{\mu\nu} = -\frac{1}{2} \sqrt{-g} g_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu}$

(b) Encontre a Equação de Klein-Gordon (a "equação de movimento" para o campo) como resultado da conservação do TEM.

(c) Encontre a Equação de Klein-Gordon através do princípio variacional em termos do próprio campo escalar.

(d) Você é capaz de escrever esse TEM em termos de um "fluido",

$$T_{\mu\nu} = (\rho + p) U_\mu U_\nu + p g_{\mu\nu} \quad ?$$

Problema #7

(a) Tome como ponto de partida a Lagrangeana do Eletromagnetismo:

$$L_{EM} = \frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \quad , \quad F_{\mu\nu} = \partial_\nu A_\mu - \partial_\mu A_\nu$$

Encontre o TEM do campo eletromagnético.

(b) Mostre que esse TEM é conservado devido às Equações de Maxwell (em espaços-tempo curvos).

(c) Mostre que, em 4D, o EM no vácuo é "conformemente invariante", i.e., as soluções das Equações de Maxwell são invariantes sob as transformações:

$$g_{\mu\nu} \rightarrow \bar{g}_{\mu\nu} = \Omega^2 g_{\mu\nu}$$

Introdução à Cosmologia Física - Aulas 5 e 6

As Equações de Einstein, finalmente!

A conservação do TEM deve ter uma contrapartida do lado da métrica do espaço-tempo. De fato, a ação de Einstein-Hilbert satisfaz esse vínculo, e temos que:

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{R}{16\pi G} + L_m \right] \longrightarrow G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = -8\pi GT_{\mu\nu}$$

Devido ao **Princípio Cosmológico**, em primeira aproximação os lados direito e esquerdo dessa equação devem ser **funções do tempo, apenas**.

Os únicos **parâmetros livres** dessa teoria são **constantes** no espaço e no tempo:

Métrica:

Curvatura espacial
Constante Cosmológica (Λ)

Matéria:

Massas
Constantes de acoplamento

A cinemática do universo: as equações de Friedmann

A. Friedmann (1922-24), G. Lemaitre (1927), H. P. Robertson (1935-36), A. G. Walker (1937)

Seções espaciais de curvatura constante:

$$ds^2 = -dt^2 + a^2(t) d\Sigma^2$$

Def.: $a(t_0)=1$

$$d\Sigma^2 = \frac{dr^2}{1-r^2} + r^2 d\Omega^2$$

$(r/R_0)^2$

$$d\Sigma^2 = \frac{dr^2}{1+r^2} + r^2 d\Omega^2$$

$(r/R_0)^2$

$$d\Sigma^2 = dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

Introdução à Cosmologia Física - Aulas 5 e 6

Alguns sistemas de coordenadas populares usados para expressar as seções espaciais de FLRW:

Coordenadas polares:
$$d\Sigma^2 = \frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\Omega^2$$

$$k = \pm (R_0)^{-2}$$

Coordenadas hiper-esféricas:

$$r = \frac{1}{\sqrt{k}} \sin(\sqrt{k} \chi) \Rightarrow d\Sigma^2 = d\chi^2 + \frac{1}{k} \sin^2(\sqrt{k} \chi) d\Omega^2$$

Coordenadas conformes-Cartesianas:

$$r = \frac{R}{1 + \frac{k}{4} R^2} \Rightarrow d\Sigma^2 = \frac{dR^2 + R^2 d\Omega^2}{(1 + \frac{k}{4} R^2)^2}$$

Seções
espaciais
homogêneas e
isotrópicas

A escolha mais comum é a segunda, já que em coordenadas hiper-esféricas as geodésicas radiais são triviais.

Problema #8

Mostre que a métrica das seções espaciais (3D) dos espaços-tempo FLRW em coordenadas conformes-Cartesianas,

$$d\Sigma^2 = \gamma_{ij} dx^i dx^j \quad , \quad \gamma_{ij} = \delta_{ij} \left(1 + \frac{1}{4} k \vec{x}^2 \right)^{-2}$$

possui um tensor de Riemann dado por:

$$R_{ijkl} = k (\gamma_{il}\gamma_{jk} - \gamma_{ik}\gamma_{jl})$$

Problema #9

O volume 3D é definido como:

$$V = \int d^3x \sqrt{\det \gamma}$$

Qual é o volume da 3-esfera? Mostre que esse resultado se reduz ao usual no limite em que a curvatura espacial (k) é muito pequena.

Geodésicas nos espaços-tempos FLRW

Vamos tomar a métrica FLRW em coordenadas conformes-Cartesianas:

$$ds^2 = -dt^2 + a^2(t) d\Sigma^2$$

$$d\Sigma^2 = \gamma_{ij} dx^i dx^j \quad , \quad \gamma_{ij} = \delta_{ij} \left(1 + \frac{1}{4} k \vec{x}^2 \right)^{-2}$$

As conexões são:

$$\Gamma_{00}^0 = \Gamma_{00}^i = \Gamma_{i0}^0 = 0$$

$$\Gamma_{ij}^0 = \dot{a} a \gamma_{ij} \quad , \quad \Gamma_{0j}^i = \frac{\dot{a}}{a} \delta_j^i$$

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{k}{2} \left(\frac{1}{1 + \frac{k}{4} \vec{x}^2} \right) \times (\delta_{ij} x^k - \delta_{ik} x^j - \delta_{jk} x^i)$$

Problema #10

Calcule o tensor de Riemann da métrica FLRW nesse sistema de coordenadas. Quantas componentes independentes tem esse tensor?

Introdução à Cosmologia Física - Aulas 5 e 6

Uma partícula inicialmente em repouso nessas coordenadas tem uma 4-velocidade:

$$U_0^\mu = \left. \frac{dx^\mu}{d\tau} \right|_0 = (1, 0, 0, 0)$$

A equação da geodésica é: $\frac{dU^\mu}{d\tau} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu U^\alpha U^\beta = 0$

o que implica nas seguintes equações:

$$\mu = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{dU^0}{d\tau} + \Gamma_{ij}^0 U^i U^j = 0$$

$$\mu = k \quad \rightarrow \quad \frac{dU^k}{d\tau} + 2\Gamma_{0i}^k U^0 U^i + \Gamma_{ij}^k U^i U^j = 0$$

A solução para essas equações é: $U^\mu = U_0^\mu = (1, 0, 0, 0)$

Portanto, uma partícula em repouso em qualquer lugar desse espaço-tempo permanecerá em repouso, na mesma posição!

Esse é o significado prático (cinemático) de "homogeneidade e isotropia"!

Problema #11

Considere uma partícula se movendo com alguma velocidade inicial "peculiar" v_0 :

$$U_0^\mu = \gamma(v_0)(1, \vec{v}_0)$$

Encontre a para a equação da geodésica neste caso. Faça aproximações se for absolutamente necessário. O que acontece ao longo do tempo com essa velocidade peculiar inicial? Ela aumenta ou decai?

Fim da Aula 5/6

Leituras para a próxima aula (25/8):

Ryden, Cap. 3.3, 3.4 e 4.1