4 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS E APLICAÇÕES

•4.1 Introdução:

•Uma equação diferencial é uma equação que envolve uma função incógnita e suas derivadas. Exemplos de tais equações são:

$$\frac{dy}{dt} = 6t + 3$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 3y + t = 0$$

$$e^y \frac{d^2y}{dt^2} + 2\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 1$$

Equação diferencial ordinária (E.D.O):

a função incógnita depende de apenas uma variável independente.

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - 4t = 0 \quad \text{é uma E.D.O. ,}$$

Equação diferencial parcial (E.D.P):

a função incógnita depende de mais de uma variável independente.

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} - 4 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0 \quad \text{é uma E.D.P.}$$

- Forma de apresentação:
- Normal: $y' = f(x,y)$
- Diferencial: $M(x,y) dx + N(x,y) dy = 0$

- Exemplo:

- $y' = \frac{3x-2y}{5} \rightarrow \text{Normal}$

- $(3x - 2y)dx - 5dy = 0 \rightarrow \text{Diferencial}$

Classificação: Ordem e grau

- Ordem: derivada de mais alta ordem

$$\text{primeira ordem} \rightarrow \frac{dy}{dx}$$

$$\text{segunda ordem} \rightarrow \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

.....

- Grau: expoente da derivada de mais alta ordem

$$\text{primeiro grau} \rightarrow \left(\frac{dy}{dx} \right)$$

$$\text{segundo grau} \rightarrow \left(\frac{dy}{dx} \right)^2$$

....

$$\frac{dy}{dx} = 2x$$

$\frac{dy}{dx} = 2x \rightarrow$ E.D.O. de primeira ordem e do primeiro grau ,

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + y = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = 2x \rightarrow \text{E.D.O. de primeira ordem e do primeiro grau ,}$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + y = 0 \rightarrow \text{E.D.O. de segunda ordem e do primeiro grau ,}$$

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 4 - y^2$$

$$\frac{dy}{dx} = 2x \rightarrow \text{E.D.O. de primeira ordem e do primeiro grau ,}$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + y = 0 \rightarrow \text{E.D.O. de segunda ordem e do primeiro grau ,}$$

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 4 - y^2 \rightarrow \text{E.D.O. de primeira ordem e do segundo grau ,}$$

$$\frac{d^3 z}{dz^3} + x \left(\frac{d^2 z}{dx^2}\right)^2 - xz \frac{dz}{dx} + 10 = 0 .$$

Solução de uma equação diferencial

- A solução de uma EDO é uma outra equação que satisfaz a EDO.
- Exemplo: $y = C \cdot \text{sen} x$ é a solução geral de $y'' + y = 0$

- Toda equação que envolve pelo menos uma derivada é um equação diferencial.
- Se uma equação diferencial pode ser escrita na forma

$$\frac{d^n y}{dx^n} = f(x)$$

sua solução é obtida de maneira direta por integrações.

- A maioria das equações diferenciais não tem solução por integração direta !!!
- Veremos métodos para obter as soluções diferenciais ordinárias de maior aplicação em engenharia.
- SOLUÇÃO GERAL: conjunto de todas as suas soluções. Apresenta a constante de integração.
- SOLUÇÃO PARTICULAR: Solução resolvendo PVI (problema de valor inicial)

Exemplo

Seja, EDO $y'^2 - xy' + y = 0$

$y = Cx - C^2$ é a solução geral

Achar soluções particulares se PVI $x = 0 \rightarrow y = -4$

Uso de Equações Diferenciais em Modelagem

Exemplos:

Desintegração radioativa → taxa com que a massa se desintegra é proporcional a massa ainda existente

$$\frac{dM}{dt} = -K \cdot M$$

•Modelagem

Exemplos:

Lei de resfriamento de Newton → taxa de resfriamento do corpo é proporcional à diferença de temperatura entre o corpo e o meio

$$\frac{dT}{dt} = -K \cdot [T - T_{meio}]$$

• Modelagem

Exemplos:

Diluição de sal

$$\frac{dM}{dt} = -K \cdot \frac{M}{V}$$

Modelagem:

Exemplos

Crescimento populacional sem restrição → Lei de Malthus

$$\frac{dP}{dt} = K \cdot P$$

Crescimento populacional com restrição → Proporcional à população que falta pra a população máxima

$$\frac{dP}{dt} = K (P_{m\acute{a}x} - P)$$

•4.2 EDO de 1° ordem

•5 tipos

Separadas e separáveis (x,y) ★

Homogêneas(todos os termos do mesmo grau)

Exatas

Exatas por fator integrante

Lineares (y e y'' são do primeiro grau) ★

EDO de primeira ordem de variáveis separáveis

EDO de 1° ordem genérica: $M(x,y) dx + N(x,y) dy = 0$

EDO separada: $M(x) dx + N(y) dy = 0$

EDO separável: EDO genérica que se torna separada por meio de artifícios

→ Solução Geral por integração.

- Exemplos:

- $2y \, dy + \sin x \, dx = 0$

- $y' = 1 + x + y^2 + xy^2$

- $(1 + x) y \, dx + (1 - y) x \, dy = 0$

- Resolver o PVI: $2y \, dy + \sin x \, dx = 0$ para $x = \frac{\pi}{2}$ $y = 0$

EDO lineares

Uma EDO de ordem qualquer pode ser dita linear se ela puder ser escrita da seguinte forma:

$$u(x)y + v(x)y' + w(x)y'' + r(x)y''' + \dots = g(x)$$

O que significa que a variável y e suas derivadas só podem estar multiplicadas por funções e x

- Exemplos:

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + 2y = \text{sen } x \rightarrow 2^\circ \text{ ordem linear}$$

$$(1 + y^2) \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + y = e^{-x} \rightarrow 2^\circ \text{ ordem não linear}$$

$$\frac{d^4 y}{dx^4} + \frac{d^3 y}{dx^3} + \frac{d^2 y}{dx^2} + y = 1 \rightarrow 4^\circ \text{ ordem linear}$$

$$\frac{dy}{dx} + xy^2 = 0 \rightarrow 1^\circ \text{ ordem não linear}$$

EDO de primeira ordem linear

Uma EDO de 1° ordem é dita linear se ela puder ser escrita da seguinte forma:

$$y' + p(x)y = g(x)$$

No caso particular de $g(x) = 0 \rightarrow$ EDO linear homogênea
(EDO linear incompleta)

$$y' + p(x)y = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{dy}{y} = -p(x)dx$$

Solução de uma EDO de primeira ordem linear

Dada EDO de 1° ordem : $y' + p(x)y = g(x)$

A solução é dada por:

$$y(x) = \frac{1}{\mu(x)} \cdot \left[\int \mu(x) \cdot g(x) dx + C \right]$$

Sendo $\mu(x) = e^{\int p(x) dx}$

- Exemplos:

$$y' + 2y = e^{-x}$$

$$y' + y = x e^{-x} + 1$$

4.3 Algumas aplicações da EDO de primeira ordem linear

Problema de mistura de soluções: O objetivo é obter uma equação que expresse como a massa de um sal no tanque varia ao longo do tempo, assumindo que a solução se homogeneiza instantaneamente dentro do tanque.

- Exemplo:
- Sendo dados: $V_0 = 100\text{L}$
 - $Q_e = 2\text{ L/minuto}$
 - $Q_s = 1\text{ L/minuto}$
 - $C_e = 0,2\text{ kg/L}$
 - $M_0 = 10\text{ kg}$

Pede-se: a) a massa no tanque em $t = 50$ minutos
b) A concentração em $t = 50$ minutos

- Entregar:
- Sendo dados: $V_0 = 200$ galões
 - $Q_e = Q_s = 5$ galões/minuto
 - $C_e = 2$ libras/galão
 - $M_0 = 40$ libras

Pede-se:

- a) Qual a equação que expressa a massa de sal no tanque para qualquer tempo t
- b) Qual a concentração no tanque após se passarem 2 volumes de tanque

Algumas aplicações da EDO de primeira ordem linear

Problema de mistura de soluções em injetores de fertilizante: Volume é constante, entra água limpa sem sais.

4.4 EDO de primeira ordem especiais

- Equação de Ricatti $\rightarrow$ 1° ordem não linear aplicada a hidrodinâmica, determinar coeficiente angular da reta tangente a cada ponto da trajetória

$$y' = a_2(x)y^2 + a_1(x)y + a_0(x)$$

- Equação de Clairant $\rightarrow$ teorema relativo a linha geodésica e transporte de coordenadas (1726)

$$y(x) = \frac{x dy}{dx} + f\left(\frac{dy}{dx}\right)$$

4.4 EDO de primeira ordem especiais

- Equação de Bernoulli $\rightarrow$ para equações de crescimento

$$y' + p(x)y = g(x) y^n$$

- EDO de 1° ordem não linear
- Para $n \neq 0$ e $n \neq 1 \rightarrow$ linearizada
- Para $n = 0$ ou $n = 1 \rightarrow$ EDO linear

- Para $n \neq 0$ e $n \neq 1 \rightarrow$ linearizada

Procedimento:

$$y' + p(x)y = g(x) y^n \quad (\div y^n)$$

$$\frac{y'}{y^n} + \frac{p(x)y}{y^n} = g(x)$$

Simplificando:

$$z' + P(x)z = G(x)$$

- **Exemplo:**

- $$\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = 4y^2$$

- **Exemplo de equação de logística de VERHULST para crescimento populacional**

$$\frac{dP}{dt} = K P (Pmáx - P)$$

$$\frac{dP}{dt} = K Pmáx P - K P^2$$

4.5 EDO de segunda ordem incompletas

- Estudaremos apenas o caso em que os coeficientes são constantes, de uso mais frequente na engenharia.

$$A y'' + B y' + C y = 0 \text{ ou } f(x) \text{ ou } D$$

- EDO de 2° ordem incompletas → 4 casos:

1º caso) $y'' = f(x)$ ou uma constante

- Solução por duas integrações sucessivas.

- $\frac{d^2y}{dx^2} = \text{sen } x$

1º caso) $y'' = f(x)$ ou uma constante

- Solução por duas integrações sucessivas.

- $\frac{d^2y}{dx^2} = \text{sen } x \rightarrow \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \text{sen } x$

1º caso) $y'' = f(x)$ ou uma constante

- Solução por duas integrações sucessivas.

- $\frac{d^2y}{dx^2} = \text{sen } x \rightarrow \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \text{sen } x \rightarrow d \left(\frac{dy}{dx} \right) = \text{sen } x \, dx$

1º caso) $y'' = f(x)$ ou uma constante

- **Solução por duas integrações sucessivas.**

- $\frac{d^2 y}{dx^2} = \text{sen } x \rightarrow \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \text{sen } x \rightarrow d \left(\frac{dy}{dx} \right) = \text{sen } x \, dx$

- $\int d \left(\frac{dy}{dx} \right) = \int \text{sen } x \, dx$

1º caso) $y'' = f(x)$ ou uma constante

- Solução por duas integrações sucessivas.

- $\frac{d^2 y}{dx^2} = \text{sen } x \rightarrow \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \text{sen } x \rightarrow d \left(\frac{dy}{dx} \right) = \text{sen } x \, dx$

- $\int d \left(\frac{dy}{dx} \right) = \int \text{sen } x \, dx \rightarrow \frac{dy}{dx} = -\text{cos } x + C$

1º caso) $y'' = f(x)$ ou uma constante

- Solução por duas integrações sucessivas.

- $\frac{d^2 y}{dx^2} = \text{sen } x \rightarrow \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \text{sen } x \rightarrow d \left(\frac{dy}{dx} \right) = \text{sen } x \, dx$

- $\int d \left(\frac{dy}{dx} \right) = \int \text{sen } x \, dx \rightarrow \frac{dy}{dx} = -\text{cos } x + C$

- $dy = (-\text{cos } x + C) dx$

1º caso) $y'' = f(x)$ ou uma constante

- **Solução por duas integrações sucessivas.**

- $\frac{d^2 y}{dx^2} = \text{sen } x \rightarrow \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \text{sen } x \rightarrow d \left(\frac{dy}{dx} \right) = \text{sen } x \, dx$

- $\int d \left(\frac{dy}{dx} \right) = \int \text{sen } x \, dx \rightarrow \frac{dy}{dx} = -\text{cos } x + C$

- $dy = (-\text{cos } x + C)dx \rightarrow \int dy = \int (-\text{cos } x + C)dx$

1º caso) $y'' = f(x)$ ou uma constante

- **Solução por duas integrações sucessivas.**

- $\frac{d^2y}{dx^2} = \text{sen } x \rightarrow \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \text{sen } x \rightarrow d \left(\frac{dy}{dx} \right) = \text{sen } x \, dx$

- $\int d \left(\frac{dy}{dx} \right) = \int \text{sen } x \, dx \rightarrow \frac{dy}{dx} = -\text{cos } x + C$

- $dy = (-\text{cos } x + C)dx \rightarrow \int dy = \int (-\text{cos } x + C)dx$

- $y = -\text{sen } x + C_1 x + C_2$

2º caso) $y'' = f(y)$

- **Solução: artifício**

- Multiplica os dois membros por $2 \frac{dy}{dx} dx$

- *e considera:*
$$\frac{d\left[\left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]}{dx} = 2 \frac{dy}{dx} \frac{d^2y}{dx^2}$$

- *Exemplo:* $y'' = \frac{a}{y^3}$

3º caso) $y = f(x, y')$ ou $y = f(y')$

- Faz $u = y'$ e $u' = y''$
- Integrar em relação a x .
- Exemplo: $x^2 y'' + 2x y' - 1 = 0$

4° caso) $y = f(y, y')$

- Faz $u = y'$ e $u' = y''$
- $\frac{du}{dx} = \frac{du}{dy} \cdot \frac{dy}{dx}$
- Integrar em relação a y .
- Exemplo: $y'' y + (y')^2 = 0$