

# Universidade de São Paulo Instituto de Física

## FÍSICA MODERNA I

---

### AULA 15

Profa. Márcia de Almeida Rizzutto  
Pelletron – sala 220  
rizzutto@if.usp.br

2o. Semestre de 2018

Página do curso:

<https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=64495>

01/10/2018

# OPERADORES – OBSERVÁVEIS RESUMIDAMENTE

1- no caso da posição o operador é o próprio valor da posição:

$$\hat{x} \Leftrightarrow x$$

2 - no caso do momento, operador é dado por:

$$\hat{p} \Leftrightarrow -i \frac{\partial}{\partial x}$$

$$\bar{p} = \langle p \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^*(x, t) \left( -i \frac{\partial}{\partial x} \right) \Psi(x, t) dx$$

3 - no caso da energia, operador é dado por:

$$\hat{E} = i \frac{\partial}{\partial t}$$

$$\bar{E} = \langle E \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^*(x, t) \left( i \frac{\partial}{\partial t} \right) \Psi(x, t) dx$$

## OBSERVÁVEIS - VALOR ESPERADO

Temos então que o valor esperado de qualquer grandeza que depende da posição, do momento, da energia posso determinar através de:

$$\bar{f}(x, p, E) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^*(x, t) \hat{f} \left( x, -i \frac{\partial}{\partial x}, i \frac{\partial}{\partial t} \right) \Psi(x, t) dx$$

O valor médio de uma grandeza em mecânica quântica é normalmente chamado de valor esperado, que é o valor que se espera obter de uma medida daquela grandeza.


Observe que não esperamos necessariamente que o valor de uma medida tenha uma alta probabilidade de ser igual ao valor esperado.

Função de onda para o elétron (associar ao elétron uma onda cossenoide)

Função de onda

$$\Psi(x) = A \cos\left(\frac{n\pi}{a} x\right)$$

$$-\frac{a}{2} \leq x \leq \frac{a}{2}, n = 1, 2, 3 \dots$$



A probabilidade que a partícula seja encontrada em um ponto na coordenada \$x\$ entre \$-a/2\$ e \$a/2\$ é :

$$P(x) = |\Psi(x)|^2 dx$$

$$\Psi_n^2(x) = A^2 \cos^2\left(\frac{n\pi}{a} x\right)$$

$$P(x) = \Psi^*(x)\Psi(x)dx$$

$$P(x) = \int_{-a/2}^{+a/2} A^2 \cos^2\left(\frac{n\pi}{a} x\right) dx$$

$$A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

$$\theta = \frac{\pi}{a} x$$

$$d\theta = \frac{\pi}{a} dx$$

$$P(x) = A^2 \frac{a}{\pi} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \cos^2 \theta d\theta = 1$$

↙  $\frac{\pi}{2}$


Qual o valor médio da posição da partícula dentro desta caixa:

$$\Psi(x) = A \cos\left(\frac{n\pi}{a} x\right)$$

$$-\frac{a}{2} \leq x \leq \frac{a}{2}, n = 1, 2, 3, \dots$$

Vimos que :

$$\bar{x} = \int_{-\infty}^{+\infty} x P(x, t) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^*(x, t) x \Psi(x, t) dx$$



$$\bar{x} = \frac{2}{a} \int_{-a/2}^{+a/2} x \cos^2\left(\frac{\pi}{a} x\right) dx$$

Função ímpar      Função par

Como a integral é sobre um valor ímpar em uma região simétrica a integral é nula

$$\bar{x} = \langle x \rangle = 0$$


O valor médio da posição do elétron na caixa no estado  $n=1$  é em  $x=0$

Qual o valor médio do momento da partícula dentro desta caixa:

$$\Psi(x) = A \cos\left(\frac{n\pi}{a} x\right)$$

Vimos que :

$$\bar{p} = \int_{-\infty}^{+\infty} p P(x, t) dx = \int_{-a/2}^{+a/2} \Psi^*(x, t) p \Psi(x, t) dx \quad -\frac{a}{2} \leq x \leq \frac{a}{2}, n = 1, 2, 3 \dots$$



$$\bar{p} = \frac{2}{a} \int_{-a/2}^{+a/2} \cos\left(\frac{\pi}{a} x\right) \left( -i \frac{\partial}{\partial x} \left( \cos \frac{\pi}{a} x \right) \right) dx$$

$$\bar{p} = (-i) \frac{2}{a} \frac{\pi}{a} \int_{-a/2}^{+a/2} \cos\left(\frac{\pi}{a} x\right) \left( -\text{sen} \frac{\pi}{a} x \right) dx$$

Função par

Função ímpar

$$\bar{p} = \langle p \rangle = 0$$

Como a probabilidade da partícula estar se movendo no sentido positivo do eixo  $x$  é igual a probabilidade de estar se movendo no sentido oposto, o momento médio é nulo.

Qual o valor médio do momento ao quadrado da posição da partícula dentro desta caixa:

$$\Psi(x) = A \cos\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$$

$$-\frac{a}{2} \leq x \leq \frac{a}{2}, n = 1, 2, 3, \dots$$

$$\hat{p} \Leftrightarrow -i \frac{\partial}{\partial x}$$

$$\hat{p}^2 \Leftrightarrow \left(-i \frac{\partial}{\partial x}\right) \left(-i \frac{\partial}{\partial x}\right)$$

$$\left(-i \frac{\partial}{\partial x}\right) \left(-i \frac{\partial}{\partial x}\right) \Psi = - \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = - \frac{\pi^2}{a^2} \Psi$$

$$\langle p^2 \rangle = \frac{\pi^2}{a^2} \int_{-a/2}^{a/2} \Psi^* \Psi dx \quad \text{vale 1} \quad \boxed{\langle p^2 \rangle = \frac{\pi^2}{a^2}}$$

O momento médio quadrático:

$$\sqrt{\langle p^2 \rangle} = \frac{\pi}{a}$$

Que é uma medida das flutuações em torno da média, pois a partícula pode ser encontrada com momento

$$p = +\sqrt{2mE}$$

ou

$$p = -\sqrt{2mE}$$

Qual o valor da energia cinética média?

Vimos que:  $\sqrt{\langle p^2 \rangle} = \frac{\pi}{a}$

$$\langle p^2 \rangle = \frac{\pi^2}{a^2}$$

$$E = \frac{p^2}{2m} = \frac{1}{2m} \frac{h^2}{4\pi^2} \frac{\pi^2}{a^2} = \frac{h^2}{8ma^2}$$

que é o valor que havíamos determinado anteriormente por Sommerfeld

O mesmo vale para o  $\langle x^2 \rangle$ ?

$$\langle x^2 \rangle = \frac{a^2}{2\pi^2} \left( \frac{\pi^2}{6} - 1 \right) = 0.033a^2$$

Que não é zero embora

$\langle x \rangle = 0$ .  $\sqrt{\langle x^2 \rangle} = 0.18a$

Posição média quadrática, considerada como uma medida das flutuações em torno da média.

As flutuações existem porque a partícula não é sempre encontrada na mesma posição mas em várias posições.


$$\Delta p \Delta x = \sqrt{\langle p^2 \rangle} \sqrt{\langle x^2 \rangle} = 0.18a \frac{\pi}{a}$$

consistente com o limite de  $\frac{\hbar}{2}$

←  $\Delta p \Delta x = 0.57$

## Exercício: Partícula dentro de uma caixa

Uma partícula se encontra no estado fundamental dentro de um poço quadrado infinito de comprimento  $L$ . Calcule a probabilidade que esta partícula seja encontrada entre  $X=L/4$  e  $x=3L/4$



A densidade de probabilidade é dado por:  $|\Psi_n^2(x)|$

$$\Psi_n(x) = A \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{L}x\right), 0 \leq x \leq L,$$

Normalização:

$$1 = \int_0^L |\psi_n|^2 dx = \int_0^L A^2 \operatorname{sen}^2\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx$$

$$2\operatorname{sen}^2\theta = 1 - \cos 2\theta$$

$$1 = \frac{A^2}{2} \int_0^L 1 - \cos\left(\frac{2n\pi}{L}x\right) dx$$

$$1 = \frac{A^2 L}{2}$$

$$A = \sqrt{\frac{2}{L}}$$

O seno se anula para os extremos da integral:

## Exercício: Partícula dentro de uma caixa

Uma partícula se encontra no estado fundamental dentro de um poço quadrado infinito de comprimento  $L$ . Calcule a probabilidade que esta partícula seja encontrada entre  $X=L/4$  e  $x=3L/4$

A função de onda do estado fundamental é dada por:  $\Psi_1(x) = A \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{L}x\right), 0 \leq x \leq L,$

$$P(x) = \int_{L/4}^{3L/4} |\psi_1|^2 dx = \int_{L/4}^{3L/4} A^2 \operatorname{sen}^2\left(\frac{\pi}{L}x\right) dx$$

$$P(x) = \frac{2}{L} \frac{1}{2} \int_{L/4}^{3L/4} 1 - \cos\left(\frac{2\pi}{L}x\right) dx$$

$$P(x) = \frac{1}{L} \left[ x - \frac{L}{2\pi} \operatorname{sen} \frac{2\pi}{L}x \right]_{L/4}^{3L/4}$$

$$P(x) = \frac{1}{L} \left[ \left( \frac{3L}{4} - \frac{L}{4} \right) - \frac{L}{2\pi} \left( \operatorname{sen} \frac{2\pi}{L} \frac{3L}{4} - \operatorname{sen} \frac{2\pi}{L} \frac{L}{4} \right) \right]$$

$$P(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} = 0.818$$

É maior que  $1/2$  o qual é esperado para uma partícula clássica que gasta tempos iguais em todas as partes dentro da caixa

## Exercício:

Uma partícula dentro da caixa  
De tamanho L


$$\Psi_n(x) = A \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{L}x\right), 0 \leq x \leq L,$$

A densidade de probabilidade é dado por:  $P(x) = |\Psi_n^2(x)|$

Normalização:

$$A = \sqrt{\frac{2}{L}}$$

Primeiro estado:




$$\Psi_1^2(x) = \frac{2}{L} \operatorname{sen}^2\left(\frac{\pi}{L}x\right)$$

O valor mais provável de x, é dado pelo valor de x  
onde P(x) é máxima:

$$x_{mp} = \frac{L}{2}$$

$$\bar{x} = \int_{-\infty}^{+\infty} xP(x,t)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^*(x,t)x\Psi(x,t)dx$$




$x = 0$  at left wall of box.

## Exercício:

Uma partícula dentro da caixa  
De tamanho  $L$  (estado fundamental)


$$\Psi_1(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \text{sen}\left(\frac{\pi}{L} x\right)$$

Qual o valor médio da posição:  $\langle x \rangle$



$$\bar{x} = \frac{2}{L} \int_0^L x \text{sen}^2\left(\frac{\pi}{L} x\right) dx \quad \bar{x} = \langle x \rangle = \frac{L}{2}$$

Segundo estado excitado  $\Psi_2^2(x) = \frac{2}{L} \text{sen}^2\left(\frac{2\pi}{L} x\right)$



O valor mais provável de  $x$ , é dado pelo valor de  $x$  onde  $P(x)$  é máxima:

$$x_{mp} = \frac{L}{4} \text{ e } \frac{3L}{4} \quad \bar{x} = \langle x \rangle = \frac{L}{2}$$

$x = 0$  at left wall of box.

## Função de onda – interpretação:

Função de onda da partícula:

- Ao contrário de ondas mecânicas em uma corda, ou de ondas sonoras no ar, a função de onda de uma partícula **NÃO** é uma onda mecânica que necessita de um meio para se propagar.
- A função de onda descreve a partícula, porém, não podemos relacionar esta função de onda com os materiais nos quais a onda se propaga, como acontece para a onda mecânica
- Podemos apenas relacioná-la com os efeitos fisicamente observáveis.

**A função de onda descreve a distribuição de probabilidade de uma partícula no espaço, do mesmo modo que uma onda eletromagnética descreve a distribuição dos campos elétricos e magnéticos.**

$$P(x)dx = |\Psi(x, t)|^2 dx$$

$$P(x)dx = \Psi^*(x, t)\Psi(x, t)dx$$

E usamos isto porque a função de onda não é necessariamente uma grandeza real, pode ser uma grandeza complexa com uma parte real e imaginária.

## Mecânica Quântica – Equação de Schrödinger

A mecânica clássica não pode ser utilizada em sistemas nos quais as características de onda das partículas são manifestadas. Para entender as trajetórias destas partículas que mostram propriedades ondulatórias necessitamos de uma nova mecânica (chamada mecânica quântica)

Da segunda lei de Newton:

$$F = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

A solução desta equação é consistente com os experimentos em várias situações físicas

No lugar das equações de movimento da mecânica clássica da qual a posição exata da partícula no espaço a cada momento pode ser calculada, usaremos a mecânica quântica que fornece funções de onda que contem tudo que pode ser conhecido sobre a partícula de acordo com o principio de incerteza

As funções de onda da mecânica quântica podem ser derivada de equação diferencial fundamental conhecida como Equação de Schrödinger, que possui o mesmo status da equação da mecânica clássica de Newton. É um postulado que não tem descrição “*a priori*”, somente é consistente a solução desta e o experimento.