



BioGeoTec
Pesquisa e Soluções Ambientais



GlobalEnviron
Group

Biodegradação: aspectos teóricos e aplicações

Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Armas
eduardo@biogeotec.com.br

Uma perspectiva histórica

- Os Romanos – tratamento de esgotos
- A descoberta de degradadores de hidrocarbonetos
- A descoberta de degradadores de agrotóxicos
- A descoberta de microrganismos destoxificantes de metais




GlobalEnviron
Group



BioGeoTec
Pesquisa e Soluções Ambientais

Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Armas

A diversidade biológica dos solos



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Pesquisa e Soluções Ambientais

Importância dos Microrganismos do solo

- Formação do solo
- Biofertilizantes
- Controle biológico de doenças e pragas
- Fonte de genes para a engenharia genética
- Ciclagem de nutrientes
- Degradação de poluentes




Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Pesquisa e Soluções Ambientais

Comportamento ambiental de poluentes



Definições

* Degradação:

- “conversão de uma molécula orgânica em outras de menor energia”
- “processo de alteração na estrutura molecular, transformando uma substância em componentes menores ou mais simples por meios bióticos ou abióticos”
- “perda de atividade ou desaparecimento do xenobiótico”
- “Toda e qualquer transformação estrutural que uma molécula orgânica natural ou xenobiótica pode sofrer, por meios biótico ou abiótico, resultando na perda de sua atividade original”

* Biotransformação ou biodegradação:

- “degradação parcial de uma molécula orgânica mediada por organismos ou enzimas livres”
- “transformação biológica de um composto químico orgânico para outra forma, sem se referir a extensão”

Definições

* Mineralização:

“conversão completa de uma molécula orgânica em compostos inorgânicos e biomassa”

* Remediação:

- “Conjunto de tecnologias adotadas para redução ou eliminação de compostos perigosos ao ambiente”

* Biorremediação:

- “Conjunto de tecnologias que empregam processos biológicos isoladamente ou associados a técnicas de engenharia para redução ou eliminação de compostos perigosos ao ambiente”



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Biodegradação

Principais reações bioquímicas envolvidas no metabolismo microbiano de pesticidas:

- Reações oxidativas
- Reações redutivas
- Reações hidrolíticas
- Reações sintéticas
(conjugação e condensação ou polimerização)



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Biodegradação

Processos de transformação microbiana:

- Catabolismo
- Cometa-bolismo
- Polimerização ou conjugação
- Acumulação
- Efeitos secundários de atividade microbiana



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Biodegradação associada ao crescimento microbiano


- * Microrganismos utilizam moléculas orgânicas como fonte de C e energia para produção de biomassa
- * Biodegradação associada ao crescimento resulta em mineralização
- * C-orgânico é convertido em CO_2 e componentes celulares



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Biodegradação associada ao crescimento microbiano



- A - Contaminant introduction (spill occurs, etc.); lag phase begins
- B - Acclimation complete, nutrients available, log growth & degradation begin
- C - Second nutrient addition, continued growth & degradation
- D - Growth stabilized, stationary phase, active and brisk remediation
- E - Food source depleting, bacterial count declines as death phase begins
- F - Remediation complete, biomass degenerates, population stabilizes
- G - Endpoint of project with clean site


Dinâmica do crescimento microbiano e degradação de contaminante em uma Biodegradação Ideal



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Biodegradação associada ao crescimento microbiano




Bactérias utilizam 4-nitrofenol como fonte de C para produção de biomassa, em esgoto com 2 mg L⁻¹ de 4-nitrofenol



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Aclimação, Adaptação ou Fase Lag




Degradação de 2,4,5-T em diferentes solos

Causas do período de aclimação

- * Proliferação de pequenas populações
- * Presença de compostos ou concentrações tóxicas
- * Predação por protozoários
- * Seleção de novos genótipos
- * Diauxia
- * Indução da síntese de enzimas

Causas do período de aclimação




Diauxia



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Causas do período de aclimação



Indução da síntese de enzimas



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Degradação Acelerada




Figura 6.14. Desaparecimento do aldicarbe e formação e degradação de seus produtos de oxidação em solo nunca tratado e previamente tratado com o produto (Smitt e et al., 1987).



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Cometabolismo

- * Degradação de uma molécula orgânica por microrganismos incapazes de utilizá-la como fonte de energia. A população metabolicamente ativa não obtém benefícios nutricionais do substrato cometabolizado.
- * Exemplos: DDT; 2,4,5-T; fenol; PCBs



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Cometabolismo

Razões para sua ocorrência:

- * Enzimas iniciais geram produtos não metabolizáveis por outras enzimas;
- * Produtos gerados inibem atividade enzimática subsequente ou suprimem crescimento microbiano;
- * Necessidade de um segundo substrato para promover uma reação específica (ex.: doador de elétron)



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Adsorção x degradação

- * Redução da biodisponibilidade
- * Formação de resíduos ligados




FIG. 8.1 Mineralization of ^{14}C -labeled diquat in nutrient solutions with or without clay. (Reprinted with permission from Weber and Coble, 1968.)

- * Efeitos estimulantes à biodegradação



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Surfactantes x degradação

- * Aumento da solubilidade
- * Redução do contato bactéria-contaminante






FIG. 9.6 Effect of Triton X-100 on the mineralization by *Arthrobacter* sp. of hexadecane dissolved in heptamethylnonane. (From Efroymson and Alexander, 1991. Reprinted with permission from the American Society for Microbiology.)


Taxa de biodegradação depende da complexidade da molécula




Taxa de biodegradação depende da complexidade da molécula



Taxa de biodegradação depende da complexidade da molécula



Biodegradabilidade de hidrocarbonetos



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Condições para que ocorra biodegradação

- * Existir enzimas necessárias para biodegradação (microrganismo ativo ou enzima no solo)
- * Microrganismo ou enzima devem estar presentes no ambiente contendo a molécula a ser degradada
- * A molécula deve estar acessível à enzima
- * Se a enzima for extracelular, a região de ligação à molécula deve estar exposta
- * Se a enzima for intracelular, a molécula deve penetrar através da membrana plasmática
- * As condições ambientais devem ser favoráveis ao crescimento do microrganismo envolvido na degradação e à atividade enzimática



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Destoxificação




FIG. 4.3 Dehalogenations that represent detoxications.



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Ativação



Degradação de aldrin em dieldrin.




FIG. 5.3 Epoxidation of aldrin in soil leading to dieldrin. (Reprinted with permission from Singh et al., 1991.)



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Recalcitrância

O que define a recalcitrância de um composto?

- * Sorção de compostos, microrganismos e enzimas
- * Características edafo-climáticas desfavoráveis
- * Não existência de enzimas de degradação
- * Impermeabilidade da célula microbiana
- * Cometabolismo
- * A estrutura molecular do composto
- * A sua toxicidade



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Biodegradação: Aplicações

- * Suporte a ferramentas de predição comportamental
- * Tratamento de efluentes industriais
- * Tratamento de resíduos sólidos
- * Remediação de áreas contaminadas




Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo




Suporte à predição:

Gestão de fontes difusas de poluição em Bacias Hidrográficas




Suporte à predição:

Modelamento de plumas de contaminantes



Tratamento de Efluentes Industriais:

Degradação de corantes têxteis



indigo

- * Brasil é 7º maior produtor têxtil mundial
- * SP possui aproximadamente 1950 indústrias
- * Problemas ambientais
 - Metabólitos reativos
 - Turbidez nas águas superficiais
 - Difícil degradação



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Tratamento de Efluentes Industriais:

Descoloração de corantes têxteis



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Tratamento de Efluentes Industriais:

Descoloração de corantes têxteis



KAMIDA, H.M. (2004)



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Tratamento de Efluentes Industriais:

Descoloração de corantes têxteis

Descoloração
(biodegradação)
(ação de enzimas ligninolíticas)



Metabólitos secundários



Produtos tóxicos e ou
mutagênicos



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Tratamento de Efluentes Industriais:

Degradação de vinhaça



- * Resíduo ácido (pH 4,0 a 4,8)
- * Alta DBO (42.000 a 100.000 mg/L) e DQO (10.000 a 210.000 mg/L)
- * Odor forte
- * Coloração escura devido a melanoidinas
- * Elevado conteúdo mineral (K, Ca e Mg)



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Tratamento de Efluentes Industriais:

Degradação de vinhaça



Degradação de vinhaça em meio sintético para fungos

FERREIRA, L.F.R. (2009)



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Tratamento de Efluentes Industriais:

Degradação de vinhaça

Caracterização do resíduo

Parâmetros	Vinhaça 100%	Vinhaça tratada
pH (20°C)	3,95	5,34
DQO (mg L ⁻¹)	42.000	7.240
DBO (mg L ⁻¹)	11.310	2.795
Sólidos suspensos totais (mg L ⁻¹)	5.969	204
Condutividade elétrica (μS/cm)	8.630	7.070
N total (mg L ⁻¹)	70	112
K (mg L ⁻¹)	2.272	2.093
P (mg L ⁻¹)	200	29
Mg (mg L ⁻¹)	290	220
Na (mg L ⁻¹)	< 50	442
Ca (mg L ⁻¹)	460	140
Índice de fenóis (mg L ⁻¹)	1,1	0,02

FERREIRA, L.F.R. (2009)



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Tratamento de Efluentes Industriais:

Degradação de vinhaça

Toxicidade de vinhaça pura e tratada

Treatments	<i>P. subcapitata</i>	<i>D. magna</i>	<i>D. similis</i>	<i>H. attenuata</i>	
	CL ₅₀	CL ₅₀	CL ₅₀	CL ₅₀	CE ₅₀
Vinhaça pura	1,58	3,59	2,21	2,25	2,05
Vinhaça tratada	14,91	65,95	21,02	17,68	12,03

Valores expressos em porcentagem (% v/v)

Hydra attenuata



Daphnia magna

FERREIRA, L.F.R. (2009)



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Tratamento de resíduos sólidos:

Compostagem



Tratamento de resíduos sólidos:

Compostagem


- * Controle da umidade
- * Controle da temperatura
- * Adequação da Relação C/N

Relação C/N/P/S e disponibilidade de nutrientes

Relação			Imobilização (I) / Mineralização (M)	Disponibilidade
C/N	C/P	C/S		
>30	>300	>400	I > M	Diminuída
20-30	200-300	200-400	I = M	Inalterada
<20	<200	<200	I < M	Aumentada

Remediação de áreas contaminadas

Evolução do número de áreas contaminadas cadastradas no Estado de São Paulo




Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Remediação de áreas contaminadas

Distribuição de áreas contaminadas no Estado de São Paulo por atividade
- dezembro 2017 - TOTAL: 5942 áreas




Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo




Remediação de áreas contaminadas

Grupos contaminantes em áreas contaminadas no Estado de São Paulo
- dezembro 2017 -




Remediação de áreas contaminadas

Distribuição de áreas contaminadas no Estado de São Paulo quanto a classificação
- dezembro 2017 -



Remediação de áreas contaminadas

Técnicas de remediação implantadas em áreas contaminadas no Estado de São Paulo
- dezembro 2017 -



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Biorremediação

👉 Técnicas *ex-situ* (on-site ou off-site)

- Land farming
- Biopilha
- Biorreatores
- Biodegradação fúngica
- Biofilmes

👉 Técnicas *in situ* (Bioaumento vs. Bioestímulo)

- Tratamento de solo ou *land treatment*
- Biodegradação fúngica
- Biorremediação melhorada de solo e aquífero
- Fitorremediação
- Bioventilação ou *Bioventing*
- *Bioslurping* (extração associada a injeção de ar e/ou nutrientes)
- Atenuação natural monitorada




Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Biorremediação

Landfarming



- * Resíduos sólidos com elevado conteúdo de C
- * Suplementação de N e P
- * Suplementação de O_2
- * Técnica de baixo custo
- * Requer grandes áreas
- * Demanda tempo para remediação (meses)
- * Utilizado pelas petroquímicas brasileiras



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Armas



Biorremediação

Landfarming




Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Armas



Biorremediação

Biopilha



- * Variação para solos de elevada resistência física
- * Aplicado para situações que requerem maior controle



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Biorremediação

Biorreatores



- * A tecnologia do controle total
- * Aplicado a resíduos líquidos
- * Células microbianas em suspensão ou imobilizadas
- * Diversas configurações existentes




Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Biorremediação

Biorreatores



- * Degradação de PCE em Reator Horizontal de Leito Fixo (RHLF)
- * Uso de consórcio microbiano imobilizado
- * Degradação estratificada




Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Biorremediação


Biorreatores



Degradação de PCE em RHLF




Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Biorremediação

Fitorremediação



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo




Biorremediação

Fitorremediação




Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo

THE PHYTOMINING OPERATION




Biorremediação

Bioventing




Biorremediação

Bioventing



Biorremediação

Biosparging



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Armas



Biorremediação

Bioestímulo: Oxidação



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Armas



Biorremediação

Bioaumento: inoculantes

Ineficiência de inoculações na degradação de xenobióticos

- * Limitação de nutrientes: N, P, O₂
- * Supressão por predadores e parasitas (protozoários, bacteriófagos, espécies produtoras de enzimas líticas)
- * Deficiência em movimentação da bactéria inoculada
- * Utilização de fontes alternativas de C
- * [] do xenobiótico abaixo do limiar de biodegradação



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Biorremediação

Bioaumento: inoculantes

Ineficiência de inoculações na degradação de xenobióticos

- * Concentração elevada do xenobiótico (toxicidade)
- * Retenção do xenobiótico (baixa ação do microrganismo)
- * Presença de substâncias tóxicas no meio
- * Necessidade de cometabólitos
- * Temperatura, pH, salinidade
- * Toxinas




Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Biorremediação

Vantagens da Biorremediação:

- * Possibilidade de ser executada no local contaminado
- * Mais econômica que as técnicas convencionais
- * Eliminam permanentemente a contaminação
- * Boa aceitação da opinião pública
- * Podem ser associadas com outros métodos químicos ou físicos de tratamento



Biorremediação

Limitações da Biorremediação:

- * Diversas substâncias não são susceptíveis à biodegradação (metais pesados, radionuclídeos, alguns organoclorados)
- * Formação de metabólitos tóxicos
- * Manutenção do inóculo em níveis adequados
- * É menos eficiente em períodos menores de tempo
- * A taxa de degradação é sensível às condições do meio
- * Dificuldade de aplicação em solos argilosos ou com baixa permeabilidade



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Armas



Bibliografia recomendada

ALEXANDER, M. Biodegradation and bioremediation. 2.ed., 1999.

KING, R.B. et al. Practical Environmental Bioremediation: the field guide. 1997.

STEGMANN, R. Treatment of contaminated soil: fundamentals, analysis, applications. 2001.

WISE, D.L. et al. Bioremediation of contaminated soils. 2000.

WISE, D.L. & TRANTOLO, D.J. Remediation of hazardous waste contaminated soils. 1994.



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo



Muito Obrigado!



Eng. Agr., Dr. Eduardo Dutra de Azevedo

