

Da mesma forma que existem os preditores clínicos existem também os preditores cirúrgicos. A cirurgia de catarata figura como preditor:

A. **menor**

B. intermediário

C. maior

D. não é preditor

Causa de baixa oferta de oxigênio para o miocárdio:

A. dor

B. drogas simpatomiméticas

C. resposta inflamatória

D. **anemia**

Fator de risco clínico menor, apesar de não parecer:

A. **ECG anormal**

B. diabetes mellitus

C. insuficiência renal crônica

D. ICC compensada

Síndrome coronária se enquadra como preditor clínico:

A. menor

B. intermediário

C. **maior**

D. não é preditor

Não constitui objetivo das diretrizes da avaliação pré-operatória:

A. avaliar a extensão da doença

B. identificar fatores que possam modificar o manuseio

C. adotar medidas que melhorem o resultado final

D. **prescrever medicação pré-anestésica**

A taxa esperada de complicações cardíacas após qualquer tipo de cirurgia gira em torno de:

A. 1/10.000

B. **1/27**

C. 1/5000

D. 1/75

Dentre os preditores menores de risco clínico está:

A. valvulopatia grave

B. ICC descompensada

C. diabetes mellitus

D. **hipertensão sem controle**

Qual alternativa coloca os preditores cirúrgicos em ordem crescente de risco?

A. cirurgia de mama, catarata, procedimento endoscópico

**B. procedimento endoscópico, prostatectomia, cirurgia de urgência no idoso**

C. cirurgia ortopédica, revascularização do miocárdio, aneurismectomia de aorta

D. cirurgia de mama, prostatectomia, cirurgia de carótida