

# Física Moderna I

## Aula 12

Marcelo G Munhoz  
Edifício HEPIIC, sala 212, ramal 916940  
[munhoz@if.usp.br](mailto:munhoz@if.usp.br)

# Observáveis

- Como podemos agora relacionar essa função de onda com grandezas observáveis?
  - A interpretação probabilística de Born é o caminho para isso
- Mas, afinal como podemos obter a posição, o momento ou a energia de uma partícula a partir da função de onda, que é o que podemos determinar de maneira exata no mundo quântico?

# Observáveis: Valor Esperado

- Diante da interpretação probabilística de Born, podemos obter apenas valores médios ou **valores esperados** para as grandezas
- Por exemplo, podemos obter o valor esperado para a posição de uma partícula a partir da expressão:

$$\bar{x} = \int_{-\infty}^{\infty} xP(x, t)dx = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*(x, t)x\Psi(x, t)dx$$

# Observáveis: Valor Esperado

- Podemos generalizar esse resultado para qualquer grandeza que dependa apenas da posição  $x$ :

$$\bar{f}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*(x, t) f(x) \Psi(x, t) dx$$

- Mas, como calcular o valor esperado para o momento ou energia da partícula?

# Observáveis: Valor Esperado

- Na física quântica, qualquer grandeza é obtida a partir de um operador quântico aplicado à função de onda
- No caso da posição o operador é o próprio valor da posição, ou seja

$$\hat{x} \leftrightarrow x$$

- No caso do momento, o operador é dado por:

$$\hat{p} \leftrightarrow -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$$

- E no caso da energia  $\hat{E} \leftrightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$

# Observáveis: Valor Esperado

- Com isso, temos que o valor esperado para qualquer grandeza que dependa da posição, do momento e do tempo é dado por:

$$\bar{f}(x, p, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*(x, t) \hat{f} \left( x, -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, t \right) \Psi(x, t) dx$$

# Equação de Schroedinger Dependente do tempo

- A forma mais geral da equação de Schroedinger dependente do tempo é dada

por:

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}(x, t) + V(x, t)\Psi(x, t) = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}(x, t)$$

- Nosso objetivo é resolver essa equação para diversas formas de  $V(x, t)$

# Equação de Schroedinger Independente do tempo

- Inicialmente, podemos resolver essa equação para os casos em que o potencial só depende da posição, ou seja:

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}(x, t) + V(x)\Psi(x, t) = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}(x, t)$$

- Neste caso, podemos fazer a separação de variáveis dada por:

$$\Psi(x, t) = \psi(x) \cdot \phi(t)$$



# Equação de Schroedinger Independente do tempo

- Com essa separação obtém-se para a parte temporal da função de onda:

$$\phi(t) = e^{-iEt/\hbar}$$

- Portanto, a função de onda é dada por:

$$\Psi(x, t) = \psi(x) \cdot e^{-iEt/\hbar}$$

- cuja parte espacial, chamada de autofunção, é obtida pela equação diferencial ordinária:

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2}(x) + V(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

# Equação de Schroedinger Independente do tempo

- Notamos que a densidade de probabilidade da função de onda neste caso é dada por:

$$P(x, t)dx = \Psi^*(x, t)\Psi(x, t)dx$$

$$P(x, t)dx = \psi^*(x)e^{+iEt/\hbar} \cdot \psi(x)e^{-iEt/\hbar}dx$$

$$P(x, t)dx = \psi^*(x)\psi(x)dx$$


ou seja, não depende do tempo. Essas soluções da equação de Schroedinger são chamadas de **estados estacionários**

# Propriedades da Função de Onda

- As autofunções e sua primeira derivada, para serem uma solução aceitável da equação de Schroedinger, precisam possuir as seguintes propriedades:
  - Ser finita
  - Ser unívoca
  - Ser contínua
- Essas condições são necessárias para que as funções de onda representem os observáveis de maneira adequada

# Soluções da Equação de Schroedinger Independente do tempo

- Para uma dada forma de  $V(x)$ , a equação de Schroedinger independente do tempo impõe uma relação entre a derivada segunda da função de onda e seu próprio valor
- Impondo condições iniciais para  $\Psi$  e  $d\Psi/dx$ , pode-se determinar  $\Psi$  para qualquer valor de  $x$



# Soluções da Equação de Schroedinger Independente do tempo

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2} [V(x) - E] \psi(x)$$

- Portanto, o próximo passo é resolver essa equação diferencial e encontrar a forma matemática para a função de onda para diferentes sistemas físicos (diferentes potenciais)