Curso de Ciências Biológicas
Disciplina BMI-296 – Imunologia básica

Aula 5 – Anticorpos & Receptores de linfocitos

Alessandra Pontillo

Lab. Imunogenética/Dep.Imunologia/ICB/USP

Imunidade adquirida

Reconhecimento

Sistema imune adaptativo

Reconhecimento altamente específico de antígenos/epitopos

1 célula = 1 especificidade

Afinidade ao antígeno pode ser “melhorada” durante a resposta

**Receptores de reconhecimento de Ag: AC/BCR
e TCR**

Reconhecimento na Imunidade adquirida

	Innate immunity	Adaptive immunity
Specificity	<p>For pathogen-associated molecular patterns (PAMPS)</p> <p>Different microbes</p> <p>Identical mannose receptors</p>	<p>For structural details of any molecules (antigens)</p> <p>Different microbes</p> <p>Distinct antibody molecules</p>
Receptors	<p>Encoded in germline (pattern recognition receptors)</p> <p>Toll-like receptor</p> <p>N-formyl methionyl receptor</p> <p>Mannose receptor</p>	<p>Encoded by lymphocyte genes produced by somatic recombination</p> <p>Ig</p> <p>TCR</p>
Distribution of receptors	Non-clonal	Clonal

Antígenos & epítopos

©1999 Addison Wesley Longman, Inc.

AC/BCR reconhecem

- proteínas, polissacarídeos, ácidos nucleicos
- Epítipo linear ou conformacional

Reconhecimento nos Linfocitos T

Linfocitos T

CD4+ (helper) TCR reconhece peptídeos derivados de Ag processados em células apresentadoras de Ag (APC) e apresentados no contexto do **MHC-II** (12-16 AA)

CD8+ (citotóxicos) TCR reconhece peptídeos derivados de Ag processados nas células e apresentados no contexto do **MHC-I** (8-10 AA)

- TCR reconhece**
- indiretamente
- Peptídeos no MHC
- Epitopo linear

Reconhecimento nos Linfocitos T

O TCR é um heterodímero: 2 cadeias polipeptídicas

Figure 5.7 The Immune System, 3ed. (© Garland Science 2009)

TCR $\alpha\beta$ (receptor da cell T tipo $\alpha\beta$)

Heterodimero de superfície: 2 cadeias polipeptídicas (α e β)

Porção Variável (V) das 2 cadeias = Interação com MHC/Ag

- ✓ Região variável = Sítio de ligação de MHC/Ag (único)
- ✓ Elevada variabilidade (aminoácida) do sítio de ligação com MHC/Ag (10^{18} diferentes Ag!!) = elevada especificidade de reconhecimento
- ✓ Cada linfócito T possui apenas um TCR com uma especificidade de reconhecimento MHC/Ag

Complexo TCR $\alpha\beta$

O TCR é sempre acompanhado das outras moléculas que auxiliam a sua função:

✓ **CD4** ou **CD8**

reconhecem o tipo de MHC (-II ou -I, respectivamente)

✓ **CD3** e cadeia ζ (zeta)

mediam a sinalização intracelular do linfócito T

[CD3](#) and ζ -chain accessory

Complexo TCR

Sinalização intracelular

**Sobrevivência
Proliferação
Diferenciação
Migração**

Origem da especificidade do TCR $\alpha\beta$

De onde vem a elevada especificidade de reconhecimento do TCR $\alpha\beta$ ($\sim 10^{18}$ diferentes Ag!!)?

$\sim 2 \times 10^4$ genes que codificam para proteínas humanas

👉 genoma humano não contém número de genes suficiente...

**RECOMBINACAO SOMATICA
DOS SEGMENTOS DE DNA
CODIFICADORES PARA AS
CADEIA α (*cr.14*) e β (*cr.7*)**

Organização dos *loci* α e β do TCR

A região amino terminal variável (V) das cadeia α e β é codificada em uma região do gene *TCRA* ou *TCRB* formada por vários segmentos genicos V, (D), J

Os segmentos genicos sofrem rearranjo (aleatório) durante o desenvolvimento do linfócito T para formar a sequencia codificadora da região V. Cada linfócito T maturo contem os genes *TCRA* e *TCRB* rearranjados para poder expressar apenas 1 tipo de região V.

TCRA (cromossomo 14) $\rightarrow$ Cadeia α

Figure 4-9 Immunobiology, 7ed. (© Garland Science 2008)

TCRB (cromossomo 7) $\rightarrow$ Cadeia β

Recombinação somática do TCR $\alpha\beta$

Cadeia α

recombinação VJ

Figure 4-12 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

Recombinação somática

RAG1/2

fragmento de DNA excisso (TREC) nucleotídeos TdT

Figure 4-6 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

Recombinação somática

RAG 1/2

Figure 4-7 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

Origem da especificidade do TCR $\alpha\beta$

De onde vem a elevada especificidade de reconhecimento do TCR $\alpha\beta$ ($\sim 10^{18}$ diferentes Ag!!)?

**RECOMBINACAO SOMATICA
DOS SEGMENTOS DE DNA
CODIFICADORES PARA AS
CADEIA α (*cr.14*) e β (*cr.7*)**

- Recombinação V(D)J
- Junções com nucleotídeos

Variabilidade do TCR $\alpha\beta$

Element	Immunoglobulin		$\alpha:\beta$ T-cell receptors	
	H	$\kappa+\lambda$	β	α
Variable segments (V)	40	70	52	~70
Diversity segments (D)	25	0	2	0
D segments read in three frames	rarely	—	often	—
Joining segments (J)	6	5(κ) 4(λ)	13	61
Joints with N- and P-nucleotides	2	50% of joints	2	1
Number of V gene pairs	1.9 x 10 ⁶		5.8 x 10 ⁶	
Junctional diversity	~3 x 10 ⁷		~2 x 10 ¹¹	
Total diversity	~5 x 10 ¹³		~10 ¹⁸	

Figure 4-13 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

Organização dos *loci* γ e δ do TCR

***TCRG* (cromossomo 7) $\rightarrow$ Cadeia γ
(recombinação VJ)**

***TCRD* (cromossomo 14) $\rightarrow$ Cadeia δ
(recombinação DJ)**

- Menor numero de segmentos genicos (menor variabilidade de reconhecimento)
- Recombinação VJ ou DJ
- Junções com nucleotídeos

Figure 3-11 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

Reconhecimento nos Linfocitos B

Linfocitos B

Ig Ligadas a membrana na superfície dos linfocitos B = receptor da célula B (**BCR**)

Ig Secretadas pelos linfocitos B (**anticorpos**) e residentes na circulação, nos tecidos e nas mucosas onde neutralizam toxinas, impedem a entrada e a disseminação de patógenos e eliminam micro-organismos = receptores de Ag + ação efetora

AC/BCR reconhecem

- proteínas, polissacarídeos, ácidos nucleicos
- Epitopo linear ou conformacional
- Tamanho: 4-8 AA

Anticorpos e BCR (linfocitos B)

Todos os AC compartilham uma estrutura comum de 4 cadeias polipeptídicas

2 cadeias leves (L) idênticas

2 cadeias pesadas (H) idênticas

Forma a Y com 2 sítios de ligação de Ag (formada por domínios N-termais das L e H) e 1 região que não está envolvida na ligação de Ag mas na função efetora do AC ou na ligação a membrana no caso do BCR (formada por domínios C-terminais L e H)

Interação com Ag

Variable region (V)
100-110 AA
High variable!
≠ in cada AC

atraves das CDR

Regiões de 10 AA que determinam a complementariedade ao Ag

Fc

Constant region (C)
Limited variation
L: κ or λ
H: α, γ, δ, ε, μ

BCR (linfocitos B)

CD21=CR

Mutações em Btk
=>
Agamaglobulinemia

Sobrevivencia
Proliferação
Diferenciação
Migração

Organização dos *loci* H e L (λ , κ) do BCR/AC

λ , κ (*cromossomo 2 e 22*) $\rightarrow$ Cadeia L

λ light-chain locus

κ light-chain locus

Heavy-chain locus

BCRH (*cromossomo 14*) $\rightarrow$ Cadeia H

A região amino terminal variável (V) das cadeia H e L é codificada em uma região genica formada por vários segmentos genicos V, (D), J

Os segmentos genicos sofrem rearranjo (aleatório) durante o desenvolvimento do linfócito B para formar a sequencia codificadora da região V. Cada linfócito B maturo contem os genes *para cadeia H e L* rearranjados para poder expressar apenas 1 tipo de região V.

Recombinação somática do BCR/AC

Cadeia L

recombinação VJ

Cadeia H

recombinação VDJ

Figure 4-2 Immunobiology, 7ed. (© Garland Science 2008)

Anticorpos e BCR (linfocitos B)

Splicing alternativo do transcrito da cadeia pesada origina forma secretada ou de membrana do receptor

CDRs e hipervariabilidade

Segmentos hipervariáveis (≈ 10 AA) ou Regiões Determinantes de Complementariedade (**CDRs**) dos domínios V das cadeias pesada (V_H) e leve (V_L) geram o sítio de ligação ao Ag

CDRs e hipervariabilidade

Os CDR são as regiões mais variáveis (diferentes AA) dentro de V_H e V_L

Os CDR3 são os mais variáveis entre os CDR

Hipermutação somática

É possível aumentar ainda a variabilidade da V introduzindo mutações aleatórias nas CDR

Variabilidade do BCR/AC

Element	Immunoglobulin		α : β T-cell receptors	
	H	κ + λ	β	α
Variable segments (V)	40	70	52	~70
Diversity segments (D)	25	0	2	0
D segments read in three frames	rarely	—	often	—
Joining segments (J)	6	5(κ) 4(λ)	13	61
Joints with N- and P-nucleotides	2	50% of joints	2	1
Number of V gene pairs	1.9×10^6		5.8×10^6	
Junctional diversity	$\sim 3 \times 10^7$		$\sim 2 \times 10^{11}$	
Total diversity	$\sim 5 \times 10^{13}$		$\sim 10^{18}$	

Figure 4-13 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)

Origem da especificidade do BCR/AC

De onde vem a elevada especificidade de reconhecimento do BCR/AC ($\sim 10^{13}$ diferentes Ag!!)?

**RECOMBINACAO SOMATICA
DOS SEGMENTOS DE DNA
CODIFICADORES PARA AS
CADEIA H (*cr.14*) e L (*cr.2, 22*)**

- Recombinação V(D)J
- Junções com nucleotídeos
- **Hipermutação somática**

desenvolvimento
ativação

Isótopos e função dos anticorpos

CADEIAS PESADAS e REGIAO CONSTANTE DO AC

Existem 5 diferentes estruturas (sequencias AA) das regioes C da cadeia pesada (C_H)

- Cadeia μ $\rightarrow$ IgM
- Cadeia δ $\rightarrow$ IgD
- Cadeia γ $\rightarrow$ IgG (γ 1-4 $\rightarrow$ IgG1-4)
- Cadeia ϵ $\rightarrow$ IgE
- Cadeia α $\rightarrow$ IgA (α 1=IgA1 e α 2=IgA2)

Isotipos $\rightarrow$ classe do AC

Splicing alternativo e isótopos

linfocito B maduro

Isótopos e função dos anticorpos

- Estrutura das 5 classes de AC
- Diferentes isotipos realizam diferentes funções efetoras

IgG

IgD

IgE

IgA

IgM

Função efetuar dos anticorpos

Isótopos e função dos anticorpos

IgM

- 1 AC a ser expresso (BCR) e produzido
- monomero ou pentamero
- meia vida: 5 dias
- ativação complemento (via classica)

IgG

- monomero
- AC mais comum em sangue, linfa, CSF
- meia vida: 23 dias
- opsonização
- aglutinação
- neutralização de virus/toxinas
- ADCC
- passa a placenta

IgE

- monomero
- meia vida: 20 dias (aumenta quando ligado a mastocitos/ eosinofilos)
- o Fc tem elevada afinidade para o FC-R na membrana de mastocitos/ eosinofilos
- ativa desgranulação dos mastocitos/ eosinofilos

IgA

- monomero ou dimerico
- meia vida: 5 dias
- presente nas mucosas (passa no lumen por transcitose)
- aglutinação
- neutralização de virus/toxinas