Metabolismo Integrado

Profa. Dra. Ana Carolina Magalhães

FCB USP

Objetivos

- ❖ Demonstrar que o metabolismo ocorre pela integração de vários órgãos diferentes, regida pela atuação de hormônios como insulina e glucagon;
- ❖ Discutir importantes doenças metabólicas e suas implicações na área.

Regulação do metabolismo

❖ ENZIMAS

- ❖ Regulação alostérica

❖ HORMÔNIOS

- ❖ Expressão gênica, regulação enzimática por alteração covalente e/ou transporte por membrana;
- ❖ Esteróides, tireoídianos, catecolaminas e peptídicos (**insulina e glucagon**).

Glucagon

- ❖ Liberado na hipoglicemia pelo pâncreas
- ❖ Atua no fígado e tecido adiposo
- ❖ Estimula a glicogenólise, gliconeogênese, lipólise
- ❖ Inibe a síntese de glicogênio e a glicólise nos tecidos-alvo.

**Epinefrina: músculo e tecido adiposo*

Insulina

- ❖ Liberado na hiperglicemia pelo pâncreas
- ❖ Atua no fígado, músculo e tecido adiposo
- ❖ Ativa o transporte da glicose para as células (GLUT4)
- ❖ Inibe a glicogenólise, gliconeogênese, lipólise
- ❖ Estimula a síntese de glicogênio (e outras macromoléculas) e a glicólise
- ❖ Atua no hipotálamo (saciedade).

Integração

Fígado

- ❖ Distribuir nutrientes, mantendo a concentração constante na corrente sanguínea
- ❖ Regular a síntese de enzimas envolvidas no controle do metabolismo
- ❖ Excretar sais biliares.

Triacilgliceróis

Fosfolipídeos

Ácidos Graxos

Colesterol

Glicogênio hepático

Glicose-6-fosfato

Glicose sanguínea

NADPH

Via da pentose fosfato

Nucleotídeos

Ribose-5-fosfato + CO₂

Glicólise

Piruvato

Acetil-CoA

ADP + P_i

ATP

e⁻

O₂

H₂O

Fígado

Hiperglicemia

Hipoglicemia

Insulina

Glucagon

Produção de glicogênio

Glicogenólise

Aumento do ATP e acúmulo de citrato

Gliconeogênese

Ativação da via da pentose e síntese de lipídios

Lipólise

Tecido adiposo

- ❖ Distribuir nutrientes, mantendo a concentração constante na corrente sanguínea (2º lugar)

Hiperglicemia

Hipoglicemia

Insulina

Glucagon

Ácido graxo + glicerol-P
(glicose-GLUT 4)

Lipólise (LHS)

Armazenamento de
triacilglicerol

Quebra do triacilglicerol
Ácido graxo - energia
Glicerol - gliconeogênese

Músculo

Hiperglicemia

Atividade

Insulina

Epinefrina

Entrada de glicose (GLUT 4)

Glicogenólise

Síntese de glicogênio

Não há transporte de glicose para sangue

Músculo

Tecido Nervoso

BARREIRA HEMATOENCEFÁLICA

Períodos do dia

- ❖ Absortivo
- ❖ Pós-absortivo / Jejum inicial
- ❖ Jejum prolongado
- ❖ Obesidade / Diabetes Melito

Período absorptivo

- ❖ Até 4h após refeição
- ❖ Prevalece o efeito da insulina

Período Absortivo

Período Pós-absortivo/ jejum inicial

- ❖ Após 4h da última refeição
- ❖ Prevalece o efeito do glucagon
- ❖ Glicogenólise (até 10-18h de jejum).

Jejum propriamente dito

- ❖ > 8h da última refeição
- ❖ Intensifica-se o efeito do glucagon (degradação)
- ❖ Gliconeogênese (alanina/glutamina do músculo, glicerol e lactato)

Período de Jejum

Período de Jejum

Uma universitária de 20 anos de idade foi conduzida ao Hospital de Base de Bauru, após “baile do Bixo” (1h da madrugada), com sintomas de tontura e fraqueza. A moça relatou que estava sem comer desde a hora do almoço e que ingeriu vários copos da bebida chamada “disco voador”. Qual das seguintes alternativas melhor completa a frase: “A paciente tinha ...”?

- a) Glicemia maior do que 80 mg/dL
- b) Hiperglicemia e insulina elevada
- c) Hipoglicemia e Glucagon elevado
- d) Hipoglicemia e insulina elevada
- e) Glucagon baixo

Por que o álcool acelera a hipoglicemia em jejum?

Jejum Prolongado

- ❖ Intensifica-se a degradação de ácido graxo
- ❖ Ciclo de Krebs bloqueado (diminuição do oxalacetato)
- ❖ Formação de corpos cetônicos pelo fígado
- ❖ O sistema nervoso começa a metabolizar corpos cetônicos
- ❖ Aumento dos corpos cetônicos pode levar à acidose.

URÉIA É EXPORTADA AO RIM E EXCRETADA NA URINA

GLICOSE É EXPORTADA AO CÉREBRO ATRAVÉS DA CORRENTE SANGUÍNEA

ÁCIDOS GRAXOS (IMPORTADOS DO TECIDO ADIPOSE) SÃO OXIDADOS COMO COMBUSTÍVEL, PRODUZINDO ACETIL-COA

CORPOS CETÔNICOS SÃO EXPORTADOS PELA CORRENTE SANGUÍNEA AO CÉREBRO, QUE OS USA COMO COMBUSTÍVEL

ACÚMULO DE ACETIL-COA FAVORECE A SÍNTESE DE CORPOS CETÔNICOS

FALTA DE OXALOACETATO PREVINE A ENTRADA DE ACETIL-COA NO CICLO DO ÁCIDO CÍTRICO

INTERMEDIÁRIOS DO CICLO DO ÁCIDO CÍTRICO SÃO DIRECIONADOS PARA A GLICONEOGENESE

PROTEÍNA

AMINOÁCIDOS

NH₃

URÉIA

GLICOSE

P

GLICOSE 6-P

FOSFOENOLPIRUVATO

OXALOACETATO

ÁCIDOS GRAXOS

ACETIL-COA

CITRATO

CORPOS CETÔNICOS
ACETOACETIL-COA

Corpos cetônicos

Corpos cetônicos

Jejum Prolongado

Fontes de energia

*Corpos cetônicos/ácidos graxos não contribuem para glicemia

Do intermittent diets provide physiological benefits over continuous diets for weight loss? A systematic review of clinical trials

Radhika V. Seimon^a, Jessica A. Roekenes^a, Jessica Zibellini^a, Benjamin Zhu^a,
Alice A. Gibson^a, Andrew P. Hills^b, Rachel E. Wood^c, Neil A. King^d, Nuala M. Byrne^c,
Amanda Sainsbury^{a,*}

^a The Boden Institute of Obesity, Nutrition, Exercise & Eating Disorders, Sydney Medical School, Charles Perkins Centre, The University of Sydney, Camperdown NSW 2006, Australia

^b Centre for Nutrition and Exercise, Mater Research Institute, The University of Queensland, South Brisbane QLD, 4101, Australia

^c Bond Institute of Health and Sport, Faculty of Health Sciences and Medicine, Bond University, Gold Coast, Australia

^d Queensland University of Technology (QUT), Institute of Health and Biomedical Innovation and School of Exercise and Nutrition Sciences, Brisbane, QLD 4059, Australia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 21 April 2015

Received in revised form

14 September 2015

Accepted 15 September 2015

Available online 16 September 2015

Keywords:

Intermittent energy restriction

Alternate day fasting

Appetite

Energy expenditure

Body composition

Glucose homeostasis

ABSTRACT

Energy restriction induces physiological effects that hinder further weight loss. Thus, deliberate periods of energy balance during weight loss interventions may attenuate these adaptive responses to energy restriction and thereby increase the efficiency of weight loss (i.e. the amount of weight or fat lost per unit of energy deficit). To address this possibility, we systematically searched MEDLINE, PreMEDLINE, PubMed and Cinahl and reviewed adaptive responses to energy restriction in 40 publications involving humans of any age or body mass index that had undergone a diet involving intermittent energy restriction, 12 with direct comparison to continuous energy restriction. Included publications needed to measure one or more of body weight, body mass index, or body composition before and at the end of energy restriction. 31 of the 40 publications involved 'intermittent fasting' of 1–7-day periods of severe energy restriction. While intermittent fasting appears to produce similar effects to continuous energy restriction to reduce body weight, fat mass, fat-free mass and improve glucose homeostasis, and may reduce appetite, it does not appear to attenuate other adaptive responses to energy restriction or improve weight loss efficiency, albeit most of the reviewed publications were not powered to assess these outcomes. Intermittent fasting thus represents a valid – albeit apparently not superior – option to continuous energy restriction for weight loss.

O aumento da formação de corpos cetônicos durante o jejum se deve a:

- a) Níveis baixos circulantes de glucagon
- b) Baixa produção de acetil Co-A no fígado
- c) Aumento dos níveis séricos de ácido graxo e, conseqüentemente, de acetil CoA no fígado
- d) Inibição da oxidação de ácidos graxos no fígado
- e) Níveis altos circulantes de insulina

Por que o o paciente diabético (em especial o do tipo 1) tem hálito cetônico?

Diabetes Melito

- ❖ **DIABETES TIPO 1:** insulino-dependente ou juvenil
- ❖ **DIABETES TIPO 2:** insulino-independente ou “maturidade” (obesidade)
- ❖ Diagnóstico: hiperglicemia em jejum (120 mg / dL)
- ❖ Complicações: nefropatia, retinopatia, neuropatia e amputação.

Diabetes Melito

	Diabetes tipo I	Diabetes tipo II
IDADE DE INÍCIO	Infância e puberdade	Acima dos 35 anos
ESTADO NUTRICIONAL	Normal/ Magro	Obesidade
PREVALÊNCIA	10%	90%
PREDISPOSIÇÃO GENÉTICA	Moderada	Forte
DEFICIÊNCIA	Células beta destruídas – infecção viral	Resistência à insulina Redução na produção de insulina
FREQUÊNCIA DE CETOSE	Comum	rara
INSULINA PLASMÁTICA	Baixa a ausente	Alta a baixa
COMPLICAÇÕES AGUDAS	cetoacidose	Coma hiperosmolar (desidratação)
TRATAMENTO	Insulina	Dieta, exercício, hipoglicemiante e insulina

Diabetes Melito

Glicose sanguínea (mg / 100 mL)

Diabetes Melito

- ❖ **O organismo comporta-se como se estivesse em JEJUM!**
- ❖ Prevalece metabolismo depredativo: glicogenólise, gliconeogênese, lipólise!
- ❖ Aumento dos níveis de triglicérides e de corpos cetônicos no sangue.

Diabetes Melito

- ❖ **O organismo comporta-se como se estivesse em JEJUM!**
- ❖ Glicosúria e poliúria
- ❖ Polidipsia (fome e sede excessivas)
- ❖ Glicosilação de proteínas: maior incidência de complicações cardiovasculares.
- ❖ Glicosilação da hemoglobina > 6%

Obesidade

❖ IBGE (1975-2009)

- ❖ Sobrepeso aumentou 2-3x
- ❖ Obesidade aumentou 2-4x
 - ❖ Homens (2,8% para 12,4%)
 - ❖ Mulheres (8,0% para 16,9%)

IMC

Obesidade

Obesidade

❖ Relação cintura-quadril:

- ❖ Comportamental
- ❖ Genética
- ❖ Ambiental

Mulher: 0,8
Homem: 1,0

Obesidade

- ❖ **Síndrome metabólica:**
 - ❖ Intolerância à glicose
 - ❖ Resistência à insulina (**Diabetes Mellito tipo 2**)
 - ❖ Dislipidemia
 - ❖ Hipertensão arterial (**Acidentes vasculares**)

Obesidade

Células de gordura

LEPTINA

É produzida nas células de gordura

ADIPONECTINA

Ação

É responsável pela saciedade, redução da ingestão alimentar e aumenta o gasto de energia. Age no hipotálamo

Outras funções

Está ligada ao funcionamento dos sistemas imune, reprodutor e cardiovascular

Estômago e intestino

GRELINA

É produzida nas células do estômago e na porção superior do intestino

Ação

Esse hormônio também age no hipotálamo, estimulando o apetite. É como um lembrete de que está na hora de comer

Outras funções

É responsável pelo aumento da secreção do hormônio do crescimento (GH) e tem influência sobre a função endócrina

Contents lists available at [ScienceDirect](#)

Neuroscience and Biobehavioral Reviews

journal homepage: www.elsevier.com/locate/neubiorev

Hungry brains: A meta-analytical review of brain activation imaging studies on food perception and appetite in obese individuals

F. Devoto^{a,b}, L. Zapparoli^a, R. Bonandrini^c, M. Berlingeri^{d,h}, A. Ferrulli^e, L. Luzi^{e,g}, G. Banfi^a,
E. Paulesu^{a,c,*}

^a fMRI Unit, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milan, Italy

^b Department of Psychology and PhD Program in Neuroscience of the School of Medicine and Surgery, University of Milano-Bicocca, Milan, Italy

^c Department of Psychology and NeuroMi - Milan Centre for Neuroscience, University of Milano-Bicocca, Milan, Italy

^d DISTUM, Department of Humanistic Studies, University of Urbino Carlo Bo, Urbino, Italy

^e Endocrinology and Metabolic Diseases Unit, IRCCS Policlinico San Donato, San Donato Milanese, Milan, Italy

^f University Vita e Salute San Raffaele, Milan, Italy

^g Department of Biomedical Sciences for Health, University of Milan, Milan, Italy

^h Center of Developmental Neuropsychology, ASUR Marche, Area Vasta 1, Pesaro, Italy

ARTICLE INFO

Keywords:

Obesity
Reward system
Neuroimaging
Meta-analysis
Activation likelihood estimation
Hierarchical clustering

ABSTRACT

The dysregulation of food intake in chronic obesity has been explained by different theories. To assess their explanatory power, we meta-analyzed 22 brain-activation imaging studies. We found that obese individuals exhibit hyper-responsivity of the brain regions involved in taste and reward for food-related stimuli. Consistent with a Reward Surfeit Hypothesis, obese individuals exhibit a ventral striatum hyper-responsivity in response to pure tastes, particularly when fasting. Furthermore, we found that obese subjects display more frequent ventral striatal activation for visual food cues when satiated: this continued processing within the reward system, together with the aforementioned evidence, is compatible with the Incentive Sensitization Theory. On the other hand, we did not find univocal evidence in favor of a Reward Deficit Hypothesis nor for a systematic deficit of inhibitory cognitive control. We conclude that the available brain activation data on the dysregulated food intake and food-related behavior in chronic obesity can be best framed within an Incentive Sensitization Theory. Implications of these findings for a brain-based therapy of obesity are briefly discussed.

Prevenção

Prevenção

Conclusão

Os diferentes processos de regulação integrada visam estabelecer um nível de glicose plasmático constante, além de outros nutrientes (ácidos graxos e corpos cetônicos), satisfazendo as necessidades dos diferentes tecidos.

A person is shown from the chest up, holding a large, solid red heart with both hands. They are standing in a field of tall, dry grass. The background is a soft, out-of-focus landscape. The text is overlaid on this image.

Eclesiastes 3:1-“Sob o céu há, para cada propósito,
uma ocasião e um tempo propício:

Tempo de nascer e de morrer; tempo de plantar e
tempo de colher o que se plantou; tempo de matar e
tempo de curar; tempo de derrubar e tempo de
edificar”

Obrigada!

acm@fob.usp.br