Epilepsias

Conjunto de transtornos do sistema nervoso central que se caracterizam pelo aparecimento abrupto e transitório de fenômenos anormais (as crises epiléticas) de origem motora, sensorial, autonômica ou psíquica (0,5% da população)

Alteração no EEG

Desvio despolarizante paroxístico

Mecanismos de crises epilépticas

Mecanismos de crises epilépticas

crise primariamente generalizada

CRISE PARCIAL

crise secundariamente generalizada

Crises epilépticas:

1. Generalizadas (40%): a. tônico-clônicas

b. ausência

c. outras (mioclônicas, 10%)

2. Parciais (60%): a. Simples

b. complexas

A. Normal

**B. Generalised seizure (grand mal)
— tonic-clonic type**

**C. Generalised seizure (petit mal)
— absence seizure type**

D. Partial seizure

Tipos de epilepsia

Crise parcial com generalização secundária

Crise generalizada de ausência

Crise parcial complexa

Causas:

Genéticas, Traumas, Tumores, crise febril, idiopática

Modelos animais:

Pentilenotetrazole → mioclônica

Eletrochoque → redução da duração: Parcial e tonico-clônica

Kindling

Audiogênica

Pilocarpina

Ácido kaínico

Anticonvulsivantes comuns

Older compounds related to barbiturates

Newer compounds related to GABA/benzodiazepines

Crises generalizadas tônico-clônicas e parciais: Fenitoína, carbamazepina, ácido valpróico (2a. escolha: fenobarbital, lamotrigina, topiramato)

Crises mioclônicas: ácido valpróico, clonazepam

Crises de ausência: Ácido valpróico, Etossuximida, (2a. escolha: clonazepam, lamotrigina?)

Mecanismo de ação dos anticonvulsivantes em crises parciais e generalizadas tônico-clônicas

Mecanismo de ação dos anticonvulsivantes: bloqueio de canais de sódio voltagem dependentes

Mecanismo de ação dos anticonvulsivantes: prejuízo na geração/condução do potencial de ação por antagonista de receptores de sódio-voltagem dependentes

Fenitoína,
 carbamazepina,
 ácido valpróico,
 lamotrigina

Novos: zonisamida
 lacosamida,
 rufinamida

**Mecanismo de ação
dos
anticonvulsivantes:
Potencialização da
neurotransmissão
gabaérgica**

**Fenobarbital,
benzodiazepínicos,
ácido valpróico,
tiagabina, vigabatrina**

Mecanismo de ação dos anticonvulsivantes: crises de ausência: bloqueio de canais de cálcio do tipo-T localizados no tálamo

Canais de cálcio tipo T são essenciais pela geração do ritmo pico e onda a 3/s

Mecanismo de ação dos anticonvulsivantes em crises de ausência: bloqueio de canais de cálcio tipo T

Mecanismo de ação dos anticonvulsivantes: outros mecanismos?

Levetiracetam: (em crises parciais, sozinha ou em combinação, em Síndrome de Lennox-Gastaut): ligação à proteína sináptica SV2A (?)

Topiramato: bloqueio canais sódio-voltagem dependentes
ativa canais K⁺ hiperpolarizantes
aumenta resposta pós-sináptica ao GABA
limita ativação receptores AMPA/kainato de glutamato

Felbamato: inibe resposta NMDA e aumenta resposta ao GABA

GABA_A pentina e pregabalina (em crises parciais como adjuvante. Também para dor neuropática): bloqueio canais cálcio voltagem-dependentes (subunidade . **A2δ1**)???

Princípios gerais da terapia anticonvulsivante

Ideal: suprimir as crises sem causar efeitos adversos (inexiste)

50%: controle completo

25% melhora significativa

Monoterapia preferível

Duração usual: 2 anos

Convulsão febril: 2-4% das crianças (25-33% terão outra crise). Destes, 2-3% se tornam epiléticos (aumento de 6 x)