

Astronomia de Posição

Notas de Aula – Versão 05/02/2019

Gastão Bierrenbach Lima Neto

Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG)
Universidade de São Paulo (USP)

A última versão destas notas encontra-se aqui:
<http://www.astro.iag.usp.br/~gastao/astroposicao.html>

Sumário

1	Esfera Celeste	1
1.1	Introdução	1
1.2	Horizonte e Constelações	2
1.2.1	Bandeira do Brasil	4
1.3	Movimento Aparente dos Astros	4
1.3.1	Estações do ano	9
1.4	Sistema de Referência	10
1.5	Sistema de Coordenadas	11
1.5.1	Coordenadas Horizontais	12
1.5.2	Coordenadas Equatoriais	13
1.5.3	Coordenadas Eclípticas	17
1.5.4	Coordenadas Galácticas	17
1.6	Movimento diário dos astros	18
1.6.1	Culminação	20
1.7	Relação entre sistemas de coordenadas	21
1.7.1	Noções de trigonometria esférica	26
1.8	Projeção da esfera no plano: planisfério	29
2	Tempo	35
2.1	Escalas de Medida de Tempo	35
2.1.1	Introdução	35
2.1.2	Movimento e tempo	35
2.1.3	Tempo sideral	35
2.1.4	Tempo solar, tempo universal e tempo civil	36
2.1.5	Translação da Terra: ano	41
2.1.6	Translação da Lua: mês	44
2.1.7	Tempo dinâmico	46
2.1.8	Tempo atômico	48
2.1.9	Rotação da Terra	49
2.1.10	Tempo universal coordenado e Tempo Legal (ou Civil)	50
2.2	Calendários	54
2.2.1	Introdução	54
2.2.2	Base astronômica dos calendários	54
2.2.3	Calendário Egípcio	55

2.2.4	Calendário Romano	55
2.2.5	Calendário Juliano	56
2.2.6	Calendário Gregoriano	56
2.2.7	Calendário Judaico	57
2.2.8	Calendário Muçulmano	57
2.2.9	Calendário da Revolução Francesa	57
2.3	Dia Juliano	58
2.4	Relação entre tempo sideral e tempo universal	60
2.5	Cálculo do domingo de Páscoa	60
2.6	Radiação solar e Insolação	61
3	Movimento, forma e perspectiva: Variação de coordenadas	65
3.1	Forma da Terra	65
3.1.1	Sistema astronômico de coordenadas geográficas	66
3.1.2	Sistema geodético de coordenadas geográficas	66
3.1.3	Sistema geocêntrico de coordenadas geográficas	66
3.1.4	GPS	69
3.2	Precessão e Nutação	71
3.2.1	Física da precessão e nutação	71
3.2.2	Efeitos da precessão e nutação nas coordenadas	72
3.3	Movimento do polo	77
3.4	Refração atmosférica	78
3.4.1	Aproximação de planos paralelos	78
3.4.2	Fórmula geral da refração	79
3.5	Nascer, pôr e crepúsculos	81
3.5.1	Crepúsculo	82
3.6	Relação entre coordenadas geocêntricas e heliocêntricas	83
3.7	Paralaxe	84
3.7.1	Paralaxe anual	84
3.7.2	Paralaxe diária	88
3.8	Movimento próprio de estrelas	91
3.8.1	Efeito do movimento próprio nas coordenadas	93
3.8.2	Movimento de estrelas próximas do Sistema Solar	93
3.9	Aberração da Luz	94
3.9.1	Aberração anual	96
3.9.2	Aberração planetária	97
3.9.3	Aberração secular	97
3.9.4	Aberração diária	97
3.10	Desvio gravitacional da luz	98
3.11	Redução das coordenadas celestes: Redução ao dia	100
4	Astronomia Clássica	102
4.1	Introdução	102
4.2	Grécia clássica	102
4.2.1	Escola jônica	102
4.2.2	Escola eleática	103
4.2.3	Escola pitagórica	104
4.2.4	Sistema de Eudoxo	105
4.2.5	Sistema de Aristóteles	106
4.3	Sistema híbrido de Heráclides	107

4.3.1	Aristarco	107
4.3.2	Eratóstenes	108
4.3.3	Aglaonice de Thessália	108
4.4	Hiparco	108
4.4.1	Gêmino de Rhodes	109
4.5	Sistema de epiciclos: Ptolomeu	109
4.6	Sistema geocêntrico de Ptolomeu	110
4.7	Entre Ptolomeu e Copérnico	111
4.7.1	Astronomia fora da Europa	112
4.7.2	Precursores da revolução copernicana	113
4.8	Sistema heliocêntrico de Copérnico	114
4.8.1	Copérnico	114
4.8.2	Galileu Galilei	114
4.8.3	Brahe e Kepler	115
4.9	Configurações planetárias	117
4.10	Eclipses	118
4.10.1	Eclipse do Sol	119
4.10.2	Eclipse da Lua	121
4.10.3	Ocorrência de eclipses	122
4.11	Determinação clássica de distâncias no Sistema Solar	125
4.11.1	Diâmetro da Terra	125
4.11.2	Distância Terra – Lua	126
4.11.3	Distância Terra – Sol	130
4.11.4	Distância Planetas – Sol	131
5	Tópicos de Astronomia de Posição	133
5.1	Estações do ano em outros planetas	133
5.1.1	Visibilidade dos anéis de Saturno	134
5.2	Medida da velocidade da luz por Rømer	135
5.3	Leis de Kepler	137
5.3.1	Primeira lei de Kepler	138
5.3.2	Segunda lei de Kepler	138
5.3.3	Terceira lei de Kepler	140
5.4	Problema de 2 corpos	140
5.4.1	Órbitas keplerianas	142
5.5	Variações seculares dos movimentos da Terra	145
5.6	Baricentro do Sistema Solar e movimento do Sol	146
	Índice Remissivo	149
	Almanaque	155
	Domingo de Páscoa	155
	Estações do Ano	156
	Passagem da Terra pelo periélio e afélio	157
	Datas de Lua cheia	158
	Oposição de planetas visíveis a olho nu.	160
	Eclipses do Sol vistos de São Paulo	161

1.1 Introdução

No Universo, os astros se distribuem em um espaço tridimensional. Contudo, devido à imensa distância que separa estes astros da Terra, ao observarmos o céu nós temos a impressão que todos estes astros se encontram em uma esfera. Esta esfera aparente, chamada *esfera celeste* (figura 1.1), está a princípio centrada no observador, (porém as vezes é mais conveniente admitirmos que o centro da esfera celeste esteja em algum outro ponto, no centro da Terra ou no centro do Sol). A esfera celeste não tem um raio definido, assim consideramos este raio como infinito. Como a distância entre um observador qualquer e o centro da Terra (cerca de 6400 km) é muito menor que a distância aos astros (a Lua está, em média, a 380.000 km, o Sol a 150 milhões, e as estrelas estão muito além do sistema solar) o erro que se faz é, na maioria dos casos, desprezível. A superfície total da esfera celeste (como qualquer esfera) é de 4π (em radianos quadrados ou esterradianos) o que equivale a $4\pi(180/\pi)^2 = 41.252,96$ graus².




Figura 1.1: Representação da Esfera Celeste, com algumas das principais estrelas, constelações, o equador e o polo Sul Celeste e a trajetória aparente do Sol (linha tracejada).

A olho nu, podemos ver o Sol, a Lua, 5 planetas, cerca de 5000 estrelas, eventuais cometas, 4 galáxias (parte da Via Láctea, as 2 nuvens de Magalhães, que são galáxias anãs ligadas gravitacionalmente à nossa e a galáxia de Andrômeda) e os meteoróides que queimam ao entrar

na atmosfera (os *meteoros*). E isto é apenas uma fração ínfima do que podemos observar com o auxílio de um telescópio.

Para que possamos comunicar nossas observações a outros observadores, é preciso haver um *sistema de referências* onde as coordenadas dos astros sejam definidas, análogo ao sistema de latitudes e longitudes que utilizamos para localizar um dado lugar no globo terrestre.

Além do sistema de referência, dado o caráter dinâmico dos objetos celestes, também é necessária a definição de *escalas de medida de tempo*. Em outras palavras não somente precisamos das coordenadas de um astro mas também do momento em que a observação foi (ou será) feita.

O objetivo da *astronomia de posição* ou *astrometria* é o estudo das posições dos astros na esfera celeste e de seus movimentos. Sem dúvida, a astronomia de posição é a mais antiga das ciências. Desde a pré-história, as sociedades têm um grande interesse pela posição e movimento dos astros. Estes movimentos, ligados aos ciclos naturais (dia e noite, estações do ano, etc.), regiam as atividades econômicas (plantação e colheita, criação de animais, etc.).

A necessidade de se localizar durante longas viagens, medir a passagem do tempo de modo cada vez mais preciso, estimulou o desenvolvimento tanto da astronomia como de outras ciências como a álgebra e a geometria. Este progresso, junto com o desenvolvimento tecnológico, se faz sentir em toda a história da astronomia de posição, dos monumentos megalíticos de Stonehenge, na Inglaterra, ao satélite espacial *Hipparcos* (dedicado à astrometria), lançado pela ESA (*European Space Agency*) em 8 de agosto de 1989 e desativado em março de 1993. Lançado em dezembro de 2013, o satélite GAIA, também da ESA, nos proporcionou um mapeamento preciso de bilhões de estrelas da Via Láctea em sua missão de 5 anos.

1.2 Horizonte e Constelações

Um dado observador na superfície terrestre pode observar apenas metade da esfera celeste num dado instante. O limite entre a parte observável e a parte invisível ao observador é chamado *horizonte* (do grego *horos*, limite). Os polos deste horizonte, isto é, os pontos exatamente acima e abaixo do observador são chamados *zênite* e *nadir*, respectivamente.

O horizonte astronômico é um círculo aparente em torno do observador. No oceano, o horizonte observado é praticamente o horizonte astronômico; em terra, devido às irregularidades do terreno (e construções) o horizonte observado se distingue do horizonte astronômico.




Figura 1.2: Horizonte astronômico. Para um observador a altura h , a distância do horizonte pode ser definida de duas formas: d_{hor} , a distância em linha reta, e d_c , a distância sobre a superfície da Terra (ou do astro onde está o observador). R é o raio da Terra (ou do astro).

A distância do horizonte astronômico depende da altura do observador (veja Fig. 1.2). Rigorosamente, se a Terra fosse exatamente uma esfera, temos:

$$d_{hor} = \sqrt{2Rh + h^2} \quad \text{e} \quad d_c = R \arccos\left(\frac{R}{R+h}\right), \quad (1.1)$$

onde R (o raio da Terra, $\sim 6,38 \times 10^6$ m) e h são dados nas mesmas unidades (metros, por exemplo). Até alguns quilômetros de altura, $h \ll R$ e $d_c \simeq d_{\text{hor}} \simeq \sqrt{2Rh}$, e podemos utilizar:

$$d_{\text{hor}} \approx 3,572\sqrt{h} \text{ km}, \quad (h \text{ em metros acima da superfície da Terra}). \quad (1.2)$$

As fórmulas acima não levam em conta o efeito de refração atmosférica (veja Sec. 3.4). A refração faz com que, na realidade, podemos observar distâncias ligeiramente superiores (10 a 20%) do que as distâncias obtidas com as equações acima, ou seja, $d_{\text{hor}} \sim 4\sqrt{h}$ km.

Quando observamos as estrelas de uma noite para outra, não notamos praticamente nenhuma mudança na posição relativa entre elas, isto é, a posição de uma estrela em relação a alguma outra. De fato, apenas com observações muito precisas e ao longo de muito tempo é que podemos determinar o *movimento próprio* de algumas estrelas. A estrela com o maior movimento próprio conhecido é a Estrela de Barnard, invisível a olho nu, com um movimento próprio de $10''3$ por ano. Todas as estrelas têm movimento próprio, mas apenas para as mais próximas é que podemos detectar este movimento (o movimento próprio será abordado em mais detalhes na seção 3.8).

Assim, desde a antiguidade, as estrelas são utilizadas como meio de *orientação*. Para facilitar a orientação, as estrelas fixas foram “ordenadas” na esfera celeste: as estrelas mais brilhantes eram organizadas de modo a representarem criaturas mitológicas, animais ou instrumentos, as chamadas *constelações*. Diferentes povos criavam diferentes constelações ao longo da história, representando objetos ou criaturas diferentes. As constelações serviam para dividir a esfera celeste em setores e tornava mais prática a identificação das estrelas.




Figura 1.3: Planisfério da esfera celeste mostrando as principais constelações (em itálico), estrelas e círculos de referências (serão definidos mais adiante na seção 1.5).

As constelações que utilizamos hoje em dia vêm principalmente da mitologia greco-romana (Andrômeda, Áquila, Perseu, Hércules, Órion, etc...) e da época das grandes navegações (Triângulo Austral, Cruzeiro do Sul, Horologium, etc...). Os gregos, por sua vez adotaram algumas das constelações utilizadas na Mesopotâmia, possivelmente desde o Império Acádio há mais de 5 mil anos, especialmente as constelações do zodiaco.

As constelações atuais foram estabelecidas pelos astrônomos do século XVII e suas fronteiras foram homologadas pela União Astronômica Internacional (UAI) em 1928 – dois anos depois Eugène Delporte traça os limites das constelações; ao todo são 88 constelações.

Em uma dada constelação as estrelas são ordenadas geralmente segundo seu brilho aparente, a mais brilhante é alfa, a segunda mais brilhante é beta, depois vem gama e assim por diante. Por exemplo, alfa do Cão Maior é a estrela Sirius. Contudo, alfa de Órion é a estrela Betelgeuse mas a estrela mais brilhante desta constelação é Rigel (beta de Órion). Este sistema foi sugerido e adotado por Johann Bayer em 1603 em seu atlas celeste *Uranometria*.¹ Depois que termina o alfabeto grego, vem o latino e depois pares de letras latinas na designação das estrelas.

Entre as constelações destacam-se 12, as constelações do Zodíaco. São nestas constelações que encontramos geralmente os planetas, a Lua e o Sol. Na realidade, os diversos membros do sistema solar também transitam pela constelação de Ophiuchus (Serpentário), que não faz parte do Zodíaco tradicional. Isto porque, provavelmente, 360° é divisível por 12, mas não por 13. Possivelmente, como há aproximadamente 12 lunações em um ano, os astrônomos da Mesopotâmia optaram em dividir a trajetória aparente do Sol, o Zodíaco, em doze partes iguais dando origem às constelações que ainda hoje utilizamos.

Contudo, as constelações não servem como um sistema de coordenadas para fins práticos. Na seção 1.5 veremos como são definidos os diversos sistemas de coordenadas utilizados habitualmente na esfera celeste e na seção 1.7 veremos as relações entre estes sistemas. Convém lembrar que as estrelas em uma constelação geralmente não estão próximas entre si nem são fisicamente ligadas!

Padrões aparentes de estrelas que geralmente são facilmente reconhecíveis são chamados **asterismos**. Um asterismo pode ser parte de uma constelação ou conter estrelas de várias constelações. Um exemplo de asterismo são as Três Marias na constelação de Órion.

1.2.1 Bandeira do Brasil

Na bandeira brasileira temos uma representação aproximada da esfera celeste (Fig. 1.4) que corresponde a uma observação do céu no dia 15 de Novembro de 1889 às 8h30 no Rio de Janeiro. Contudo, a esfera celeste da bandeira está invertida, isto é, corresponde à observação por alguém *fora* da esfera celeste, da forma como olhamos um globo terrestre. Cada estrela representa um estado e o Distrito Federal.

1.3 Movimento Aparente dos Astros

Chamamos de *movimento aparente* qualquer deslocamento na esfera celeste que possa ser medido por um observador. É importante lembrar que estas medições de movimento nem sempre são feitas em um referencial inercial como, por exemplo, um observador em repouso sobre a Terra (uma vez que esta gira em torno dela mesma). Para a interpretação física destes movimentos (estudo da mecânica celeste, por exemplo) é necessária uma descrição dos movimentos aparentes em um referencial inercial.

Veremos a seguir os principais movimentos aparentes dos astros. Os movimentos mais lentos ou de menor amplitude serão tratados em seções posteriores.

Mesmo com uma observação casual do céu, podemos facilmente notar que todos os astros se movem de forma semelhante. Os astros se levantam no leste e se põem no oeste. Dependendo da latitude do observador, alguns astros não se levantam nem se põem, mas aparentam girar em torno de um ponto fixo na Esfera Celeste, o chamado *polo celeste* (Fig. 1.5). No hemisfério setentrional, o polo norte celeste pode ser encontrado facilmente localizando-se a estrela Polar (ou Polaris ou ainda alfa da constelação da Ursa Menor) de magnitude 2,0. No hemisfério meridional, não há nenhuma estrela brilhante próxima ao polo sul celeste; a estrela visível a

¹O nome vem de Urânia, musa da astronomia e filha de Zeus na mitologia grega.




Figura 1.4: Esquerda: Bandeira oficial do Brasil com a identificação das estrelas e estados. Direita: Representação da esfera celeste que seria observada em 15/11/1889 às 8h30 no RJ (as estrelas da bandeira estão em destaque, mais escuras e maiores). Note que o “céu” da bandeira está invertido em relação ao céu que observamos da Terra.




Figura 1.5: Polo celeste sul visto de São Paulo no início de Setembro em 4 instantes diferentes: às 20, 22, 24, e 2 horas. Os círculos representam as Declinações e as retas são as Ascensões Retas (este sistema de coordenadas será definido na seção 1.5.2). O tamanho das estrelas é proporcional ao brilho aparente (escala em magnitude). Estando no Hemisfério Sul e olhando para a direção sul, veremos os astros girando em torno do Polo Sul Celeste no sentido horário. No Hemisfério Norte, veríamos os astros girando em torno do Polo Norte Celeste no sentido anti-horário.

olho nu mais próxima é delta Octans de magnitude 4,3 (a olho nu, em um céu limpo, podemos ver até estrelas de magnitude 5). Podemos localizar o polo sul celeste utilizando a constelação do Cruzeiro do Sul, que aponta diretamente para o polo.

Este movimento aparente da esfera celeste é devido à rotação da Terra em torno do seu eixo. Os polos celestes nada mais são do que uma projeção dos polos terrestres na esfera celeste. Este movimento é chamado *movimento diário*. A Terra leva cerca de 23h56m04s para completar uma rotação em torno de si mesma em relação às estrelas. Na seção 1.6 abaixo, veremos novamente os movimentos diários utilizando os elementos da esfera celeste que serão introduzidos mais adiante.

Como já foi dito, o movimento próprio das estrelas e objetos mais distantes (nebulosas, galáxias, etc. . .) é desprezível em relação ao movimento aparente devido à rotação da Terra. Por outro lado, para os objetos mais próximos, no Sistema Solar, isto não é verdade.

Desde a antiguidade os *movimentos próprios* dos planetas, Sol e Lua em relação às estrelas já haviam sido notado. Comparando a posição da Lua relativa às estrelas em duas noites consecutivas, é imediata a constatação de movimento (veja figura 1.6). De fato, em relação às estrelas a Lua se desloca com um movimento médio de 13,17 graus por dia de oeste para leste. Isto corresponde a cerca de 30' por hora, uma distância equivalente ao seu diâmetro aparente. Este movimento é devido à translação da Lua em torno da Terra, isto é, o movimento próprio da Lua (figura 1.7).




Figura 1.6: Movimentos aparentes na esfera celeste. O movimento aparente da Lua em relação às estrelas fixas pode ser notado comparando as imagens de observações em São Paulo em dias consecutivos feitas no mesmo horário (5h da manhã, hora local). A região verde representa o horizonte na direção Leste e as regiões cinzas representam a Via Láctea. Observe também que as estrelas também apresentam um movimento; a cada dia as estrelas se levantam cerca de 4 minutos mais cedo. Também podemos notar o movimento aparente de Vênus e Mercúrio (abaixo do horizonte, portanto não observável na realidade) em relação às estrelas “fixas”. Já o movimento próprio de Júpiter e Saturno são imperceptíveis em apenas 4 dias na escala desta figura.

Apesar da Lua sempre mostrar a mesma face para a Terra, o mesmo não ocorre em relação ao Sol: devido à rotação da Lua em torno de seu eixo, toda a superfície da Lua é eventualmente iluminada pelo Sol. Devido a esta geometria ilustrada na figura 1.7, a Lua apresenta *fases*: *Lua Cheia*, quando a face visível da Lua está toda iluminada; *Lua Nova* quando a face visível

da Lua está do lado oposto ao Sol; Quarto Crescente e Minguante, quando apenas parte da face visível é iluminada pelo Sol.




Figura 1.7: Movimento próprio da Lua em torno da Terra. Observe que a Lua apresenta sempre a mesma face voltada para Terra. A Lua gira em torno do seu próprio eixo com o mesmo período em que gira em torno da Terra. Esta figura está completamente fora de escala; para o sistema Terra-Lua em escala realista veja a Fig. 4.27 na página 127.

A órbita da Lua não é estática e apresenta um movimento de *precessão*. A órbita lunar é inclinada em relação à eclíptica de cerca de 5° e, portanto, corta a eclíptica em dois pontos que são chamados *nodos*. Devido a precessão da órbita lunar, os nodos retrocedem cerca de $19,35$ por ano (Fig. 1.8). Este movimento tem consequência na periodicidade dos eclipses (como veremos na seção 4.10).




Figura 1.8: A órbita lunar é exibida em 4 momentos (linhas cinzas) separados por aproximadamente um ano cada um. A linha vermelha tracejada representa a eclíptica e a linha azul o equador celeste. Podemos ver que o nó da órbita retrocede, isto é, se movimenta no sentido oposto à Lua em sua órbita. Note também a inclinação da órbita lunar em relação à eclíptica.

O movimento aparente dos planetas é um pouco mais complexo. Isto se deve ao fato de que observamos uma composição de movimentos devido à translação da Terra em torno do Sol assim como do planeta observado. Na figura 1.9 vemos o movimento aparente de Marte em 2010.




Figura 1.9: Movimento aparente de Marte na esfera celeste ilustrando o movimento retrógrado. O intervalo entre duas posições ao longo da trajetória corresponde a uma semana. O tamanho aparente de Marte está representado de forma aproximada (e fora de escala). O movimento retrógrado dos planetas externos ocorre quando o planeta passa pela conjunção (Fig 4.12 na seção 4.9). Também estão indicadas algumas estrelas brilhantes, constelações e as coordenadas equatoriais.

Como pode ser visto, o movimento pode ser tanto *direto* (como a Lua, isto é, de oeste a leste) como *retrógrado* (isto é, no sentido inverso). Podemos entender este comportamento estudando o movimento da Terra e dos planetas em torno do Sol. Na figura 1.10 é mostrado o exemplo de Marte.




Figura 1.10: Posições da Terra e Marte em suas órbitas em torno do Sol no mesmo período do Fig. 1.9. Entre as posições marcadas 1 e 3, o movimento aparente de Marte é direto. Entre as posições 3 e 5, o movimento é retrógrado e, em seguida, volta a ser direto. Em 4, Marte está em oposição (isto é, o Sol, a Terra e Marte estão aproximadamente alinhados). As posições nas órbitas correspondem a intervalos de 4 semanas.

O movimento aparente do Sol em relação às estrelas é relativamente simples. O único problema é que, em geral, não podemos observar o Sol e as estrelas simultaneamente. Portanto, o movimento aparente do Sol em relação às estrelas é determinado de maneira indireta. Isto é feito notando-se que a cada dia que passa as estrelas se levantam cerca de 4 minutos mais cedo o que significa que a posição relativa aparente do Sol em relação às estrelas se altera neste mesmo ritmo (isto pode ser visto na figura 1.6). Além disto, devido à inclinação do eixo da Terra em relação ao sua trajetória em torno do Sol (*eclíptica*), o movimento aparente diário do Sol se altera durante o ano (Fig. 1.11). Isto é facilmente observado notando-se a mudança na posição onde o Sol nasce ou se põe ao longo do ano.




Figura 1.11: Variação anual da trajetória aparente do Sol durante o ano (p. ex., para um observador em São Paulo). No início do Inverno do hemisfério Sul, o Sol “nasce” na direção do Nordeste; no início da primavera, na direção Leste; e no início do Verão, na direção Sudeste.

1.3.1 Estações do ano

O eixo de rotação da Terra é inclinado em relação ao plano que contém sua órbita em torno do Sol. Disto resulta que, dependendo da época do ano, os hemisférios Norte e Sul são iluminados diferentemente e temos assim as *estações do ano*. A figura 1.12 mostra este fenômeno.




Figura 1.12: As estações do ano ocorrem devido à inclinação do eixo da Terra, e nada tem a ver com a distância da Terra ao Sol. Os círculos vermelhos sobre a Terra representam o equador, os trópicos e os círculos polares. Na figura, a órbita parece mais achatada para criar um efeito de perspectiva.

Note que a distância da Terra ao Sol não é responsável pelas estações do ano. A diferença de

distância entre o **afélio** (maior distância entre a Terra e o Sol) e o **periélio** (menor distância) devido à elipticidade da órbita terrestre é de aproximadamente 5 milhões de quilômetros, ou seja, uma variação de apenas 3,3% da distância média. Isto corresponde a uma variação da luminosidade solar (taxa de energia do Sol que chega na Terra) de cerca de 6,8%, insuficiente para provocar as estações do ano. Além disto, se a distância fosse importante neste fenômeno, a Terra teria a mesma estação do ano nos dois hemisférios, Norte e Sul, simultaneamente.

O principal efeito da variação da distância Terra-Sol, devido ao fato da Terra seguir uma elipse e não um círculo em torno do Sol, é que as estações do ano não têm todas exatamente a mesma duração (veja Tabela 1.1 e Fig. 5.13).

Tabela 1.1: Início e duração das estações do ano no hemisfério Sul (para o hemisfério Norte basta permutar Outono \rightarrow Primavera, Inverno \rightarrow Verão, etc.). Estes valores são válidos atualmente (mais ou menos alguns séculos) e variam com o tempo (veja Sec. 5.5).

	Outono	Inverno	Primavera	Verão
Início aproximado	20/03	21/06	23/09	22/12
Duração média (dias)	92,76	93,65	89,84	88,99

O verão no hemisfério Sul é mais curto que o inverno (e conseqüentemente mais curto que o verão no hemisfério Norte) porque a Terra se encontra próxima do periélio nesta época do ano (o periélio ocorre por volta do dia 2 a 4 de janeiro). Na página 157 temos uma tabela das datas de periélio e afélio.

Mais adiante, na seção 1.5.2, daremos a definição precisa do início de cada estação. Na seção 2.6 veremos como varia a taxa de energia recebida (a iluminação) do Sol durante o ano para diferentes latitudes. Também discutiremos as estações do ano em outros planetas do Sistema Solar na seção 5.1.

1.4 Sistema de Referência

Para podermos descrever os processos físicos de algum fenômeno observado ou previsto por alguma teoria é necessário um *Sistema de referência*. Mais fundamental ainda, as leis da Física, como as Leis de Newton, por exemplo, são definidas a partir de um sistema de referência inercial, isto é, não acelerado.

Em astronomia, os sistemas de coordenadas, que veremos mais adiante, são definidos a partir de um sistema de referência. Para isto, é necessária uma *realização* do sistema de referência. Desde a época da Grécia Clássica, há mais de 2 mil anos, esta realização se dá por um *catálogo fundamental* com as posições de objetos astronômicos. Até a década de 1980, estes objetos eram estrelas e, a partir da década seguinte, objetos extra-galácticos começaram a ser usados. O uso de objetos extragaláctico é importante, pois estes objetos não participam da rotação da nossa galáxia.

Desde 1998, o sistema de referência celeste recomendado pela UAI é o ICRS (*International Celestial Reference System*). Trata-se de um sistema ideal, com origem no centro de massa do Sistema Solar (aproximadamente heliocêntrico, muito próximo do centro do Sol), sem rotação em relação ao conjunto de objetos extra-galácticos. O ICRS é realizado pelo ICRF (*International Celestial Reference Frame*), um conjunto de 212 radiogaláxias². O uso de radiogaláxias é conveniente por duas razões: (I) objetos extra-galácticos, a exceção do Grupo Local de ga-

²Radiogaláxia é um tipo de galáxia que apresenta forte emissão em frequências de rádio (~ 10 MHz–100 GHz), geralmente devido à atividade de um núcleo ativo (acréscimo de matéria em um buraco negro supermassivo no centro da galáxia).

laxias³, têm movimento próprio (veja Sec. 3.8) praticamente nulo e, (II) suas posições podem ser determinadas com altíssima precisão através da técnica de interferometria.

1.5 Sistema de Coordenadas

A posição de um astro qualquer na Esfera Celeste pode ser definido sem ambiguidade através de dois ângulos em relação ao sistema de coordenadas adotado, que por sua vez é definido a partir de um ponto central. A escolha precisa de um sistema de coordenadas ligado à Esfera Celeste vai depender sobretudo da análise ou problema que se queira resolver.

Para uma esfera (qualquer uma em princípio), os sistemas de referências utilizados são definidos por um *plano principal* que divide a esfera em duas partes iguais definindo-se assim um grande círculo (Fig. 1.13). Definimos arbitrariamente um ponto de origem neste círculo principal, por onde passa o *meridiano principal*, outro grande círculo perpendicular ao grande círculo precedente.




Figura 1.13: As coordenadas em uma esfera são definidas através de um plano fundamental que corta a esfera em duas metades, passando pelo centro (definindo um círculo principal ou equador) e um ponto arbitrário no equador. Através deste ponto traça-se um outro grande círculo, perpendicular ao “equador”, definindo-se assim o meridiano principal. Planos que cortam a esfera mas não passam pelo centro definem os pequenos círculos.

Os (pequenos) círculos paralelos ao círculo principal definem as *latitudes* da esfera enquanto os grandes círculos perpendiculares ao círculo principal definem as *longitudes*. Estes ângulos são similares ao que utilizamos para localizar um ponto na superfície terrestre, a longitude e a latitude.

A escolha do ponto central do sistema de coordenadas é arbitrária e depende do problema astronômico em questão. Se o centro do sistema coincide com o centro da Terra, dizemos que o sistema de coordenadas é *geocêntrico*; se o centro for o Sol então temos um sistema *heliocêntrico*; se o centro do sistema de coordenadas for um ponto na superfície da Terra, este sistema será *topocêntrico*.

A posição de um ponto qualquer em uma esfera pode ser escrita convenientemente em forma matricial, a partir do sistema de coordenadas esféricas polares (Fig. 1.14):

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} \cos \delta \cos \lambda \\ \cos \delta \sin \lambda \\ \sin \delta \end{pmatrix}, \quad (1.3)$$

onde δ e λ são a latitude e a longitude em um dado sistema de coordenadas e ignoramos aqui a coordenada radial, r . Esta forma, baseada no sistema de coordenadas esféricas é particularmente útil para o cálculo de transformações de coordenadas (como veremos na seção 1.7).

³O Grupo Local é o grupo de galáxias onde se encontra a nossa própria galáxia, a Via Láctea.




Figura 1.14: Coordenadas esféricas polares, λ e δ de um ponto (sistema dextrogiro). r é o raio vetor e R é a sua projeção no plano $x-y$. O ângulo longitudinal é medido a partir do eixo x .

1.5.1 Coordenadas Horizontais

O plano principal do sistema de coordenadas horizontais é definido como sendo o plano que contém o horizonte do observador. Os dois ângulos que definem a posição de um astro qualquer são a *altura*, h , e o *azimute*, A , como mostra a figura 1.15.




Figura 1.15: Sistema de coordenadas horizontal. O astro M tem coordenadas h (altura) e A (azimute). Os “polos” deste sistema são o zênite e o nadir. O azimute é medido a partir do Sul em direção ao Oeste, ao longo do horizonte (o círculo principal neste sistema). A altura é positiva em direção ao zênite e negativa em direção ao nadir. Também são mostrados na figura os eixos cartesianos x , y e z .

O horizonte do observador deve ser definido corretamente. O horizonte visível ou aparente é sujeito às irregularidades topográficas, não definindo necessariamente desta forma um grande círculo e, conseqüentemente, não servindo como base para a definição de um sistema de coordenadas. Assim, definimos o *horizonte astronômico* como sendo o círculo centrado no observador, perpendicular à sua vertical (definida como paralela ao campo gravitacional), independentemente de acidentes geográficos. A intersecção desta mesma vertical com a esfera celeste, define o **zênite** e o **nadir**.

A altura de um astro é medida a partir do horizonte astronômico, sendo positivo quando o astro está acima do horizonte e negativo no caso contrário. Assim o zênite tem por definição uma altura de 90° e o nadir, -90° . O pequeno círculo paralelo ao horizonte, portanto de altura constante, é chamado de *Almucântara* ou Almucântar.

O *meridiano principal* ou **meridiano local** é o grande círculo que passa pelo zênite na direção norte–sul, perpendicular ao horizonte. Também chamamos de **primeiro vertical** (assim mesmo, no masculino) o grande círculo que passa pelo zênite porém na direção leste–oeste.

O azimute é por definição medido a partir do meridiano Sul (0°) do observador e os ângulos são contados no sentido \rightarrow Oeste (90°) \rightarrow Norte (180°) \rightarrow Leste (270°). Por ser uma definição arbitrária, o meridiano de origem do azimute é as vezes localizado no Norte ao invés do Sul. Neste caso, teríamos Norte (0°) \rightarrow Leste (90°), etc.

Em notação matricial, a posição de um astro de altura h e azimute A é (atenção com o sinal negativo da coordenada y):

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} \cos h \cos A \\ -\cos h \sin A \\ \sin h \end{pmatrix}. \quad (1.4)$$

Devemos notar ainda que neste sistema, as coordenadas de um astro variam com o tempo devido sobretudo ao movimento diário (rotação da Terra). De fato, para um observador no hemisfério Norte olhando para o Sul, o azimute de um astro (que não seja circumpolar, veja sec. 1.6) sempre aumenta durante o decorrer de um dia (exceto pela descontinuidade a 360°). Já um observador no hemisfério Sul, olhando para o Norte, verá o azimute de um astro (que não seja circumpolar) diminuir com o passar do tempo.

1.5.2 Coordenadas Equatoriais

No sistema equatorial, o plano principal é a projeção do equador terrestre na esfera celeste, chamado *equador celeste* (Fig. 1.16). A projeções dos polos terrestres na esfera celeste definem os polos celestes Norte e Sul.




Figura 1.16: Sistema de coordenadas equatorial. O astro M tem coordenadas ascensão reta (α , medida a partir do ponto vernal, γ) e declinação (δ). Atualmente, a inclinação do equador celeste em relação à eclíptica, ε , é de aproximadamente $23^\circ 26' 21''{,}45$ no início do ano 2000.

A origem do sistema de coordenadas é definido pela intersecção do equador celeste com a eclíptica (a trajetória aparente do Sol na esfera celeste durante um ano). Como há duas intersecções entre o equador celeste e a eclíptica, foi escolhido arbitrariamente a intersecção em que o Sol cruza o equador celeste de Sul para Norte. Este ponto é chamado *equinócio*

vernal ou primeiro ponto de Áries (usamos o símbolo Υ)⁴. Quando o Sol está neste ponto temos o início do outono no hemisfério Sul e da primavera no Norte. A palavra equinócio vem do latim e significa “noites iguais” – quando o Sol se encontra no equinócio a duração da noite é a mesma em toda a Terra.

A intersecção entre o equador celeste e a eclíptica a 180° do equinócio vernal, quando o Sol passa de Norte para Sul, é chamada *ponto de Libra*, $\underline{\Omega}$, ou equinócio de Setembro.

A *declinação*, δ , de um ponto M é a distância angular medida sobre o meridiano que passa por este ponto a partir do equador celeste. Quando medido na direção do polo norte celeste $\delta > 0$, caso contrário a declinação é negativa. A *ascensão reta*, α , é o ângulo entre o ponto vernal e o meridiano do astro M. A ascensão reta é medido na direção Leste. Note que a ascensão reta cresce no sentido oposto ao azimute das coordenadas horizontais e que a ascensão reta aumenta no sentido do *movimento anual* do Sol e do *movimento direto* do planetas.

Em notação matricial, a posição de um astro de *declinação*, δ , e *ascensão reta*, α é:

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} \cos \delta \cos \alpha \\ \cos \delta \sin \alpha \\ \sin \delta \end{pmatrix}. \quad (1.5)$$

Por convenção, a ascensão reta é medida em horas, minutos e segundos como o tempo (ao invés de graus, minutos e segundos de arco). A relação é simplesmente $1^h = 15^\circ$.

A ascensão reta e a declinação de uma estrela não se alteram devido ao movimento diurno de rotação da Terra. Isto não significa que no sistema equatorial não haja uma variação das coordenadas com o tempo, mas que esta variação é muito mais lenta que no caso das coordenadas horizontais.

Estações do ano

Devido à inclinação do eixo de rotação da Terra, o Sol tem uma trajetória aparente anual – a eclíptica – inclinada em relação ao equador. Isto é a origem das *estações* do ano (veja seção. 1.3.1) que ocorrem tanto na Terra como em outros planetas do Sistema Solar (veja seção 5.1)..

Como vimos, a passagem do Sol pelo equinócio vernal marca o início do outono no hemisfério Sul; neste momento, por definição, a ascensão reta do Sol é zero ($\alpha_\odot = 0^h$). O inverno tem início quando $\alpha_\odot = 6^h$ (dizemos que o Sol está no solstício de inverno), a primavera se inicia quando $\alpha_\odot = 12^h$ (equinócio de primavera), e o verão quando $\alpha_\odot = 18^h$ (solstício de verão). No hemisfério norte, ao invés do início do verão, temos o início do inverno quando $\alpha_\odot = 18^h$ e o solstício é chamado de inverno (Fig. 1.17).

Devido à obliquidade da eclíptica, também podemos definir algumas latitudes especiais. No início do verão do hemisfério Sul, o Sol passa pelo zênite de observadores que estejam na latitude $\varphi = -\varepsilon$, onde $\varepsilon = 23^\circ 27'$ é a inclinação do eixo terrestre. Esta latitude é chamada *Trópico de Capricórnio*, veja Fig. 1.18. Da mesma forma, no início do verão do hemisfério Norte, o Sol passa pelo zênite na latitude $\varphi = +\varepsilon$; este é o *Trópico de Câncer*. Se a latitude do observador estiver entre $+23^\circ 27' N$ e $23^\circ 27' S$ verá, pelo menos uma vez por ano, o Sol passar pelo zênite. Para observadores fora desta zona, o Sol nunca passa pelo zênite.

A partir de uma certa latitude podemos observar o Sol durante 24h (o chamado Sol da meia-noite). Para isto, a latitude deve ser superior a $90^\circ - \varepsilon$, ou seja $\pm 66^\circ 33'$ (dependendo se estamos no hemisfério Norte ou Sul). Estas latitudes são os *círculos polares Ártico* e *Antártico*.

⁴Alguns autores chamam o ponto vernal de “ponto gama”, provavelmente pela semelhança entre a letra grega “ γ ” (gama) e o símbolo Υ .




Figura 1.17: Detalhe da esfera celeste em coordenadas equatoriais mostrando a eclíptica com os meses que correspondem à posição do Sol. O início das estações para o hemisfério Sul está assinalado acima da figura




Figura 1.18: Diagrama ilustrando a definição dos trópicos de câncer e capricórnio e os círculos polares. O ângulo ϵ é a inclinação do eixo da Terra (obliquidade da eclíptica).

A forma como o Sol ilumina a superfície terrestre nos solstícios e equinócios pode ser vista na Fig. 1.19.

Coordenadas Horárias

O sistema de coordenadas horárias é muito semelhante ao sistema equatorial. O círculo principal também é a projeção do equador terrestre e as declinações são medidas da mesma forma. Contudo, a origem das coordenadas longitudinais é diferente. No sistema horário a origem é o **meridiano local** (ou meridiano principal) do observador, como no sistema horizontal. Este ângulo é chamado **ângulo horário**, H (Fig. 1.20). Note que o ângulo horário é medido no sentido oposto à ascensão reta (mas no mesmo sentido que o azimute). Chamamos de *trânsito* quando um astro passa pelo meridiano local do observador.

Enquanto que a ascensão reta não varia devido ao movimento diurno da esfera celeste, o ângulo horário varia. A relação entre estas duas coordenadas está diretamente ligada ao movimento diurno da origem do sistema de coordenadas equatoriais, o ponto vernal, Υ . A soma da ascensão reta com o ângulo horário resulta em

$$T_s = H + \alpha, \tag{1.6}$$




Figura 1.19: Iluminação da Terra no início das estações do ano (solstícios e equinócios) ao meio-dia de Brasília (exceto para o solstício de dezembro que quando a hora de verão está em vigência em alguns estados). Na linha de cima vemos os planisférios com projeção Mollweide (áreas iguais e linhas de latitudes paralelas) e abaixo na forma de um globo.




Figura 1.20: Sistema de coordenadas horárias. O astro M tem coordenadas ângulo horário (H) e declinação (δ). A ascensão reta, α , também é medida ao longo do equador celeste, porém a partir do ponto vernal. A latitude do observador é φ , portanto o ângulo entre o equador celeste e o horizonte é $\pi/2 - \varphi$. Os eixos x_{hora} e x_{equat} correspondem aos sistemas horário e equatorial, respectivamente. Como o polo Norte celeste está acima do horizonte, este exemplo é de um observador do hemisfério Norte.

onde T_s é o *tempo sideral local* (o tempo sideral será discutido em detalhes na seção 2.1.3). Contudo é importante notar que T_s também pode ser interpretado como um ângulo, o *ângulo horário* do ponto vernal.

Em notação matricial, a posição em coordenadas cartesianas de um astro com ângulo horário H e declinação δ é dada por:

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} \cos \delta \cos H \\ -\cos \delta \sin H \\ \sin \delta \end{pmatrix}. \quad (1.7)$$

1.5.3 Coordenadas Eclípticas

O plano principal do sistema de coordenadas eclípticas é o plano da órbita da Terra em torno do Sol. Este sistema é particularmente útil no estudo de corpos do sistema solar, uma vez que a maioria dos corpos (sobretudo os planetas) estão em órbitas praticamente coplanares.




Figura 1.21: Sistema de coordenadas eclípticas. O astro M tem coordenadas longitude eclíptica (λ) e latitude (β). A inclinação da eclíptica em relação ao equador celeste é ε que vale aproximadamente $23^{\circ}26'21''$ atualmente.

As coordenadas neste sistema são a *longitude eclíptica*, λ , e a *latitude eclíptica*, β (Fig. 1.21). O ponto de origem é, como para as coordenadas equatoriais, o ponto vernal. A latitude β é medida a partir da eclíptica, sendo positivo em direção polo norte da eclíptica (o mais próximo do polo norte celeste) e negativo em direção ao Sul. A longitude λ , assim como a ascensão reta é medida a partir do ponto vernal, crescendo em direção ao Leste (como a ascensão reta).

1.5.4 Coordenadas Galácticas

Para as coordenadas galácticas, o plano principal é definido pelo plano do disco da Via Láctea (nossa galáxia é uma espiral, provavelmente barrada, com a distribuição da maioria das estrelas em um disco), o *Equador Galáctico*. A origem é dada pela direção do centro galáctico, que se encontra na constelação de Sagitário, com coordenadas $\alpha = 17^{\text{h}}45^{\text{m}}62$ e $\delta = -28^{\circ}56',17$ (J2000), veja Fig. 1.22. O “polo norte galáctico” se encontra em $\alpha = 12^{\text{h}}51^{\text{m}}44$ e $\delta = 27^{\circ}07',7$. Também é comum definirmos e usarmos a inclinação do equador galáctico em relação ao equador celeste, o ângulo $i = 90^{\circ} - \delta \approx 62,872$ e a linha dos nodos (a intersecção do equador celeste com o equador galáctico) localizada em $\alpha_{\text{nodo}} = 282,25$.




Figura 1.22: Sistema de coordenadas galácticas. O astro M tem coordenadas longitude galáctica (l) e latitude (b). O ponto N é a intersecção do plano galáctico com o equador celeste (o nodo), C.G. é o direção do centro da Galáxia (que fica na constelação de Sagitário) e i é a inclinação do plano galáctico em relação ao equador celeste.

Este sistema é utilizado principalmente em astronomia extragaláctica (como o estudo do Grupo Local de galáxias, no qual a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda são os principais membros) ou em problemas ligados à nossa galáxia como um todo (por exemplo, o movimento das estrelas do disco da Via Láctea).

Antes de 1959, a origem do sistema de coordenadas galácticas coincidia com o nodo (intersecção do plano galáctico com o equador celeste). Com a adoção do novo sistema, foram introduzidos os expoentes I e II para indicar o sistema antigo e o novo, i.e., (l^I, b^I) e (l^{II}, b^{II}) . A diferença dos dois sistemas é simplesmente $l^I = l^{II} - 33^\circ 0$.

Coordenadas Supergalácticas

Para o estudo de fenômenos ligados à estrutura em grande escala do Universo, foi introduzido o sistema de coordenadas Supergalácticas por Gérard de Vaucouleurs no início dos anos 1950. O plano principal é definido pelo plano onde se encontram uma grande concentração de galáxias do Superaglomerado Local, com centro no aglomerado de Virgo (Cosntelação da Virgem).

A origem deste sistema de coordenadas é, aproximadamente, na direção $\alpha = 2^{\text{h}}49^{\text{m}}$ e $\delta = +59^\circ 32'$ (J2000).

1.6 Movimento diário dos astros

Como já foi dito na seção 1.3, os objetos celestes têm um movimento aparente diário, surgindo na direção leste e se pondo na direção oeste. Para um observador no hemisfério Norte, a trajetória diária de um astro é um arco que culmina na direção sul, momento da *passagem meridiana* do astro. A figura 1.23 ilustra este movimento. No hemisfério Sul, a trajetória é semelhante, mas a **culminação** se dá na direção norte.




Figura 1.23: Movimento diário aparente. Como a Terra gira em torno do seu eixo de Oeste para Leste, temos a impressão de que a esfera celeste gira de Leste para Oeste. Os astros descrevem uma trajetória de declinação constante; o ângulo Horário e o azimute aumentam a medida que a estrela se desloca na esfera celeste. O astro M “nasce” no ponto q e se põe no ponto p .

Podemos notar nesta figura que nem todos os astros são visíveis para um dado observador: dependendo da declinação do astro, este nunca está acima da linha do horizonte. Por outro lado, também dependendo da declinação, existem astros que sempre estão acima da linha do horizonte. Um tal astro é chamado *circumpolar*. Um astro com declinação igual a zero (isto é, no equador celeste) se levanta exatamente na direção leste e se põe no oeste.

Observadores no hemisfério Sul olhando na direção do Sul geográfico podem ver as estrelas girando no sentido horário, como um relógio (Fig.1.24, esquerda). No hemisfério Norte ocorre o oposto, os astros apresentam um movimento aparente no sentido anti-horário quando observador na direção do Norte geográfico (Fig.1.24, direita). O movimento aparente tem sentido invertido quando observamos na direção oposta, por exemplo, observadores no hemisfério Sul olhando no direção do Norte geográfico.




Figura 1.24: Esquerda: Observação do movimento diário dos astros no hemisfério Sul no sentido horário. Direita: No hemisfério Norte, os astros têm um movimento aparente anti-horário, quando olhamos na direção do Norte geográfico

Podemos relacionar o sistema de coordenadas equatorial e horizontal *topocêntricas* de um dado observador e obter as declinações que correspondem aos astros circumpolares e aqueles que não são nunca visíveis. A Fig. 1.25 ilustra esta geometria.




Figura 1.25: Geometria correspondente à declinação máxima de astros visíveis e de astros circumpolares para um observador no hemisfério Sul. Esquerda: Perspectiva onde o equador está na horizontal (apropriado para coordenadas equatoriais). Direita: perspectiva onde o horizonte do observador está na horizontal (apropriado para coordenadas horizontais).

A latitude ϕ é negativa no hemisfério sul. O ângulo h_{PSC} é a altura do polo sul celeste. Ela é sempre positiva para um observador no hemisfério sul.

O ângulo $\delta_{circ.p.}$ é a declinação a partir da qual os astros são circumpolares (isto é, nunca estão abaixo do horizonte). Ela é negativa para um observador no hemisfério sul, positivo no Norte.

O ângulo δ_{max} é a declinação máxima observável para um observador no hemisfério Sul; neste caso ela é positiva. Para um observador no hemisfério Norte, teremos uma declinação mínima (negativa) observável.

As seguintes relações, para o hemisfério Sul, podem ser obtidas:

$$\begin{aligned}
 h_{\text{PSC}} + (90^\circ - |\phi|) &= 90^\circ &\Rightarrow h_{\text{PSC}} &= |\phi|; \\
 |\delta_{\text{circ.p.}}| + h_{\text{PSC}} &= 90^\circ &\Rightarrow \delta_{\text{circ.p.}} &= -(90^\circ - |\phi|); \\
 \delta_{\text{max}} + |\phi| &= 90^\circ &\Rightarrow \delta_{\text{max}} &= 90^\circ - |\phi|.
 \end{aligned}
 \tag{1.8}$$

No hemisfério Norte temos relações semelhantes (lembrando que no Norte, $\phi > 0$):

$$h_{\text{PNC}} = \phi; \quad \delta_{\text{circ.p.}} = 90^\circ - \phi; \quad \delta_{\text{min}} = -(90^\circ - \phi). \tag{1.9}$$

Estas relações são válidas quando a refração atmosférica é desprezível e os sistemas geocêntrico e topocêntrico são coincidentes (isto é, válido para astros com distância muito maior que o raio da Terra). Discutiremos isto no capítulo 3.

Das relações acima, destacamos que a observação da altura do polo celeste acima do horizonte – no hemisfério norte isto é bem simples pois há uma estrela brilhante praticamente no polo, a *Estrela Polar* – dá uma maneira simples para determinarmos a **latitude** geográfica do observador.

As relações acima também implicam que a distância do zênite ao equador celeste é igual (em módulo) à latitude geográfica do observador.

1.6.1 Culminação

Inicialmente, vamos considerar astros que não são circumpolares como o astro M da Fig. 1.23. O movimento aparente diário leva os astros a cruzarem o meridiano principal do observador. Neste momento dizemos que o tem seu *trânsito superior* ou *culminação superior*. No momento da culminação superior o astro terá sua altura máxima. Cerca de 12h depois, o astro cruza o meridiano oposto e ocorre a *culminação inferior*. A culminação inferior ocorre abaixo do horizonte do observador.

Já os astros circumpolares, que estão sempre acima o horizonte, cruzam apenas o meridiano principal, também com culminação superior e inferior, como mostra a Fig. 1.26.




Figura 1.26: Altura de um astro circumpolar observado no hemisfério Sul nos momentos de culminação superior e inferior devido ao movimento aparente diário. O ângulo ϕ é a altura do polo celeste e a latitude do observador e o ângulo p é medido entre os pontos de culminação superior e inferior em relação ao polo celeste. A altura da culminação inferior neste exemplo é h . Se p for maior que a distância zenital do polo celeste, a culminação superior se dá na direção oposta do polo em relação ao zênite.

A altura máxima que um astro atinge durante um dia será $h_{\text{sup}} = \phi + p$ e a altura mínima, $h_{\text{inf}} = \phi - p$, onde ϕ é a latitude do observador e p é o ângulo entre o ponto de culminação superior e o polo celeste acima do horizonte. O ângulo p é o complemento da declinação, δ , e tomando cuidado com as latitudes e declinações que podem ser negativas, obtemos a seguinte expressão válida para observadores em qualquer latitude:

$$h_{\text{sup}} = 90^\circ - |\phi - \delta|.$$

Para sabermos em qual direção, Norte ou Sul em relação ao zênite, será a culminação superior temos:

$$\text{se } \phi > \delta \rightarrow \text{Sul} ; \quad \phi = \delta \rightarrow \text{Zênite} ; \quad \phi < \delta \rightarrow \text{Norte},$$

para qualquer latitude ou declinação. Se $h_{\text{sup}} < 0$ então o astro é circumpolar e nunca está acima do horizonte. Por exemplo, suponha um observador no hemisfério Sul na latitude $\phi = -23,5^\circ$:

Para $\delta = -60^\circ \rightarrow h_{\text{sup}} = +53,5^\circ$ culminação na direção Sul.

Para $\delta = -10^\circ \rightarrow h_{\text{sup}} = +76,5^\circ$ culminação na direção Norte.

Para $\delta = +70^\circ \rightarrow h_{\text{sup}} = -3,5^\circ$ culminação na direção Norte, abaixo do horizonte.

Para o transito da culminação inferior temos:

$$h_{\text{inf}} = -90^\circ + |\phi + \delta|.$$

Para determinarmos a direção da culminação inferior, usamos o mesmo critério descrito acima.

Considerando os astros circumpolares acima do horizonte do observador, podemos somar as culminações superior e inferior, $h_{\text{sup}} = \phi + p$ e $h_{\text{inf}} = \phi - p$, obtendo:

$$\phi = \pm \frac{h_{\text{sup}} + h_{\text{inf}}}{2}, \quad \text{para astros circumpolares},$$

onde usamos “+” se estamos no hemisfério Norte e “-” para observadores no hemisfério Sul.

1.7 Relação entre sistemas de coordenadas

Os diversos sistemas de coordenados, Horizontal, Equatorial, Eclíptico e Galáctico, podem ser visualizados e comparados na figura 1.27. Destes, apenas o sistema Horizontal é fixo, isto é, as linhas de azimute e altura que vemos na figura são as mesmas sempre independentemente do dia ou hora de observação. Os outros três sistemas acompanham o movimento diurno da esfera celeste.

Como vimos, as coordenadas polares de uma esfera podem ser escritas em forma vetorial em coordenadas cartesianas. A vantagem disto está no fato de que as transformações entre dois sistemas de coordenadas quaisquer podem ser decompostos em rotações que, por sua vez, podem ser representadas por matrizes. Assim, podemos facilmente escrever e calcular uma transformação de coordenadas utilizando produtos de matrizes e vetores.

No caso de uma rotação em torno de um dos eixos cartesianos, podemos considerar uma rotação a duas dimensões (Fig. 1.28). No exemplo desta figura, a rotação se dá ao redor do eixo z .

As rotações básicas ao redor dos eixos cartesianos x , y e z , cada uma de um valor angular α_x , α_y e α_z são dadas pelas matrizes dos cossenos diretores:

$$\mathbf{R}_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha_x & \text{sen } \alpha_x \\ 0 & -\text{sen } \alpha_x & \cos \alpha_x \end{pmatrix} ; \quad (1.10)$$

$$\mathbf{R}_y = \begin{pmatrix} \cos \alpha_y & 0 & -\text{sen } \alpha_y \\ 0 & 1 & 0 \\ \text{sen } \alpha_y & 0 & \cos \alpha_y \end{pmatrix} ; \quad \mathbf{R}_z = \begin{pmatrix} \cos \alpha_z & \text{sen } \alpha_z & 0 \\ -\text{sen } \alpha_z & \cos \alpha_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dado um par de coordenadas em um sistema qualquer, devemos encontrar a ou as rotações necessárias para transformá-las em um outro sistema de coordenadas. Genericamente, podemos escrever:

$$\mathbf{I}(\alpha, \delta) = \mathbf{R}_x \mathbf{R}_y \mathbf{R}_z \mathbf{I}(l, b), \quad (1.11)$$




Figura 1.27: Exemplo de quatro sistemas de coordenadas, para um observador em São Paulo no início do Outono, por volta da 22h, olhando para a direção Oeste. A região em cinza escuro representa o horizonte geográfico local, em cinza claro a Via Láctea e a Grande Nuvem de Magalhães (próxima do polo Sul da eclíptica). Em cada um dos painéis podemos ver o círculo principal do sistema de coordenadas.




Figura 1.28: Rotação no plano de um ângulo θ . As coordenadas do ponto P se escrevem como:

$$\begin{cases} x = \cos(\varphi) \\ y = \sin(\varphi) \end{cases} \text{ e } \begin{cases} x' = \cos(\varphi - \theta) = \cos(\varphi)\cos(\theta) + \sin(\varphi)\sin(\theta) \\ y' = \sin(\varphi - \theta) = \sin(\varphi)\cos(\theta) - \cos(\varphi)\sin(\theta) \end{cases}$$

onde φ é o ângulo do raio vetor de P. Eliminando-se φ obtêm-se as relações entre os dois sistemas de coordenadas.

onde devemos utilizar apenas as matrizes de rotação relevantes.

Lembramos que a ordem das operações é importante e que o produto de uma matriz por

um vetor é dado por:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z \end{pmatrix}. \quad (1.12)$$

Assim, para transformarmos um dado ponto em coordenadas eclípticas em coordenadas equatoriais, devemos notar que a única rotação necessária é do plano fundamental (equador celeste \rightarrow eclíptica) em torno do eixo x (veja Fig. 1.16). O ângulo desta rotação é a inclinação da eclíptica, notado ε , que vale aproximadamente $23^\circ 26' 21''$. Em notação vetorial resulta:

$$\begin{pmatrix} \cos \delta \cos \alpha \\ \cos \delta \sin \alpha \\ \sin \delta \end{pmatrix} = \mathbf{R}_{\mathbf{x}}(-\varepsilon) \begin{pmatrix} \cos \beta \cos \lambda \\ \cos \beta \sin \lambda \\ \sin \beta \end{pmatrix} \quad (1.13)$$

(note o sinal negativo de ε). Escrevendo explicitamente a matriz de rotação temos:

$$\begin{pmatrix} \cos \delta \cos \alpha \\ \cos \delta \sin \alpha \\ \sin \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varepsilon & -\sin \varepsilon \\ 0 & \sin \varepsilon & \cos \varepsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \beta \cos \lambda \\ \cos \beta \sin \lambda \\ \sin \beta \end{pmatrix}, \quad (1.14)$$

onde usamos as relações $\cos(-\varepsilon) = \cos(\varepsilon)$ e $\sin(-\varepsilon) = -\sin(\varepsilon)$. Fazendo a multiplicação matricial obtemos 3 equações:

$$\begin{aligned} \cos \delta \cos \alpha &= \cos \beta \cos \lambda \\ \cos \delta \sin \alpha &= \cos \varepsilon \cos \beta \sin \lambda - \sin \varepsilon \sin \beta \\ \sin \delta &= \sin \varepsilon \cos \beta \sin \lambda + \cos \varepsilon \sin \beta. \end{aligned} \quad (1.15)$$

As duas primeiras equações nos dão a relação entre α (ascensão reta) e as coordenadas eclípticas:

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha = \frac{\cos \varepsilon \cos \beta \sin \lambda - \sin \varepsilon \sin \beta}{\cos \beta \cos \lambda}.$$

A última equação do sistema acima dá a declinação em função da longitude e latitude eclíptica.

A transformação no sentido inverso, isto é, de coordenadas equatoriais em eclípticas é simplesmente:

$$\mathbf{I}(\lambda, \beta) = \mathbf{R}_{\mathbf{x}}(\varepsilon) \mathbf{I}(\alpha, \delta), \quad (1.16)$$

isto é [compare com a Eq. (1.14)],

$$\begin{pmatrix} \cos \beta \cos \lambda \\ \cos \beta \sin \lambda \\ \sin \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varepsilon & \sin \varepsilon \\ 0 & -\sin \varepsilon & \cos \varepsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \delta \cos \alpha \\ \cos \delta \sin \alpha \\ \sin \delta \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned} \cos \beta \cos \lambda &= \cos \delta \cos \alpha \\ \cos \beta \sin \lambda &= \cos \varepsilon \cos \delta \sin \alpha + \sin \varepsilon \sin \delta \\ \sin \beta &= -\sin \varepsilon \cos \delta \sin \alpha + \cos \varepsilon \sin \delta \end{aligned} \quad (1.17)$$

A passagem entre coordenadas equatoriais e horizontais é mais delicada. Como as coordenadas horizontais possuem um movimento diário, é mais conveniente utilizarmos as coordenadas horárias do que as coordenadas equatoriais diretamente. Observando as figuras 1.15 e 1.20, vemos que a passagem de um sistema ao outro se efetua por uma rotação em torno do eixo cartesiano y . Esta rotação é igual ao complemento da latitude do observador, $90^\circ - \varphi$. Obtemos assim,

$$\mathbf{I}(H, \delta) = \mathbf{R}_{\mathbf{y}}(-[90^\circ - \varphi]) \mathbf{I}(A, h), \quad (1.18)$$

o que resulta no seguinte sistema de equações:

$$\begin{aligned}\cos H \cos \delta &= \cos A \cos h \sin \varphi + \sin h \cos \varphi \\ \sin H \cos \delta &= \sin A \cos h \\ \sin \delta &= -\cos A \cos h \cos \varphi + \sin h \sin \varphi.\end{aligned}\quad (1.19)$$

A transformação inversa se faz pela rotação no sentido contrário,

$$\mathbf{I}(A, h) = \mathbf{R}_y(90^\circ - \varphi) \mathbf{I}(H, \delta), \quad (1.20)$$

Finalmente, vamos considerar as transformações entre as coordenadas equatoriais e galácticas. Neste caso devemos notar que as suas origens respectivas não coincidem (como, por exemplo no caso equatorial e eclíptico). Observando-se a figura 1.22, podemos notar que a transformação pode ser feita considerando-se três rotações distintas. Em primeiro lugar devemos deslocar a origem das coordenadas galácticas até a intersecção dos planos equatorial e galáctico (o nodo, notado N na Fig. 1.22). Em coordenadas galácticas, esta rotação se escreve simplesmente $l' \rightarrow l - l_{CG}$. Em segundo lugar, devemos efetuar uma rotação do nodo até a origem do sistema equatorial, o ponto vernal. Isto se faz simplesmente em coordenadas equatoriais, $\alpha \rightarrow \alpha - \alpha_N$. Finalmente, realizamos a rotação do plano galáctico em torno do eixo cartesiano x (uma vez que as duas rotações precedentes fizeram com que as origens coincidissem). Resumindo, temos $\mathbf{I}(l - l_{CG}, b) = \mathbf{R}_x(i) \mathbf{I}(\alpha - \alpha_N, \delta)$, ou:

$$\begin{pmatrix} \cos b \cos(l - l_{CG}) \\ \cos b \sin(l - l_{CG}) \\ \sin b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos i & \sin i \\ 0 & -\sin i & \cos i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \delta \cos(\alpha - \alpha_N) \\ \cos \delta \sin(\alpha - \alpha_N) \\ \sin \delta \end{pmatrix} \quad (1.21)$$

onde i é a inclinação do plano galáctico, $i = 62^\circ 6'$, $l_{CG} = 33^\circ$ e $\alpha_N = 18^{\text{h}}49^{\text{m}} = 282^\circ 25'$ (valores por definição exatos, válidos para B1950 = J1949,99979, isto é, $22^{\text{h}}9^{\text{m}}47^{\text{s}}$ de 31/12/1949 UTC, como foi definido originalmente).

Para o referencial de J2000, após transformar os valores precedentes pela *precessão* entre as épocas B1950 a J2000 (isto será visto em detalhes na seção 3.2.2), adota-se $i = 62^\circ 87'17''$, $\alpha_N = 18^{\text{h}}51^{\text{m}}44^{\text{s}} = 282^\circ 8595''$, e $l_{CG} = 32^\circ 93'19''$. Desenvolvendo a Eq. (1.21) para o referencial de J2000 temos:

$$\begin{aligned}\cos(l - 32^\circ 93'19'') \cos b &= \cos \delta \cos(\alpha - 282^\circ 8595'') \\ \sin(l - 32^\circ 93'19'') \cos b &= \sin \delta \sin 62^\circ 87'17'' + \cos \delta \sin(\alpha - 282^\circ 8595'') \cos 62^\circ 87'17'' \\ \sin b &= \sin \delta \cos 62^\circ 87'17'' - \cos \delta \sin(\alpha - 282^\circ 8595'') \sin 62^\circ 87'17''.\end{aligned}\quad (1.22)$$

A transformação de coordenadas acima também pode ser expressa em termos da posição do polo norte galáctico em coordenadas equatoriais, $b = 90^\circ \rightarrow (\alpha_{NG} = 192^\circ 8595'$, $\delta_{NG} = 27^\circ 1283'$), e da longitude galáctica do polo norte celeste, $\delta = 90^\circ \rightarrow l_N = 122^\circ 9319'$, (valores válidos para J2000). Podemos reconhecer algumas equivalências entre os valores dos ângulos usados na transformação de coordenadas equatoriais e galácticas: $i = 90^\circ - \delta_{NG}$, $l_{CG} = l_N - 90^\circ$ e $\alpha_N = 90^\circ + \alpha_{NG}$.

Determinação da latitude e declinação de um astro

Vamos utilizar as relações que vimos nesta seção para mostrar como podemos determinar a latitude e a declinação de um astro a partir de duas observações. Vamos supor que o astro não se movimenta entre estas 2 observações.

Hemisfério norte: A primeira observação é feita quando o astro passa pelo meridiano do observador e medimos sua altura, a_1 . Mais tarde, observamos o astro novamente quando seu

azimute é igual a 90° (isto é, está no Oeste, na direção do *primeiro vertical*) e sua altura é medida novamente, a_2 (ignoramos a refração atmosférica, que veremos na sec. 3.4). Resumindo, temos:

$$\text{primeira obs.:} \begin{cases} A_1 = 0; \\ h_1 = a_1; \\ H_1 = 0, \end{cases} \quad \text{e segunda obs.:} \begin{cases} A_2 = 90^\circ; \\ h_2 = a_2; \\ H_2 = \text{desconhecido,} \end{cases}$$

onde H é o ângulo horário.

Os sistemas equatorial e horário se relacionam pelas Eqs. (1.19); usando os valores da 1ª observação obtemos duas equações:

$$\begin{cases} \cos \delta = + \cos a_1 \sen \varphi + \sen a_1 \cos \varphi; & \text{(I.a)} \\ \sen \delta = - \cos a_1 \cos \varphi + \sen a_1 \sen \varphi, & \text{(I.b)} \end{cases}$$

e, para a 2ª observação, temos 3 equações:

$$\begin{cases} \cos H \cos \delta = \sen a_2 \cos \varphi; & \text{(II.a)} \\ \sen H \cos \delta = \cos a_2; & \text{(II.b)} \\ \sen \delta = \sen a_2 \sen \varphi. & \text{(II.c)} \end{cases}$$

Substituindo (II.c) em (I.b) e eliminando $\sen \delta$ vem:

$$\begin{aligned} \sen a_2 \sen \varphi &= - \cos a_1 \cos \varphi + \sen a_1 \sen \varphi \quad \Rightarrow \quad \sen \varphi (\sen a_2 - \sen a_1) = - \cos a_1 \cos \varphi. \\ \Rightarrow \quad \tan \varphi &= \frac{\cos a_1}{\sen a_1 - \sen a_2}; \quad [\text{Hemisfério Norte}], \end{aligned}$$

com a condição que $a_1 \neq a_2$ (o que só ocorre se a estrela estiver no polo celeste). As duas medidas da altura da estrela nos dão a latitude do observador. A equação acima pode ser re-escrita como:

$$\cos \varphi = \sen \varphi \frac{\sen a_1 - \sen a_2}{\cos a_1},$$

(válida se $a_1 \neq 90^\circ$, isto é, o astro não pode estar no zênite na 1ª medida). Substituindo a Eq.(II.c) obtemos:

$$\cos \varphi = \frac{\sen \delta}{\sen a_2} \frac{\sen a_1 - \sen a_2}{\cos a_1},$$

Usando agora a Eq. (I.a) e eliminando φ obtemos:

$$\cos a_1 \left(\frac{\cos \delta}{\sen a_1} - \frac{\cos a_1 \sen \delta}{\sen a_1 \sen a_2} \right) = (\sen a_1 - \sen a_2) \frac{\sen \delta}{\sen a_2}.$$

Com um pouco de álgebra, simplificamos a expressão acima e obtemos finalmente:

$$\Rightarrow \quad \tan \delta = \frac{\sen a_2 \cos a_1}{1 - \sen a_1 \sen a_2}; \quad [\text{Hemisfério Norte}],$$

o que nos dá a declinação do astro.

Por exemplo, suponha que uma estrela foi observada na passagem meridiana com altura $a_1 = 58^\circ 30' 03''$, e algumas horas depois, foi observada ao passar pelo 1º vertical com altura $a_2 = 13^\circ 50' 01''$. Com isto podemos dizer que o observador estava na latitude $\phi = 40^\circ 25' \text{ N}$ e a declinação da estrela é $\delta = +08^\circ 55'$.

Hemisfério Sul Neste caso, observando a passagem meridiana na direção Norte, o azimute da primeira observação é $A_1 = 180^\circ$. As outras grandezas permanecem iguais. Usando o mesmo procedimento obtemos para a latitude e declinação:

$$\tan \varphi = \frac{\cos a_1}{\sen a_2 - \sen a_1} \quad \text{e} \quad \tan \delta = \frac{\sen a_2 \cos a_1}{\sen a_1 \sen a_2 - 1}; \quad [\text{Hemisfério Sul}].$$

1.7.1 Noções de trigonometria esférica

As relações entre os diversos sistemas de coordenadas que vimos nas seções anteriores também podem ser deduzidas a partir da trigonometria esférica. A trigonometria esférica apresenta diferenças fundamentais em relação à trigonometria plana. Por exemplo, na trigonometria plana a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180° . Em uma esfera, esta mesma soma dos ângulos internos de um *triângulo esférico* está no intervalo entre 180° e 540° (ou entre π e 3π radianos).

Na trigonometria plana (ou Euclidiana) a distância mais curta entre dois pontos é uma reta. Generalizando para geometrias não planas, a distância mais curta entre dois pontos é uma *geodésica* e, em geral, não é uma reta. No caso particular da geometria esférica, as geodésicas são segmentos de grandes círculos. Um exemplo disto está na Fig. 1.29.



Figura 1.29: Distância mais curta entre dois pontos sobre uma superfície esférica (no caso, a Terra). Cada traço cheio, a geodésica, indica a distância mais curta entre São Paulo e a Ilha da Reunião, e Santiago e Cartum. Qualquer projeção plana (*planisfério*) de uma esfera irá deformá-la.




Figura 1.30: Triângulo esférico com vértices ABC sobre a superfície de um hemisfério (meia esfera). Os lados do triângulo, a , b e c , são segmentos de grandes círculos. A origem da esfera (centro) está no ponto O .

A figura 1.30 ilustra um exemplo de triângulo esférico. Da mesma forma que um triângulo plano é definido por retas, o triângulo esférico é definido por segmentos de grande círculos. Vamos supor que a esfera onde se encontra o triângulo tem raio unitário. Isto significa que os módulos dos vetores \vec{OA} , \vec{OB} e \vec{OC} são iguais a 1 e os ângulos a , b e c , quando medidos em radianos, correspondem aos comprimentos dos arcos \widehat{BC} , \widehat{AC} e \widehat{AB} , respectivamente.

O produto escalar dos vetores \vec{OB} e \vec{OC} é igual a $\cos(a)$ assim como $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = \cos(c)$ e $\vec{OA} \cdot \vec{OC} = \cos(b)$. Na figura 1.30 os pontos B' e C' são as projeções dos vértices B e C no eixo OA . Assim, o produto escalar $\vec{OB} \cdot \vec{OC}$ pode ser escrito como

$$\vec{OB} \cdot \vec{OC} = (\vec{OB}' + \vec{B'B}) \cdot (\vec{OC}' + \vec{C'C}).$$

Mas $\vec{OB}' \perp \vec{C'C}$ e $\vec{OC}' \perp \vec{B'B}$ (pois \vec{OB}' e \vec{OC}' estão sobre o eixo OA e $\vec{C'C}$ e $\vec{B'B}$ são, por definição, perpendiculares a este eixo). Obtemos desta forma,

$$\vec{OB} \cdot \vec{OC} = \vec{OB}' \cdot \vec{OC}' + \vec{B'B} \cdot \vec{C'C}.$$

Como $\vec{OB}' \parallel \vec{OC}'$, então $\vec{OB}' \cdot \vec{OC}' = \cos(b) \cos(c)$ e, por outro lado, $\vec{B'B} \cdot \vec{C'C} = \sin(b) \sin(c) \cos(\hat{A})$, o que resulta em:

$$\cos(a) = \cos(b) \cos(c) + \sin(b) \sin(c) \cos(\hat{A}), \quad (1.23)$$

conhecida como *fórmula fundamental* da trigonometria esférica. Esta fórmula também é válida através da permutação circular $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$.




Figura 1.31: Comprimento de segmentos de arco. O segmento $\widehat{A'B'}$ faz parte do círculo principal (equador), o segmento \widehat{AB} , do pequeno círculo de latitude φ .

O comprimento de um segmento de arco de um grande círculo é simplesmente o seu valor em radianos multiplicado pelo raio da esfera.

A Eq. (1.23) pode ser usada para determinarmos a distância mais curta, D_{12} , entre 2 pontos no globo terrestre com longitude e latitude (λ_1, φ_1) e (λ_2, φ_2) :

$$D_{12} = R \arccos [\sin \varphi_1 \sin \varphi_2 + \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 \cos(\lambda_2 - \lambda_1)],$$

onde R é o raio da Terra. Aqui estamos supondo que a Terra seja uma esfera (veremos na Sec. 3.1 que isto não é a melhor aproximação da forma da Terra).

Por exemplo, a cúpula do telescópio do IAG/USP na Cidade Universitária tem coordenadas $\lambda_1 = 46^\circ 44' 7''$, $\varphi_1 = -23^\circ 33' 34''$ (negativo pois está no hemisfério Sul), e a cúpula do telescópio *Gemini Norte* está em $\lambda_2 = 155^\circ 28' 08''$ e $\varphi_2 = +19^\circ 49' 26''$, logo a distância entre estes dois lugares é $d = 12.731$ km (levando em conta a forma da Terra, esta distância é de 12.721 km, uma diferença inferior a 0,08%).

No caso dos pequenos círculos é diferente. Consideraremos aqui apenas os pequenos círculos paralelos ao círculo principal (isto é, as latitudes ou declinações). Neste caso temos (Fig. 1.31):

$$\widehat{AB} = \widehat{A'B'} \cos \varphi = (\lambda_A - \lambda_B) \cos \varphi, \quad (1.24)$$

onde φ é a latitude do segmento de arco \widehat{AB} e λ_A e λ_B são as longitudes (ou ascensão reta) de A e B .

Notemos que a distância *mais curta* entre os pontos A e B na mesma latitude φ é dada pela Eq. (1.23), isto é:

$$\widehat{AB}_{\text{mais curta}} = \arccos \left[\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi \cos(\lambda_A - \lambda_B) \right].$$

Para o caso em que a separação seja pequena, i.e. $\delta\lambda \equiv (\lambda_A - \lambda_B) \ll 1$ (em radianos), temos:

$$\begin{aligned} \widehat{AB}_{\text{mais curta}} &\simeq \arccos \left[\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi - \frac{\delta\lambda^2}{2} \cos^2 \varphi \right] = \arccos \left[1 - \frac{\delta\lambda^2}{2} \cos^2 \varphi \right] \\ &\Rightarrow \widehat{AB}_{\text{mais curta}} \simeq \delta\lambda \cos \varphi. \end{aligned}$$

Quanto mais próximo do equador ($\varphi \rightarrow 0$), melhor é esta aproximação.

Tradicionalmente, a *milha náutica* é definida como o segmento de arco que corresponde à $1'$ sobre a superfície da Terra. Assim, por exemplo, um arco na superfície terrestre de comprimento igual a 1 radiano (igual a 3437,75 minutos de arco) equivale a 3437,75 milhas náuticas.

Sabendo-se que a circunferência equatorial da Terra mede aproximadamente 40.075 km, podemos concluir que uma milha náutica corresponde a 1,855 km.

Linha de rumo: loxodromia

A curva sobre uma esfera que cruza os meridianos com um ângulo constante é chamada de *linha de rumo* ou *loxodromia* (do grego, “caminho oblíquo”). Esta é a trajetória utilizadas por navios e aviões que mantêm um rumo constante em relação aos pontos cardeais. Apesar de ser a rota mais simples de ser seguida, ela não é um grande círculo (exceto no caso particular de seguir exatamente a direção Norte-Sul, ao longo de um meridiano). Logo, a loxodromia não é o caminho mais curto entre dois pontos sobre uma esfera (Fig. 1.32).




Figura 1.32: Linhas de rumo (loxodromia) em uma esfera (esquerda) convergem para os polos (exceto as linhas com inclinação zero, i.e. ao longo das latitudes). A linha azul faz um ângulo constante de 45° com os meridianos; a linha laranja tem um ângulo de 80° (a partir do Norte, em sentido horário). Na projeção de Mercator (direita, limitado aqui entre as latitudes $\pm 75^\circ$), as loxodromias são linhas retas. Note que as linhas de rumo geralmente **não** correspondem às distâncias mais curtas entre dois pontos na superfície da esfera.

O conceito de loxodromia foi estudado e popularizado pelo matemático português Pedro Nunes (1502–1578), também conhecido por sua tradução do “*Tratado da Esfera*”, de Sacrobosco.

Sobre uma esfera de raio r , uma loxodromia pode ser escrita em forma paramétrica, pela posição cartesiana $[x(\lambda), y(\lambda), z(\lambda)]$, como:

$$\begin{cases} x = r \frac{\cos \lambda}{\cosh[(\lambda - \lambda_0) \cot \alpha]} \\ y = r \frac{\sin \lambda}{\cosh[(\lambda - \lambda_0) \cot \alpha]} \\ z = r \tanh[(\lambda - \lambda_0) \cot \alpha], \end{cases} \quad \text{onde } -\ell < \lambda < \ell, \quad (1.25)$$

onde ℓ é o comprimento da curva de rumo, $\ell = 2\pi/\cos \alpha$ e o ângulo α é medido a partir o Norte em sentido horário é constante ao longo da loxodromia (Fig. 1.32). Observamos que as linhas de rumo são retas nos mapas com projecção de Mercator (discutida na próxima seção); isto foi particularmente útil para as grandes navegações, quando é muito mais simples manter o rumo (seguindo uma direção fixa) do que seguir a distância mais curta na superfície de uma esfera (a geodésica).

1.8 Projecção da esfera no plano: planisfério

A representação da esfera celeste ou do globo terrestre em uma superfície plana, um mapa, é um problema com mais de 2 milênios de história. Certamente vários mapas celestes foram feitos na Antiguidade, mas apenas os relatos chegaram até nós. Cláudio Ptolomeu sintetizou o conhecimento da antiguidade sobre projecções de esferas em planos por volta do ano 150 da nossa era em sua obra “*Geografia*”. O mapa celeste mais antigo que ainda existe é Chinês, feito na segunda metade do século **viii**⁵ retratando a posição aparente das estrelas com uma precisão inferior a cerca de 4°.

A dificuldade deste problema está na *impossibilidade* de representarmos uma superfície esférica em um plano, sem causar deformações. Qualquer projecção de uma esfera em um plano resulta em alguma imperfeição: ou os ângulos entre retas mudam, ou as distâncias se alteram, ou as áreas são ampliadas ou reduzidas, ou há uma deformação (por exemplo, um círculo na esfera passa a ser uma elipse no plano). Em outras palavras, não é possível transformar uma esfera em um plano sem rasgar, dobrar, esticar ou amassar de alguma forma. Esta impossibilidade gerou, ao longo do tempo, inúmeras propostas de soluções aproximadas, com vantagens e desvantagens.

De forma um pouco mais rigorosa, a projecção de uma esfera em uma superfície plana é uma relação da forma:

$$\underbrace{\begin{matrix} x = f_1(\theta, \phi) \\ y = f_2(\theta, \phi) \end{matrix}}_{\text{projecção}} \iff \underbrace{\begin{matrix} \theta = g_1(x, y) \\ \phi = g_2(x, y) \end{matrix}}_{\text{proj. inversa}} \quad \text{com a condição: } J(\theta, \phi) = \frac{\partial x}{\partial \theta} \frac{\partial y}{\partial \phi} - \frac{\partial y}{\partial \theta} \frac{\partial x}{\partial \phi} \neq 0, \quad (1.26)$$

onde θ e ϕ representam a latitude (ou declinação) e a longitude (ou ascensão reta), o par (x, y) são as coordenadas cartesianas no plano, as funções $f_{\{1,2\}}$ e $g_{\{1,2\}}$ definem as transformações direta (a projecção) e a inversa, e $J(\theta, \phi)$ é o *Jacobiano* da transformação. Centenas destas funções foram propostas na história da cartografia e da **uranografia** (o mapeamento do céu).

⁵Bonnet-Bidaud et al. 2009, Journal Astron. History and Heritage: “*The Dunhuang Chinese Sky*”

As projeções podem ser divididas em dois tipos: **perspectivas** e **não-perspectivas**. Geometricamente, as projeções perspectivas são feitas, como diz o nome, por linhas retas que saem da superfície da esfera e atingem o plano (ou cone ou cilindro) em um dado ponto. É como se projetássemos a esfera como uma sombra na superfície plana, com uma fonte de luz. As projeções não-perspectivas são relações puramente matemáticas que não são interpretadas de forma geometricamente simples. Na Fig. 1.33 ilustramos três casos simples de projeções perspectivas: *azimutal* (ou plana), *cônica* e *cilíndrica*. Além das três projeções perspectivas, é possível generalizar este conceito para projeções não-perspectivas como: pseudo-cilíndrica, pseudo-cônica e policônica, e pseudo-azimutal.




Figura 1.33: Tipo de projeções usadas em planisférios. Cada ponto da superfície da esfera corresponde a um ponto da superfície plana (projeção azimutal, caso polar), cônica ou cilíndrica dada pelas Eqs. (1.26). Lembramos que tanto o cone quanto o cilindro podem ser “desenrolados” sem deformação e são, portanto, equivalentes ao plano.

Tanto o cone como o cilindro são formas geométricas semelhantes ao plano; matematicamente dizemos que são superfícies com curvatura de Gauss nula. Uma esfera tem curvatura de Gauss positiva, enquanto que a superfície de uma sela de cavalo tem curvatura negativa. Por esta razão, quando queremos uma projeção plana da esfera escolhemos um cilindro, um cone ou um plano como ponto de partida.

O **aspecto** da projeção pode ser polar (geralmente as projeções azimutais e cônicas são usadas para isto) quando a projeção se faz na direção dos polos do sistema de coordenadas; equatorial (geralmente com a projeção cilíndrica ou azimutal) quando a projeção é na direção paralela dos polos; oblíqua (geralmente usando a projeção azimutal) em qualquer outra direção que não seja polar nem equatorial. No exemplo da Fig. 1.33, as projeções azimutal e cônica são polares e a projeção cilíndrica é equatorial.

Também podemos classificar as projeções da esfera no plano pelos atributos da esfera que são (ou não) conservados no plano. Temos as projeções **conformes** que preservam localmente a forma. Neste tipo de projeção as linhas de latitude e longitude (declinação e ascensão reta) se cruzam exatamente a 90° .

As projeções de **áreas iguais** preservam, como o nome indica, a área de uma superfície da esfera. Em todos os pontos deste tipo de projeção, a área da esfera corresponde à área no plano às custas de uma deformação.

Projeções **equidistantes** preservam localmente as distâncias entre dois pontos. Nenhuma projeção pode ser equidistante em toda a esfera. Por exemplo, na projeção sinusoidal (Fig. 1.36) as distâncias sobre o equador e as latitudes são corretas (iguais às distâncias medidas sobre uma esfera).

As projeções de **direção verdadeira** transformam alguns grandes círculos (distâncias mais curta entre dois pontos ou geodésicas na esfera) em linhas retas no plano. Este é o caso de projeções azimutais.

Em astronomia, para pequenas áreas da esfera celeste (menos que algumas dezenas de graus), as projeções mais utilizadas são as **azimutais**. Entre as projeções azimutais os tipos **Gnomônica**, **Estereográfica** e **Ortográfica** são os mais comuns. Albrecht Dürer usou a projeção estereográfica para representar a esfera celeste centrada no polo norte da eclíptica em 1515.

Estas projeções são perspectivas, no caso da projeção gnomônica ela pode ser obtida através de linhas retas que se originam no centro da esfera, atravessam sua superfície e chegam no plano de projeção (Fig. 1.34). No caso estereográfico, as linhas de projeção se originam do polo da esfera oposto ao plano. As projeções gnomônica e ortográfica podem apenas representar um único hemisfério simultaneamente, enquanto que a projeção estereográfica pode representar toda a esfera (mas com uma enorme deformação a medida que nos afastamos do centro de projeção). A projeção ortográfica representa o ponto de vista de um observador a distância infinita da esfera. Esta é a forma que geralmente a esfera tem uma aparência 3D em uma folha ou tela de computador.




Figura 1.34: Na projeção gnomônica os raios emanam do centro da esfera; na projeção estereográfica os raios vêm do polo oposto ao plano onde a esfera é projetada. Em ambos os casos deste exemplo o aspecto é polar. Para a projeção ortográfica, quando os raios são paralelos e vêm do infinito, veja a Fig. 1.33.

A descrição mais antiga que temos de projeções cônicas vêm de Ptolomeu. No século **XVII** as projeções cônicas e pseudo-cônicas começaram a ser usadas para mapear o céu com as cartas celestes de Wilhelm Schickard. A vantagem desta projeção é propiciar uma distorção relativamente pequena da forma das constelações nas declinações intermediárias entre os polos e o equador celeste.

Na figura 1.35 podemos comparar três tipos diferentes de projeções cônicas. Nestes casos, as declinações (latitudes) são sempre circulares e as linhas de ascensão reta (longitudes) são linhas retas; o ângulo entre ascensão reta e declinação é, corretamente, 90° .

As projeções cônicas geralmente têm duas latitudes chamadas **paralelo padrão** onde a deformação é mínima. Para latitudes distantes dos paralelos padrões a deformação é significativa. Geometricamente, os paralelos padrões correspondem às intersecções do cone com a esfera. A projeção cônica introduzida por Johann heinrich Lambert no século **XVIII** é conforme, porém a área tende ao infinito em um dos polos (Fig. 1.35).

A projeção **cônica equidistante**, introduzida por Ptolomeu e desenvolvida por Johannes Ryusch e Mercator no século **XVI**, mantém as distâncias corretas, porém causa uma deformação. Neste caso é possível ter um mapa de todo o céu, mas de utilidade limitada. Matemati-

camente, temos:

$$\begin{cases} x = \rho \operatorname{sen} \alpha; \\ y = \rho_0 - \rho \cos \alpha, \end{cases} \quad \text{onde } \alpha = n(\phi - \phi_0) ; \begin{cases} \rho = G - \theta ; \\ \rho_0 = G - \theta_0 ; \end{cases} \quad G = \frac{\cos \theta_1}{n} + \theta_1 ;$$

$$\text{e } n = \begin{cases} \frac{\cos \theta_1 - \cos \theta_2}{\theta_2 - \theta_1}, & \text{se } \theta_1 \neq \theta_2 ; \\ \operatorname{sen} \theta_1, & \text{se } \theta_1 = \theta_2, \end{cases}$$

onde θ_1 e θ_2 são os paralelos padrões, θ_0 o paralelo de referência (zero se for o equador) e ϕ_0 é a ascensão reta ou longitude central (o centro do mapa). Se $\theta_0 = \theta_1 = \theta_2 = 0$ então temos o caso limite da projeção cilíndrica *plate carrée* (descrita mais abaixo).

Por fim, a projeção cônica introduzida por Heinrich Christian Albers no início do século XIX projeta as áreas corretamente, mas introduz uma deformação na forma e escala.




Figura 1.35: Comparação de três projeções cônicas: Lambert (conforme), Cônica equidistante e Albers (áreas iguais). Todas mostram a mesma região da esfera celeste em coordenadas equatoriais centradas no polo sul, com paralelos padrões 25 S e 65 S. O equador celeste é alinhado em ciano, em magenta está representada a eclíptica e o equador galáctico em laranja.

Quando queremos representar toda a esfera celeste, as projeções mais comuns e convenientes são as cilíndricas ou as pseudo-cilíndricas (são baseadas nas cilíndricas, mas não são necessariamente perspectivas). A Fig. 1.36 mostra algumas das projeções usadas para todo o céu, usando sistemas de coordenadas equatoriais.

A projeção matematicamente mais simples é a **equiretangular** (também chamada de **equidistante**) que é expressa por:

$$\begin{cases} x = (\phi - \phi_0) \cos \theta_0 ; \\ y = (\theta - \theta_0), \end{cases} \quad \text{se o centro estiver na origem, } \theta_0 = 0 \text{ e } \phi_0 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = \phi ; \\ y = \theta, \end{cases}$$

onde a relação simplificada é chamada de projeção **plate carrée** (quadrado plano). Nesta projeção a distância entre as linhas (retas) de latitude e longitude são constantes, o ângulo entre latitude e longitude são sempre 90° no plano. Esta projeção não é conforme nem conserva a área. Contudo ela é útil para se armazenar imagens de esferas em uma matriz retangular simples.

A projeção de **Mercator** é semelhante à *plate carrée*, porém introduzindo uma divergência nos polos. Esta projeção foi introduzida por Gerardus Mercator (nascido em 1512 próximo de Antuérpia, na época nos Fladres) em 1569 e rapidamente adotado para cartografia da Terra. As vantagens da projeção de Mercator é que a transformação é conforme e as linhas de direção constante são retas (como vimos na seção 1.7.1). A projeção, em relação ao equador ($\theta_0 = 0$),




Figura 1.36: Exemplos de projeções de toda a esfera. O sistema de coordenadas é o equatorial (a linha ciano horizontal representa o equador celeste). Também estão representados a eclíptica (magenta) e o plano Galáctico (plano da Via Láctea em laranja). As estrelas mais brilhantes são mostradas junto com as linhas simbólicas das constelações.

é dada por:

$$\begin{cases} x = (\phi - \phi_0); \\ y = \ln \left[\tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right) \right], \end{cases} \quad \text{onde } \phi_0 \text{ é o meridiano de origem.}$$

As projeções **sinusoidal**, **Hammer-Aitoff** e **HEALPix** (*Hierarchical Equal Area isoLatitude Pixelation*)⁶ são exemplos de projeções pseudo-cilíndricas com a propriedade de conservarem a área, mas não serem conformes. Estas três projeções são usadas frequentemente para exibir algumas propriedades e mapas de toda a esfera celeste (distribuição de estrelas e/ou galáxias, mapas da emissão de hidrogênio neutro, etc.). A projeção HEALPix em particular é muito usada para codificar o mapa da Radiação Cósmica de Fundo. A transformação sinusoidal é particularmente simples no aspecto equatorial:

$$\begin{cases} x = (\phi - \phi_0) \cos \theta; \\ y = \theta. \end{cases}$$

Na projeção sinusoidal, as linhas de latitude são retas horizontais, uniformemente espaçadas.

⁶<https://healpix.sourceforge.io/>

Em 1859, o matemático francês Nicolas Auguste Tissot introduziu uma forma visual para avaliar as distorções produzidas pela projeção de uma esfera em um plano, que chamamos de **indicatriz de Tissot**. A ideia é ver como círculos infinitesimais na superfície de uma esfera são projetados no plano. Tissot mostrou que estes círculos podem ter apenas duas formas: ou continuam sendo círculos ou se alongam e se tornam elipses. Se os círculos da esfera permanecem círculos no plano então a projeção é conforme. Se os círculos se tornam elipses mas sua área é a mesma do círculo original, então trata-se de uma projeção de áreas iguais. É impossível que a projeção de uma esfera seja conforme e de áreas iguais em todo o plano de projeção simultaneamente.

Na prática, a indicatriz de Tissot é calculada e desenhada em todo o mapa (a indicatriz é ampliada para que possamos vê-la) para que seja possível visualmente avaliarmos as deformações introduzidas pela projeção. A Fig. 1.37 dá exemplos da indicatriz de Tissot para projeções azimutais, tanto de aspecto polar como equatorial.




Figura 1.37: Indicatriz de Tissot (elipses azuis) para projeções azimutais, em aspectos polar e equatorial. As linhas de latitude (declinação) e longitude (ascensão reta) estão em intervalos de 15° . O equador é a linha cheia vermelha. A projeção gnomônica é limitada em 76° e a estereoscópica em 110° para evitar deformações excessivas. A projeção ortográfica está limitada a 90° por construção (a projeção ortográfica pode mostrar no máximo metade da esfera, isto é, um hemisfério).

Podemos ver que a projeção estereoscópica é conforme (só há círculos) e nenhuma das três projeções ilustradas conservam a área. A projeção gnomônica causa grandes deformações longe do centro de projeção, porém os grandes círculos são sempre retas como, por exemplo, o equador celeste ou a eclíptica. Isto significa que qualquer reta traçada nesta projeção é uma geodésica, isto é, corresponde à distância mais curta entre 2 pontos da esfera.

2.1 Escalas de Medida de Tempo

2.1.1 Introdução

Desde a antiguidade, as medidas de tempo foram baseadas nos movimentos aparentes dos astros. Isto se deve ao fato de que estes movimentos são extremamente regulares e, em muitos casos, facilmente observáveis. Foi somente no século **XX**, com o advento da física quântica, que as escalas de tempo passaram a serem baseadas em transições atômicas.

De qualquer forma, mesmo sendo o tempo padrão definido em termos da física atômica, as escalas de tempo que utilizamos ainda são baseadas nos movimentos da Terra, Sol e Lua. A rotação da Terra em torno do seu eixo, por exemplo, é praticamente uniforme e pode ser medido de maneira muito precisa observando-se o movimento aparente das estrelas.

2.1.2 Movimento e tempo

Historicamente, as medidas de tempo estão relacionadas com o movimento da Terra e dos astros. Muitas das unidades de tempo que usamos estão relacionadas a **ciclos astronômicos**. A escala básica de medida do tempo, baseada no período de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, é chamado *dia*. A definição precisa do dia depende do ponto de referência que se utiliza para medi-lo (como veremos mais abaixo, onde definiremos com precisão este e as demais escalas de tempo aqui apresentadas).

Temos também uma escala de tempo natural definida pelo período de rotação da Lua em torno da Terra, o *mês*. Novamente, a definição precisa de mês lunar depende de como medimos o período de translação da Lua, em relação às estrelas ou ao Sol. O mês pode ser dividido em quatro partes correspondendo as *fases da Lua* (Lua cheia, quarto minguante, crescente e Lua nova), definindo-se aproximadamente assim a *semana* (mas note que a semana não corresponde a um ciclo astronômico).

Finalmente, temos o período correspondente à translação da Terra em torno do Sol, o *ano*. Este pode ser ainda dividido em quatro, de acordo com as estações do ano (primavera, inverno, outono e verão).

2.1.3 Tempo sideral

O *dia sideral* é definido como o intervalo de tempo entre duas passagens consecutivas do ponto vernal, Υ , pelo meridiano do observador. Exceto por efeitos pequenos devido às flutuações na rotação da Terra, a *hora sideral local* é simplesmente o ângulo horário do ponto vernal (H , nas coordenadas horárias). A *hora sideral verdadeira* é o ângulo horário do equinócio verdadeiro da data, assim como a *hora sideral média* é o ângulo horário do equinócio médio da data (as definições de médio e verdadeiro neste caso estão relacionados à nutação como veremos na seção 3.2).

* * * * *
estrelas




Figura 2.1: Diferença entre dia sideral (uma rotação completa em relação às estrelas fixas) e dia solar (rotação em relação ao Sol). Rigorosamente, o dia sideral é definido em relação ao ponto vernal, Υ , contudo, em um período de 24 horas, o movimento do ponto vernal em relação às estrelas fixas pode ser desprezado em primeira aproximação.

Devemos notar que a definição de tempo sideral é feita em termos do ponto vernal e não utilizando as estrelas como referencial (veja a figura 2.1). Assim, exceto pelo movimento do ponto vernal em relação a um referencial inercial (devido à precessão dos equinócios), o dia sideral é uma medida direta da rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. O tempo sideral pode então ser determinado diretamente pelo movimento aparente dos astros na esfera celeste.

Para cada meridiano terrestre podemos definir uma *hora sideral local* que se relaciona com a *hora sideral de Greenwich* pela relação:

$$\text{tempo sideral local} = \text{tempo sideral de Greenwich} + \text{longitude}$$

onde a longitude é positiva se for medida à leste de Greenwich e negativa à oeste. Lembre-se que a longitude deve ser convertida em unidade de tempo antes de ser somada ao tempo sideral de Greenwich (ou seja, se for dada em graus, devemos dividi-la por 15). A vantagem em se definir o tempo sideral a partir do meridiano de Greenwich é que existe uma relação empírica entre esta hora (ou simplesmente *tempo sideral*) e o tempo universal que será definido mais abaixo.

O dia sideral tem por definição 86.400 segundos de tempo sideral; em outras palavras podemos definir o *segundo de tempo sideral* como a fração $1/86.400$ do dia sideral. Como veremos a seguir, a definição de segundo varia segundo o sistema de tempo utilizado. Utilizando-se o segundo definido pelo sistema internacional de unidades (SI), o dia sideral tem aproximadamente $23^{\text{h}}56^{\text{m}}4^{\text{s}}0905$ ou 86164,0905 segundos.

Se, ao invés de definirmos o dia em relação ao ponto vernal, mas em relação às estrelas fixas, teremos o *dia estelar*. A diferença entre o dia sideral e estelar é de cerca de 0,0084 segundos. O dia estelar é ligeiramente mais longo que o dia sideral devido ao movimento retrógrado do ponto vernal em relação às estrelas.

2.1.4 Tempo solar, tempo universal e tempo civil

O tempo solar é baseado na rotação da Terra em relação ao Sol. Esta definição difere do tempo sideral, uma vez que a Terra tem um movimento de translação em torno do Sol ao mesmo

tempo em que gira em torno de si mesma (Fig. 2.1). É este movimento combinado que define o tempo solar. Assim, o tempo solar é baseado no *dia solar* que é equivalente à noção intuitiva que nós temos do dia, relacionado ao movimento diurno aparente do Sol.

Existem duas definições distintas de tempo solar:

tempo solar local aparente ou verdadeiro, dado pela posição aparente do centro do disco solar. Esta é uma medida de tempo muito irregular mas é a mais intuitiva; ela está diretamente relacionada ao tempo medido em um relógio de Sol. Está em desuso em astronomia desde 1965.

tempo solar médio, definido como o ângulo horário do *Sol médio* +12^h (para que o dia comece à meia-noite). O Sol médio é um objeto fictício que se move ao longo do equador celeste a uma velocidade uniforme, enquanto que o *Sol verdadeiro* move-se ao longo da eclíptica com um ritmo não uniforme (devido principalmente à elipticidade da órbita da Terra, à inclinação da eclíptica e as perturbações devido à Lua e aos planetas, cf. Fig. 2.2).




Figura 2.2: Diferença entre o *Sol verdadeiro* (aparente) e o *Sol médio*, que é aproximadamente a projeção do Sol aparente sobre o equador celeste. Para diferentes dias do ano, o Sol verdadeiro pode tanto estar atrasado em relação ao Sol médio (p.ex. 15/02) como adiantado (p.ex. 26/10). Por volta dos dias 16/04 e 12/06 a passagem meridiana de ambos coincidem. As horas sobre o equador celeste indicam o valor da ascensão reta aproximada naquele ponto. A figura corresponde a um observador no hemisfério Sul olhando exatamente para a direção Norte. O traço vertical corresponde ao meridiano local do observador.

Se nós marcamos a posição do Sol (verdadeiro) exatamente ao meio-dia civil (o momento da *passagem meridiana* do Sol médio, ou seja, o meio-dia marcado pelo relógio) durante todo um ano, veremos que estas posições do Sol traçam a figura na forma de um “oito” na esfera celeste, como mostra a Fig. 2.3. Esta figura é chamada de **analema**. De fato, podemos fazer esta experiência a qualquer momento do dia, o importante é usar a mesma hora local (hora legal, sem levar em conta a eventual horário de verão) durante o ano todo.

A construção de analemas pode ser generalizada para observadores na superfície de outros planetas, usando o mesmo princípio: observação do Sol verdadeiro a cada intervalo de dia solar local. Por exemplo, em Marte, o Sol seria observado a cada intervalo de 24^h39^m35^s (dia solar médio marciano). Neste caso, como mostra a Fig. 2.4 o desenho dos analemas seriam diferentes do analema terrestre. A forma do analema depende basicamente da inclinação do planeta em relação ao seu plano orbital (obliquidade) e da excentricidade de sua órbita, como veremos em seguida.




Figura 2.3: Esquerda: Analemas observáveis em São Paulo, a posição aparente do Sol verdadeiro (círculos laranjas), exatamente ao meio-dia civil (12h no relógio), ao amanhecer (7h30) e no final da tarde (17h) durante todo um ano (o primeiro dia de cada mês está indicado). Note que no verão, o Sol passa muito próximo do zênite. Direita: Analema de Oslo no hemisfério norte para comparação. Note que a trajetória aparente do Sol parece invertida. Por estar distante da região dos trópicos, o analema tem uma altura menor do que em São Paulo. A grade de linhas cinzas correspondem às coordenadas horizontais, com o zênite indicado no topo e a linha do horizonte local na parte inferior das figuras (o horizonte astronômico, um grande círculo de altura zero e o horizonte “geográfico”, com suas irregularidades).




Figura 2.4: Comparação de analemas que seriam observados nos planetas (no hemisfério norte do Sistema Solar). As escalas (A e h estão em graus (repare que as escalas são diferentes para cada planeta). A Terra, Marte Saturno e Netuno têm obliquidades semelhantes (e por isto apresentam o fenômeno de estações do ano de forma parecida). No eixo horizontal, 1 grau no azimuth corresponde a 4 minutos de defasagem entre o Sol médio e o Sol verdadeiro.

Equação do tempo

A diferença entre o tempo solar médio e o tempo solar aparente é conhecida como *equação do tempo*:

$$\text{equação do tempo} = \text{tempo solar aparente} - \text{tempo solar médio},$$

isto é, a equação do tempo é a diferença entre os ângulos horários do Sol verdadeiro e o Sol médio, descritos mais acima. Como o ângulo horário é $H = T_s - \alpha$ [veja Eq. (1.6), onde T_s é o *tempo sideral*], então a equação do tempo pode ser interpretada como a diferença entre a longitude do Sol médio e a ascensão reta do Sol verdadeiro ($L_{\odot} - \alpha_{\odot}$). Alguns autores adotam uma convenção com o sinal trocado para a equação do tempo (tempo médio menos o aparente).

A equação do tempo era muito usada para que a leitura de um relógio de sol desse a hora certa; sem a equação do tempo, um relógio de Sol adianta ou atrasa até cerca de 16 minutos, dependendo da época do ano.

A ascensão reta do Sol verdadeiro está relacionada com a longitude em coordenadas eclípticas pelas equações (1.15). Como a latitude eclíptica do Sol é praticamente zero (varia de alguns segundos de arco devido a perturbações), podemos tomar $\beta_{\odot} = 0$ e obtemos:

$$\tan \alpha_{\odot} = \cos \varepsilon \tan \lambda_{\odot}.$$

Introduzimos agora a chamada *Equação do Centro*, C , da seguinte forma:

$$C = \lambda_{\odot} - L_{\odot}.$$

A origem desta equação será discutida em detalhes posteriormente na Sec. 5.4.1. Substituindo a Eq. do Centro na equação do tempo temos:

$$\text{equação do tempo} = L_{\odot} - \alpha_{\odot} = (\lambda_{\odot} - \alpha_{\odot}) - C = -(R + C), \quad (2.1)$$

onde definimos $R = \alpha_{\odot} - \lambda_{\odot}$ a *Redução ao Equador*. Usando a equação de conversão entre coordenadas equatoriais e eclípticas, temos:

$$R = \arctan(\cos \varepsilon \tan \lambda_{\odot}) - \lambda_{\odot}. \quad (2.2)$$

A redução ao equador pode ser expressa por uma série, adequada para $\varepsilon \lesssim 0,5$:

$$R \simeq -\tan^2 \frac{\varepsilon}{2} \sin 2\lambda_{\odot} + \frac{1}{2} \tan^4 \frac{\varepsilon}{2} \sin 4\lambda_{\odot} - \frac{1}{3} \tan^6 \frac{\varepsilon}{2} \sin 6\lambda_{\odot} + \dots$$

Para obliquidade pequena, ainda pode ser feita a expansão em série das funções tangentes:

$$R \simeq -\left(\frac{\varepsilon^2}{4} + \frac{\varepsilon^4}{24} + \frac{17\varepsilon^6}{2880}\right) \sin 2\lambda_{\odot} + \left(\frac{\varepsilon^4}{32} + \frac{\varepsilon^6}{96}\right) \sin 4\lambda_{\odot} - \frac{\varepsilon^6}{192} \sin 6\lambda_{\odot} + \dots$$

A equação do centro também tem uma forma simplificada através de uma expansão em série para pequenas excentricidades. Isto é mostrado na Sec. 5.4.1 e aqui damos uma versão mais simples da Eq. (5.17):

$$C = \left(2e - \frac{1}{4}e^3\right) \sin M + \left(\frac{5}{4}e^2 - \frac{11}{24}e^4\right) \sin 2M + \left(\frac{13}{12}e^3\right) \sin 3M + \left(\frac{103}{96}e^4\right) \sin 4M, \quad (2.3)$$

onde M é a *anomalia média* que nada mais é que a representação do movimento médio de um corpo em uma órbita elíptica, $M = L_{\odot} - \varpi_{\odot}$ e ϖ_{\odot} é a longitude do perigeu (no caso, da órbita aparente do Sol na eclíptica).

Desta forma podemos ver que a equação do tempo tem duas componentes principais (Fig. 2.5). A redução ao equador, devido à obliquidade da eclíptica, faz com que, a cada 6 meses, o Sol verdadeiro (λ_{\odot}) ultrapasse o Sol médio (L_{\odot}) para, em seguida ser ultrapassado. Em outras palavras, o Sol verdadeiro oscila em torno do Sol médio com um período de 6 meses com uma amplitude $\tan^2(\varepsilon/2) \approx 9,9$ minutos (isto é, o Sol verdadeiro pode adiantar




Figura 2.5: Equação do tempo ao longo de um ano. A curva tracejada azul indica a contribuição pelo fato da órbita terrestre ser uma elipse; a curva verde indica a contribuição da inclinação do equador celeste (perpendicular ao eixo de rotação da Terra) em relação à órbita terrestre (a obliquidade da eclíptica). A soma destas duas componentes mais algumas perturbações lunares e planetárias, resulta na equação do tempo, mostrada aqui em minutos, em função do dia no ano. O painel de cima mostra a equação do tempo para os dias de hoje, o painel de baixo mostra para o ano 150 A.C., época do astrônomo grego Hiparco. A equação do tempo varia lentamente com o tempo, devido às variações da excentricidade e obliquidade.

ou atrasar em relação ao Sol médio até quase 10 minutos somente devido à obliquidade da eclíptica). Note que este efeito é puramente geométrico.

Além disto, a elipticidade da órbita terrestre também provoca uma oscilação do Sol verdadeiro em torno do Sol médio, mas com um período de um ano (este é um efeito dinâmico). Quando a Terra se encontra próxima do periélio sua velocidade é maior do que quando ela se encontra próxima do afélio. Isto se reflete na velocidade do movimento anual aparente do Sol, fazendo com que seu movimento não seja uniforme como o do Sol médio.

A soma das oscilações devido à obliquidade e à elipticidade (mais as perturbações lunares e planetárias, que são muito menores) resulta no comportamento observado da equação do tempo (Fig. 2.5). Quando projetamos esta diferença na esfera celeste obtemos os analemas (Fig. 2.3). O valor da equação do tempo deve ser somada à hora lida em um relógio de Sol para obtermos a hora que usamos, baseada no Sol médio.

Como a excentricidade da órbita terrestre e a obliquidade da eclíptica variam lentamente com o tempo, a forma da equação do tempo varia lentamente. Para algumas décadas a modificação é imperceptível na escala de menos de um minuto, porém quando comparamos a equação do tempo, por exemplo, da época do astrônomo grego Hiparco com a equação do tempo de hoje a diferença é notável (Fig. 2.5, painéis de cima e de baixo).

Como a variação é lenta, usando apenas alguns termos da expansão em série da equação do tempo obtemos uma expressão adequada (dentro de algumas dezenas de segundos) para

um intervalo de tempo entre 1000 A.C. e 5000 D.C.:

$$\begin{aligned} \text{equação} &= (-7,6584 + 0,0192663T) \text{ sen}(6,24006 + 628,302T) + \\ \text{do tempo} &+ (9,8563 - 0,0112386T) \text{ sen}[9,790126 + 1256,664T + \\ \text{[em min]} &+ (0,06683215 - 0,00016813T) \text{ sen}(6,24006 + 628,302T)] , \end{aligned}$$

onde $T = (\text{JD} - 2451545,0)/36525$ (JD é o dia juliano, definido na Sec. 2.3).

Tempo universal

O *tempo civil*, a escala de tempo que utilizamos no nosso dia-a-dia, era até os anos 70 definido pelo tempo solar médio $+12^{\text{h}}$, para que o dia comece à meia-noite e não ao meio-dia. Atualmente, a definição precisa do tempo civil depende do tempo atômico (que veremos mais adiante) e não da rotação da Terra.

Chamamos de *Tempo Universal* (UT, do inglês *Universal Time*), o tempo civil de Greenwich. Historicamente, o UT era chamado GMT (do inglês, *Greenwich Mean Time* ou tempo de Greenwich médio). Apesar de ultrapassada, ainda hoje a notação GMT é utilizada em algumas áreas.

Podemos ainda corrigir o tempo universal levando em conta o movimento do polo geográfico em relação ao eixo de rotação da Terra (discutiremos este fenômeno na seção 3.3). O tempo universal assim corrigido é chamado UT1 (e o UT sem correção é as vezes chamado UT0).

A rotação da Terra é afetada também por efeitos periódicos ligados ao aquecimento diferenciado da atmosfera para cada estação do ano. Este efeito sazonal redistribui uma grande quantidade da atmosfera durante o ano o que provoca uma variação do momento de inércia total da Terra. Podemos então o tempo universal levando-se em conta esta variação sazonal da velocidade de rotação terrestre. Chamamos de UT2 o tempo universal que leva em conta esta correção (além da correção do movimento do polo).

2.1.5 Translação da Terra: ano

As escalas de tempo solar e sidereal são baseadas essencialmente no movimento diurno da esfera celeste, o dia. Podemos também definir unidades de tempo baseadas na translação da Terra em torno do Sol. Esta unidade, é claro, chama-se ano. Da mesma forma que o dia, vários tipos de ano podem ser definidos de acordo com o referencial adotado.

Ano sidereal

Chamamos de ano sidereal o intervalo de tempo de uma volta da Terra em torno do Sol em relação às estrelas fixas, veja Fig. 2.6. Este é o período para que a Terra percorra exatamente 360° em relação a um referencial fixo (supostamente inercial). O ano sidereal tem atualmente 365d 6h 9m 10s.

Do ponto de vista do observador terrestre, o ano sidereal é o tempo necessário para o Sol completar 360° sobre a eclíptica. Podemos então definir o *movimento médio do Sol*, n_{\odot} como:

$$n_{\odot} = 360^\circ/365,256366 \text{ dia} = 0,9856091 \text{ por dia} , \quad (2.4)$$

lembrando que este movimento aparente anual do Sol é no sentido direto (ascensão reta ou longitude eclíptica crescente).




Figura 2.6: Ano trópico (em relação ao Sol) e sideral (em relação ao ponto vernal, Υ). A diferença se dá devido ao movimento retrógrado do ponto vernal, causado pela precessão do eixo de rotação terrestre (trataremos disto mais adiante, na seção 3.2).

Nascimento heliacal Chamamos de nascimento *heliacal* quando um astro aparece logo acima do horizonte seguido imediatamente pelo Sol. Devido ao movimento anual aparente do Sol, a cada dia os astros nascem cerca de 4 minutos mais cedo e, assim, a cada dia após o dia do nascimento heliacal, vemos o astro mais tempo antes do nascer do Sol. A Fig. 2.7 ilustra o fenômeno do nascimento heliacal.




Figura 2.7: Nascimento heliacal de Sirius para um observador em São Paulo. No painel de cima, o Sol nasce um pouco antes da estrela Sirius. Neste dia, Sirius não é observada, ofuscada pelo Sol. Alguns dias depois (painel de baixo) Sirius nasce antes do Sol e pode ser observada por alguns instantes. O dia em que Sirius é observada pela primeira vez é o dia do seu *nascimento heliacal*.

O nascimento heliacal depende da localização geográfica do observador, a diferença pode ser de várias semanas. Comparando com o exemplo da Fig. 2.7, um outro observador no Cairo, Egito, observa o nascimento heliacal de Sirius apenas no dia 26/07 em 2008, mais de mês após o observador de SP.

Há uma variação lenta da data em que ocorre o nascimento heliacal de um astro devido à precessão dos equinócios (discutido na Sec. 3.2). Tomando novamente o exemplo de um observador no Egito, por volta do ano 2000 A.C. o nascimento heliacal de Sirius era por volta do dia 9 de julho.

A observação do nascimento heliacal de estrelas (próximas da eclíptica) permite a determinação empírica da duração do ano sideral. Foi desta forma, inclusive utilizando a estrela Sirius, que os antigos egípcios determinaram a duração do ano há mais de 4000 anos.

Ano trópico

O *ano trópico* é o intervalo médio de tempo entre duas passagens consecutivas do Sol pelo ponto vernal, γ . O nome vem do fato do Sol completar uma oscilação completa entre os trópicos de Cancer e Capricórnio, isto é, o Sol está sempre entre os trópicos.

Quando o Sol se encontra no ponto vernal sua declinação é zero (pela própria definição do ponto vernal). No dia em que o Sol está no ponto vernal, o dia e a noite têm aproximadamente 12 horas cada, e por isto, esta data é chamada de *equinócio* (de Outono no hemisfério Sul e de Primavera no hemisfério Norte). Aproximadamente 6 meses depois, o Sol cruza novamente o equador celeste no ponto oposto ao ponto vernal e temos novamente um equinócio (de Primavera no hemisfério Sul, de Outono no Norte). Entre os equinócios de Outono e Primavera (do hemisfério Sul) a declinação do Sol atinge um máximo para, seis meses depois, atingir um mínimo. Estes extremos são chamados de *solstício* (de Verão no hemisfério Sul quando a declinação é mínima, de Inverno no hemisfério Sul quando a declinação é máxima). Estes quatro pontos são chamados *estações* e definem (como diz o nome) o início das estações do ano. Por sua definição, o ano trópico corresponde à nossa noção intuitiva de ano, como sendo o tempo necessário para que as estações do ano se repitam.

Como o ponto vernal se move em relação às estrelas fixas (devido à precessão dos equinócios, como veremos em detalhes na seção 3.2), o ano trópico difere ligeiramente do ano sideral. O ano trópico tem atualmente uma duração de 365d 5h 48m 45s (ou 365,24219 dias), sendo um pouco mais curto que o ano sideral, já que o ponto vernal tem um movimento retrógrado. Devido às irregularidades do movimento da Terra, tanto da precessão e nutação como da translação, a duração do ano trópico varia como mostra a Fig. 2.8.

Devido a esta variação, é mais conveniente definir o ano trópico em termos do movimento médio do Sol ao longo da eclíptica, de forma que um ano é o intervalo de tempo necessário para o Sol médio percorrer 360° . A duração deste movimento médio varia lentamente com o tempo da seguinte forma, baseada em J. Laskar, por sua vez baseado em Simon Newcomb:

$$\text{ano trópico} = 365,24218967 - 6,1536 \times 10^{-5}t - 7,29 \times 10^{-8}t^2 + 2,64 \times 10^{-7}t^3 \text{ dias}, \quad (2.5)$$

onde $t = (\text{JD} - 2451545.0)/365250$ é medido em *milênio juliano* e JD é o dia juliano, veja Eq. (2.8) na seção 2.3.

Ano anomalístico

Como a órbita da Terra é uma elipse, também podemos definir um ano como o intervalo entre duas passagens da Terra pelo periélio. Este ano é chamado anomalístico e tem uma duração de 365d 6h 13m 53s, sendo um pouco mais longo que o ano sideral devido à precessão da órbita terrestre (que é no sentido direto e não retrógrado como o movimento do ponto vernal).




Figura 2.8: Variação da duração do ano trópico em minutos em relação ao valor médio de 365,24219 dias, medido entre duas passagens consecutivas do Sol pelo ponto vernal, levando em conta efeitos de precessão e nutação (veja Sec. 3.2).

Atualmente, a Terra passa pelo periélio por volta do dia 3 de janeiro, e pelo afélio por volta do dia 5 de julho (veja a tabela 5.6 na página 157).

O *ano anomalístico* aparece naturalmente quando resolvemos o chamado problema de Kepler (dois corpos ligados gravitacionalmente) para o sistema Sol–Terra.

Ano draconiano

A órbita da Lua também define um grande círculo na esfera celeste. Assim como a intersecção do equador celeste com a eclíptica definem dois pontos precisos (nos equinócios de março e setembro), a intersecção da projeção da órbita lunar na esfera celeste e a eclíptica também definem dois pontos de referência, os nodos ascendente e descendente. O intervalo entre duas passagens do Sol pelo *nodo ascendente* define o *ano draconiano*, cuja duração média atual é aproximadamente 346,62 dias.

O ano draconiano está relacionado com o ciclo de recorrência das eclipses (uma vez que os eclipses apenas ocorrem quando o Sol e a Lua estão próximos dos nodos ascendente ou descendente), correspondendo a 1/19 do ciclo de saros (isto será visto na seção 4.10).

O nome “draconiano” vem de dragão, pois havia uma lenda em que um dragão vivia próximo dos nodos e de vez em quando tentava comer o Sol ou a Lua (durante os eclipses).

2.1.6 Translação da Lua: mês

Da mesma forma que a translação da Terra define o ano, a translação da Lua em torno da Terra deu origem ao *mês*. Devemos notar, contudo, que o movimento da Lua é extremamente complexo e as irregularidades no seu movimento muito mais importantes do que, por exemplo, o movimento de translação terrestre.

Mês sinódico

O *mês sinódico* ou *lunação* é, por definição, o intervalo de tempo entre duas configurações idênticas e sucessivas, por exemplo duas “Luas Novas” (quando a Lua se encontra entre a Terra e o Sol) ou duas “Luas Cheias” (quando a Lua se encontra em oposição). O mês sinódico corresponde portanto ao intervalo entre duas fases iguais da Lua, veja Fig. 2.9. O mês sinódico tem atualmente uma duração média de 29,53059 dias (29 dias, 12^h44^m2^s9).




Figura 2.9: Mês sinódico (em relação ao Sol) e sideral (em relação às estrelas fixas). O traço espesso (azul) representa o movimento na Lua no espaço (totalmente fora de escala...).

Devido à complexidade da órbita lunar, em razão da perturbação da Terra, dos planetas e do Sol, da excentricidade e da inclinação de sua órbita, a duração real do mês sinódico pode variar de ± 7 horas em torno do valor médio (Fig. 2.10). As lunações mais longas ocorrem quando a Terra está próxima do periélio e as lunações mais curtas quando a Terra está próxima do afélio. Entre 1850 e 2150 as lunações mais curtas (sempre em junho) são em: 1885 (29d 6h 33,7m), 2053 (29d 6h 35,0m), 1903 (29d 6h 35,3m), 2071 (29d 6h 35,6m), 1876 (29d 6h 35,9m). As lunações mais longas (em dezembro): 1973 (29d 19h 54,9m), 2150 (29d 19h 54,5m), 1955 (29d 19h 54,0m), 2132 (29d 19h 51,3m).




Figura 2.10: Duração de uma luação (mês sinódico, período entre duas luas novas) em um período de 200 anos. No eixo à direita é mostrada a variação em horas em relação ao período médio de luação.

É o mês sinódico que deu origem ao mês utilizado nos calendários (a recorrência das fases da Lua).

“Super Lua”, “Mini Lua” e “Lua Azul” Alguns termos referentes à Lua tem se popularizado e geralmente ganham algum destaque nos meios de comunicação.

A chamada *“Super Lua”* corresponde à Lua Cheia quando ela se encontra próxima do perigeu e, portanto, tem um tamanho aparente maior e um brilho maior que na maioria das vezes. Como o tamanho aparente é proporcional ao quadrado da distância e tomando a distância média da Lua como 384.399 km, a área aparente da Lua é cerca de 14% maior quando esta está próxima do perigeu (os menores valores do perigeu são em torno de 356.500 km).

Uma *“Mini Lua”* é o inverso, a Lua Cheia ocorre próxima do apogeu e, conseqüentemente, o tamanho aparente da Lua e seu brilho são menores. A Fig. 2.11 mostra alguns dos fenômenos de super e mini Lua utilizando um corte arbitrário (cerca de 140 km do perigeu e apogeu, respectivamente). No intervalo entre 1916 e 2116, as maiores Super Luas são de 14/02/1930, 25/11/2034 e 06/12/2052.




Figura 2.11: Datas da ocorrência de “Mini Lua” (painel acima) e “Super Lua” (painel abaixo) em um intervalo de tempo de 200 anos. O ponto preto indica a data e distância da Lua à Terra.

“*Lua Azul*” é o nome que se dá à segunda Lua Cheia em um dado mês. Como o período sinódico é menor que a duração de um mês (exceto Fevereiro), é possível ocorrer uma Lua Cheia no início do mês e outra Lua Cheia no final. O “azul” do nome não tem nenhuma relação com a cor da Lua, é apenas um nome, talvez derivado do termo em inglês, *blue moon*.

Mês sideral

O *mês sideral* é o período de translação da Lua em relação a um referencial fixo. A duração média de um mês sideral é de 27,3217 dias. A diferença com o mês sinódico se explica pelo fato deste depender de uma composição dos movimentos da Terra e da Lua (Fig. 2.9).

O mês sideral é exatamente igual (com uma precisão de 0,1 segundos) ao “dia” sideral lunar, isto é, o período de rotação da Lua em torno dela mesma. É por esta razão que sempre vemos a mesma face da Lua (na realidade vemos cerca de 59% da superfície lunar devido às perturbações solar e planetárias, além da inclinação relativa da órbita lunar).

Ciclo de Meton

O filósofo e astrônomo **Meton de Atenas** descobriu no século V A.C. que o período de 19 anos (trópicos) ocorriam 235 lunações (meses sinódicos). Em outras palavras, o período $19 \times 365,24219 = 6939,60$ dias é muito próximo de $235 \times 29,5306 = 6939,69$, isto é uma diferença da ordem de 2 horas em 19 anos. Este período de 19 anos, ou 6040 dias, é chamado de *Ciclo metônico*.

Isto significa que a cada 19 anos as fases da Lua caem aproximadamente no mesmo dia do ano. Por exemplo, nos anos 1959, 1978, 1997, 2016, 2035, 2054 tem uma Lua Cheia que ocorre no dia 20/06. Após alguns ciclos de 19 anos, o excesso de 2 h faz com que a fase da Lua não aconteça exatamente na mesma data do calendário. Além disto, temos os *anos bissextos* que introduzem uma descontinuidade na contagem dos dias e as lunações que podem variar de algumas horas de mês para outro. Assim, o mais frequente é que haja uma pequena variação de um dia para mais ou para menos em torno do ciclo de Meton, como ilustra a tabela 2.1.

2.1.7 Tempo dinâmico

O *tempo dinâmico* (TD) é a variável independente que aparece nas equações de movimento dos corpos celestes. Na física newtoniana a escala de tempo dinâmico é absoluta (invariante

Tabela 2.1: Exemplo do ciclo de Meton e a recorrência da mesma fase da Lua nas mesmas datas (aproximadamente) a cada 19 anos.

Ano	Data da Lua Cheia (UTC)					
1960:	13/01,	12/02,	13/03,	11/04,	11/05,	09/06
1979:	13/01,	12/02,	13/03,	12/04,	12/05,	09/06
1998:	12/01,	11/02,	13/03,	11/04,	11/05,	10/06
2017:	12/01,	11/02,	12/11,	11/04,	10/05,	09/06
2036:	13/01,	11/02,	12/03,	10/04,	10/05,	08/06
2055:	13/01,	11/02,	13/03,	11/04,	11/05,	09/06

para qualquer observador). Contudo, segundo a teoria da relatividade, o tempo dinâmico depende do sistema de coordenadas utilizado. Assim defini-se o *tempo dinâmico terrestre*, TDT, referente à Terra, e o *tempo dinâmico baricêntrico*, TDB, referente ao baricentro do sistema solar (aproximadamente o centro do Sol). A menos que se queira uma precisão muito alta (inferior a um milissegundo) podemos admitir que $TDT = TDB = TD$.

Tempo Terrestre (antigo Tempo das Efemérides)

Já nos anos 1920 ficou claro que a escala de tempo baseada no dia solar sofria de muitas irregularidades devido à rotação terrestre, principalmente devido à diminuição progressiva da velocidade de rotação da Terra causado pelos efeitos de maré luni-solar. A necessidade de uma escala uniforme levou ao desenvolvimento do *tempo das efemérides* (ET) nos anos 1940 e sua adoção em 1952, baseada nas equações de movimento dos planetas e da Lua. Para tanto, foi introduzido um fator de conversão entre o tempo universal e o tempo das efemérides, $\Delta T = ET - UT$.

Considerando-se, na época, que o ano tropical era mais significativo que o ano sideral, foi decidido em 1956 que a unidade fundamental de tempo seria o segundo definido como a fração $1/31.556.925,9747$ do ano tropical médio de 1900 (com início às 12h do dia 31 de dezembro, ou “0 de janeiro”). Para isto, foi utilizada a expressão de Newcomb que nos dá a longitude média do Sol em relação ao equinócio médio da data:

$$L = 279^\circ 41' 48'' 04 + 129.602.768'' 13T + 1'' 089T^2 \quad (2.6)$$

de onde o tempo em segundos para o Sol completar uma volta de 360° é:

$$\frac{360^\circ \times 60' \times 60''}{129.602.768'' 13} \times 36525 \text{ dias} \times 86400 \text{ s/dia} = 31.556.925,9747 \text{ s de efemérides.}$$

Na expressão (2.6), T é medido em séculos julianos, que será definido mais abaixo na seção 2.3.

A diferença entre o tempo universal (solar) e o tempo das efemérides, ΔT , não pode ser predita com precisão pois depende dos movimentos irregulares da Terra que só são conhecidas após as observações serem feitas, e comparando-se as posições preditas dos astros pelas teorias dinâmicas com as observações. Não podemos portanto prever o valor de ΔT para períodos superiores a alguns anos. Spencer Jones propôs a seguinte fórmula aproximativa:

$$\Delta T = 68,0 + 102,3T + 29,95T^2 + 1.821B \text{ (seg)}, \quad (2.7)$$

onde T medido em séculos julianos e B depende das irregularidades da rotação terrestre, não pode ser previsto e podendo chegar a dezenas de segundos em módulo. Os três primeiros termos do segundo membro da expressão (2.7) representam o movimento uniformemente acelerado de




Figura 2.12: $\Delta T = TT - UT$ (ou, antigamente, $ET - UT$, como será visto mais abaixo) em segundos. Os valores para os anos superiores a 2017 são previsões (pontos verdes) cujas incertezas são de cerca de 1 segundo para o ano 2020 e ~ 5 segundos para 2026. A parábola (linha contínua em cinza) representa o comportamento secular esperado quando consideramos vários séculos para o passado ou futuro. Fonte: *IERS Rapid Service/Prediction Center*

frenagem da rotação da Terra. Os valores medidos ou deduzidos de ΔT de 1600 a 2017 (além das previsões até 2026) são mostradas no gráfico 2.12.

A partir de 1984, passamos a utilizar o tempo dinâmico (TD) ao invés do tempo das efemérides (ET). Posteriormente, a partir de 1991, o TD passou a se chamar *Tempo Terrestre* (TT), usado até hoje. A escala de Tempo Terrestre é, na prática, uma continuação da escala de tempo das efemérides, porém sua definição depende do tempo atômico.

2.1.8 Tempo atômico

A definição do sistema de tempo atômico (TAI, *Tempo Atômico Internacional*) não está relacionado à astronomia mas sim à física atômica. O tempo atômico é baseado em uma transição hiperfina do Césio-133, correspondente a uma radiação em micro-ondas de cerca de 3,26 cm ou 9,19 GHz.

Até os anos 1920, não havia relógio tão estável como a rotação da Terra. Esta situação muda nas décadas seguintes. O primeiro relógio atômico de Césio foi construído em 1955 e, em 1958, após extensiva comparação com medidas astronômicas, foi estabelecido que um segundo de tempo equivale a 9.192.631.700 ciclos da frequência de transição hiperfina do nível fundamental do Césio. Em 1967, a unidade de segundo do Sistema Internacional de unidades deixa de se basear na rotação da Terra e é redefinido pela frequência de transição hiperfina do Césio.

Desde 1972, o TAI é utilizado oficialmente como escala de tempo padrão a partir do qual as outras escalas de tempo podem ser derivadas. A grande vantagem do TAI sobre o tempo dinâmico é que o TAI não depende da análise das observações dos movimentos dos astros e pode ser obtido imediatamente. Além disto, o TAI é determinado com uma precisão de 3×10^{-16} segundos, isto é, uma precisão de 1 segundo em 100.000.000 anos (um bom relógio comercial tem uma precisão de 1 segundo em alguns dias). Em um futuro próximo a precisão do TAI pode chegar a 2×10^{-18} segundos, isto é, 1 segundo em ~ 16 bilhões de anos (veja Fig. 2.13 para uma visão global da evolução da precisão da medida da passagem do tempo).




Figura 2.13: Evolução da precisão da medida do tempo. A partir do Séc. XIV, é mostrado de forma separada a evolução dos métodos baseados em observações astronômicas e através de relógios terrestres. Fonte: D.D. McCarthy, *Metrologia* 48, S132 (2011); W.A. Marrison, *Bell Sys. Tech. J.* 27, 510 (1948)

Em 1972, quando foi introduzido, a relação entre o TAI e o tempo das efemérides, ET, foi fixado da seguinte forma: $ET = TAI + 32,184 \text{ s}$; atualmente, utilizamos $TT = TAI + 32,184 \text{ s}$. Desta forma, a escala “TAI + 32,184” pode ser considerada como uma extensão da escala baseada no tempo terrestre (antigo tempo das efemérides).

Finalmente é importante notar que o segundo do tempo atômico foi definido de forma a ser idêntico à fração $1/31.556.925,9747$ do ano trópico de 1900. Isto é, um segundo do TAI foi fixado de forma a ser idêntico ao segundo médio medido em 1900, de acordo com a definição do segundo do Sistema Internacional feita em 1958.

Esta definição do segundo tem uma consequência importante quando comparado com o segundo baseado na rotação da Terra (em tempo universal) como veremos a seguir.

2.1.9 Rotação da Terra

Antes dos relógios atômicos, a rotação da Terra servia como base para medir a passagem do tempo. Em 1959, logo depois que o tempo atômico começou a ser utilizado (mas não ainda oficialmente), foi determinado precisamente a diferença entre o tempo medido pela rotação terrestre em relação a um referencial inercial (o dia sideral) e por transições atômicas.

A rotação precisa da Terra é complexa. Em primeiro lugar existe um efeito cumulativo que diminui a velocidade de rotação da Terra (Fig. 2.14). A primeira pista da frenagem da rotação da Terra veio da ponderação de Edmund Halley em 1695 de que os eclipses observados na Grécia antiga pareciam implicar em uma *aceleração aparente da Lua*. Este foi um enigma por cerca de 2 séculos. Em 1786, Laplace calculou que a aceleração aparente da Lua seria devida à variação da excentricidade da órbita da Terra porém, em 1853, John Couch Adams mostrou que este fenômeno não explicava completamente a aceleração aparente lunar. Dez anos depois, Simon Newcomb sugere que o efeito responsável pela aceleração aparente da Lua é a variação da rotação da Terra.

Este efeito de frenagem da rotação terrestre é principalmente devido ao efeito de maré causado pela Lua e, em menor parte, pelo Sol. Este fenômeno é análogo a uma colisão inelástica: o efeito de maré provoca um movimento dos oceanos que, devido ao atrito com o fundo do mar, dissipa a energia cinética de rotação da Terra mas, por outro lado, o momento angular total do sistema Terra–Lua e Terra–Sol, se conservam. Assim, a diminuição da velocidade de rotação da Terra implica em um **afastamento da Lua** em relação à Terra, de maneira a que o momento angular total do sistema se conserve. Atualmente, a Lua se afasta com uma velocidade média de 3,5 a 4,0 cm/ano.




Figura 2.14: Variação da duração do dia (definido como 86.400 segundos SI) em milissegundos. A reta inclinada ilustra o frenagem (variação secular) de 1,5 ms/dia/século.

Por outro lado, outros fenômenos contribuem à complexidade da rotação terrestre. Por exemplo, o movimento das placas (*tectônica de placas*), terremotos e fluxos de matéria no centro da Terra. A distribuição desigual das massas de terra e mar entre os hemisférios norte e sul, provocam um aquecimento diferente da atmosfera nestes hemisférios. Esta desigualdade provoca uma variação sazonal no momento de inércia terrestre (devido à dilatação da atmosfera) que atua na rotação da Terra (2.15).

Atualmente, a frenagem (desaceleração) da rotação terrestre é estimada em cerca de 1,5 a 2 milissegundos por dia por século. Isto significa que a duração do dia 1^o de janeiro de 2000 seria tipicamente cerca de 0,002 segundo mais longo que o dia 1^o de janeiro de 1900 (veja Fig. 2.14). Na realidade, o fenômeno é muito mais complexo, a Terra não é um objeto exatamente sólido, e a magnitude da variação do duração do dia pode também variar de vários milissegundos em alguns anos. Mas a tendência global da frenagem é de fato dada pelo valor supracitado.

Como o segundo atômico (igual a um segundo do Sistema Internacional) é baseado na duração do dia no ano 1900, hoje, quase um século depois, o dia baseado na rotação da Terra é, em média, cerca de 0,002 segundos mais longo. Isto significa que, em relação ao TAI, o tempo universal (UTC) perde 0,002 segundos por dia e, após cerca de 500 dias a diferença atinge cerca de 1 segundo. Isto *não* significa que a duração do dia esteja aumentando de 1 segundo a cada 500 dias; isto é uma consequência da definição do segundo do SI como idêntico ao segundo medido em 1900, então baseado na rotação da Terra.

2.1.10 Tempo universal coordenado e Tempo Legal (ou Civil)

A partir do tempo atômico internacional, definiu-se o *tempo universal coordenado*, UTC. UTC é simplesmente TAI mais um número inteiro de segundos de modo a que a diferença entre UTC e UT1 não seja nunca superior a um segundo.

A diferença entre UT1 e UTC (ou TAI) é simplesmente devido a frenagem da rotação da Terra e das definições de segundo no TAI e no UT. Como vimos, esta desaceleração está




Figura 2.15: Variações sazonais da duração do dia (definido como 86400 segundos SI) em milissegundos. A senoide no primeiro painel ilustra a variação anual (note que ela é assimétrica).

por volta de 2 milissegundos por dia por século atualmente. Este efeito é muito pequeno e só tem um efeito notável em intervalos de tempo geológicos. Além disto é muito provável que a frenagem era mais importante no passado que hoje.

Contudo, como vimos, atualmente o dia medido em tempo universal ganha cerca de 0,002 segundo (de TAI) por dia. Este efeito é cumulativo e a cada 400–500 dias (ou um ano e meio) aproximadamente a diferença entre UT1 e UTC chega a um segundo (Fig. 2.16). Disto vem a necessidade da introdução de um segundo a mais no ano. Este segundo é chamado *segundo intercalar* (em inglês, *leap second*). Por convenção, o segundo intercalar é sempre somado ao último segundo do mês de junho ou dezembro, quando necessário.




Figura 2.16: Diferença entre o UT1 e UTC em função do tempo. As descontinuidades correspondem à introdução de um segundo intercalar (as flechas indicam os últimos segundos intercalares).

A diferença entre o Tempo Terrestre (ou Tempo Dinâmico, antigo Tempo das Efemérides)




Figura 2.17: Diferença entre os tempos atômico e universal coordenado mais recentes. O fim do último intervalo ainda não é conhecido.

Intervalo de validade (0 ^h UT)	TAI-UTC (seg)
01/01/1990 a 01/01/1991 25
01/01/1991 a 01/07/1992 26
01/07/1992 a 01/07/1993 27
01/07/1993 a 01/07/1994 28
01/07/1994 a 01/01/1996 29
01/01/1996 a 01/07/1997 30
01/07/1997 a 01/01/1999 31
01/01/1999 a 01/01/2006 32
01/01/2006 a 01/01/2009 33
01/01/2009 a 01/07/2012 34
01/07/2012 a 01/07/2015 35
01/07/2015 a 01/01/2017 36
01/01/2017 a ?? 37

e o UT1 é dado atualmente da seguinte forma:

$$\Delta T \equiv TT - UT1 = 32,184 + (TAI - UTC) - (UT1 - UTC),$$

onde $(TAI - UTC)$ é o número de segundos intercalares acumulados (veja Fig. 2.17) e a diferença $UT1 - UTC$ pode ser visto na Fig. 2.16.

Tempo Legal. Atualmente o tempo civil ou tempo legal (que é utilizado no dia-a-dia) é definido a partir do UTC. Em geral o tempo civil em um dado país é simplesmente UTC mais (ou menos) um número de horas correspondente ao **fuso horário** local (Fig. 2.18).

Idealmente, o fuso horário deveria acrescentar 1 hora para cada 15 graus na direção leste de Greenwich e subtrair 1 hora para cada 15 graus na direção oeste. Por razões geográficas e, principalmente, políticas os fusos horários são adaptados regionalmente seguindo fronteiras ou divisões arbitrárias. Por exemplo, a Espanha encontra-se praticamente toda no fuso “0h” (o mesmo do Reino Unido), mas adota o fuso horário “+1h” (o mesmo da Alemanha). Em alguns países, o fuso horário não é um número inteiro (p.ex., Venezuela, Índia, centro da Austrália). Já a China, apesar de toda sua extensão tem apenas um fuso horário, o de Pequim.

No Brasil, é adotada a hora oficial de Brasília, que se encontra na longitude $47^{\circ}53' \simeq 47,883 \simeq 3,192$ h a Oeste de Greenwich. Assim, arredondando, adotamos UTC-3h para o fuso horário de Brasília.

No meridiano oposto ao de Greenwich, longitude 180° Oeste ou Leste, encontra-se a *linha de mudança de data*. Ao atravessarmos esta linha imaginária, em qualquer momento, mudamos de data: indo no sentido do Leste (do Ásia para a América, por exemplo) volta um dia no calendário. Viajando no sentido contrário, devemos acrescentar um dia ao atravessarmos a linha de mudança de data. Este fato foi usado no livro de Jules Verne, “A volta ao mundo em 80 dias”.

Devido a sua extensão territorial, entre 1913 e 2008, o Brasil era dividido em 4 fusos horários. A partir de abril/2008 passamos a ter 3 fusos: UTC-2h no arquipélago Fernando de Noronha e na ilha da Trindade; UTC-3h todo o litoral do Brasil, o Distrito Federal e os Estados interiores, exceto os Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre que seguem UTC-4h. Contudo, em outubro de 2013, o Brasil voltou a ser dividido em 4 fusos horários, de UTC-2h (dos arquipélagos do Atlântico) até UTC-5h (Acre e parte do Amazonas) como ilustra a figura 2.19.




Figura 2.18: Fusos horários legais no mundo. Como os fusos horários dependem de decisões políticas, este mapa deve ser atualizado de tempos em tempos. Quando passamos ao “horário de verão”, acrescentamos uma hora ao fuso horário local.




Figura 2.19: Fusos horários no Brasil desde outubro/2013. Nos estados próximos do Equador, não é adotado o horário de Verão. Pontualmente, alguns estados como Bahia e Tocantins, por exemplo, podem mudar sua política de adoção do horário de verão.

Chamamos de **Horário de Verão** quando somamos 1 h à hora oficial local entre meados da primavera e meados do verão, isto é, aproximadamente dois meses antes e dois meses depois do solstício de verão. O objetivo da introdução do horário de verão é reduzir o consumo de energia elétrica durante os meses em que as noites são curtas. Isto só ocorre em latitudes elevadas (em módulo), portanto estados do Brasil e países próximos da linha do Equador não costumam adotar o horário de verão.

2.2 Calendários

2.2.1 Introdução

Para podermos especificar quando um dado evento ocorreu ou quando ele está previsto, é necessário que tenhamos não apenas uma escala de tempo definida como também é preciso um sistema de contagem ou medida do tempo que passa. O fenômeno periódico mais simples de se observar é sem dúvida o ciclo dia-noite. Assim, por convenção, adotou-se o dia (solar) como unidade básica de medição da passagem do tempo, a *cronologia*.

Notemos que a palavra “*dia*” tem um duplo sentido: (I) pode se referir ao oposto de noite, isto é, o período dominado pela luz vinda do Sol; (II) pode se referir ao intervalo de tempo entre duas passagens do Sol pelo meridiano do observador, isto é, o período de rotação da Terra. Geralmente, distinguimos o significado de dia pelo contexto.

A solução mais simples para esta medida é escolhermos uma data arbitrária, a origem do sistema de medida e, em seguida, numerar os dias que passam. As datas anteriores ao início da origem podem ser referidas como dias ‘antes da origem’, por exemplo, ‘dia 1 Antes da Origem’, ‘dia 2 A.O.’, ‘dia 3 A.O.’, etc..., e os dias depois da origem podem ser chamados de ‘depois da origem’, ‘dia 1 Depois da Origem’, ‘dia 2 D.O.’, ‘dia 3 D.O.’, etc... Tradicionalmente, não existe ano zero: o ano anterior a 1 D.O. é 1 A.O. e não 0 D.O.

Para facilitar a contagem, podemos agrupar os dias em outras unidades maiores como semanas, meses, anos, etc. Assim como o dia, algumas destas unidades também têm origem astronômica.

É este sistema de contagem de dias, em geral a partir de uma origem arbitrária, que chamamos *calendário*. Os calendários que foram inventados ao longo da história humana suprem uma necessidade de praticamente todas as sociedades de prover um meio de ‘controlar’ a passagem do tempo. De uma certa forma, este controle do tempo dado pelos calendários servem como ligação entre a humanidade e os ciclos celestes; provavelmente por esta razão os calendários tiveram em várias sociedades um caráter místico-religioso, assim como tem um papel de identificação sócio-cultural (semelhante a um idioma). Desde a antiguidade, os calendários proporcionam a base para podermos planejar as mais diversas atividades individuais e sociais.

A história do desenvolvimento dos calendários é extremamente rica e mostra como o controle do tempo, traduzido pelo controle dos calendários, era um instrumento de poder fartamente utilizado desde o início da História até o Renascimento, quando a precisão exigida pelas medidas da passagem do tempo tirou definitivamente o controle dos calendários dos clérigos e nobres.

Atualmente existem cerca de 40 calendários em uso (e muitos outros extintos) dos quais cerca de meia dúzia são utilizados por praticamente toda a humanidade.

2.2.2 Base astronômica dos calendários

Desde a antiguidade, o movimento aparente dos astros nos serviu de referência para medirmos a passagem do tempo. Os principais ciclos astronômicos para este fim são: o **dia** (movimento diurno do Sol devido à rotação da Terra em torno de seu eixo), o **mês** (ciclo das fases da Lua devido à sua translação em torno da Terra) e o **ano** (translação da Terra em torno do Sol). A diversidade e complexidade dos calendários vêm do fato que estes ciclos não são comensuráveis entre si, além de não serem exatamente constantes, por exemplo, o ano trópico (sec. 2.1.5) não pode ser dividido em um número inteiro de dias solares (sec. 2.1.4) ou de meses sinódicos (sec. 2.1.6).

Os calendários que foram utilizados durante toda a história da humanidade podem ser divididos em três categorias principais:

lunar, onde a unidade fundamental é o mês, baseado na recorrência das fases da Lua;

solar, baseado na periodicidade das estações do ano;

luni-solar, onde é definido um ano solar (baseado nas estações do ano) que é subdividido em meses que têm aproximadamente o mesmo período que o mês sinódico.

Semana, um ciclo não astronômico

Notamos aqui que a *semana* é um ciclo artificial usado nos calendários, sem um ciclo astronômico correspondente. A semana corresponde a um período de 7 dias solares que se repetem indefinidamente. Nem os meses (com exceção de Fevereiro em anos não-bissextos) e nem os anos possuem um número inteiro de semanas.

A introdução de um período de 7 dias vem da Mesopotâmia, onde cada dia era dedicado a um dos astros com movimento aparente conhecido: dia da Lua, de Marte, de Mercúrio, de Júpiter, de Vênus, de Saturno e do Sol. Estes nomes ainda estão em uso (total ou parcialmente) em diversas línguas como, espanhol, francês, e inglês, por exemplo. O uso do ciclo de 7 dias foi disseminado a partir da Mesopotâmia por culturas bíblicas, judeus e, posteriormente, cristãos.

Durante a Idade Média, a igreja católica tentou mudar o nome dos dias da semana para algo menos pagão, distanciando o calendário dos deuses greco-romanos (por sua vez ligados aos planetas, Lua e Sol). Apenas em Portugal esta mudança teve sucesso e, por isto, os dias da semana seguem uma ordem numérica: segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. o nome Sábado vem do Hebreu, *Shabbat* – o dia do repouso –, e Domingo vem do Latim, *Dominica* – o dia do Senhor.

2.2.3 Calendário Egípcio

Os egípcios já usavam calendários há cerca de 6 mil anos atrás. O calendário egípcio daquela época era solar, baseado no início das cheias anuais do Nilo, tendo inicialmente 360 dias. Quando os egípcios passaram a utilizar a posição relativa da estrela Sirius em relação ao Sol, notou-se que eram necessários mais 5 dias (totalizando 365) na duração do ano. Posteriormente, com observações mais precisas, os egípcios concluíram que era necessário acrescentar um dia a cada 4 anos para compensar um lento deslocamento da posição do Sol: concluiu-se que a duração do ano era de 365,25 dias.

Diferente das culturas de climas temperados, os egípcios dividiam o ano em três estações: a estação da enchente do Nilo, a estação da semeadura, e a estação da colheita.

2.2.4 Calendário Romano

O calendário romano era de origem lunar, com um ano de 10 meses, baseados no ciclo lunar, com 30 ou 31 dias: martius, aprilis, maius, junius, quintilis, sextilis, september, october, november, december. Um ano tinha 304 dias. Cerca de 61 dias, durante o inverno, simplesmente não eram contados.

Posteriormente, o calendário romano foi reformado com a introdução de 2 meses suplementares após december: ianuarius e februarius. O número de dias nos meses passou a ser 29 ou 30 dias (o período sinódico da Lua sendo em média 29,53 dias). Um ano de 12 meses tinha, portanto, 354 dias. Havia então uma diferença de cerca de 11 dias entre o ano assim definido e o ano trópico. Para resolver este problema, os romanos introduziam a cada 3 anos um 13º mês. Infelizmente, este mês extra era introduzido de maneira em geral arbitrária e irregular.

Apesar disto, a origem da maioria dos meses que utilizamos até hoje são originários deste calendário.

2.2.5 Calendário Juliano

O calendário Juliano foi instituído em 46 A.C. (ou 708 AUC, *ab urbe condita* – “depois da criação de Roma”) por Júlio César seguindo o conselho do astrônomo Sosígenes de Alexandria para resolver as deficiências do antigo calendário romano. Este é um calendário de tipo solar, cujos meses tinham durações bem definidos. Os anos eram ‘normais’ com 365 dias ou “bissexto” com 366. A introdução de um dia a cada 4 anos tinha por objetivo manter o começo das estações do ano sempre na mesma data. Foi durante esta época, em que o calendário Juliano esteve em vigor, que os meses do ano que utilizamos até hoje foram definidos de maneira definitiva.

A origem do nome bissexto vem da forma romana de contar os dias do mês. Na introdução do calendário Juliano, foi estipulado que a cada quatro anos um dia a mais seria adicionado ao sexto dia que precedia as calendas de março (isto é, seis dias antes do início de março, ou seja dia 24 de fevereiro porque nesta época, fevereiro ainda tinha 30 dias). Por isso, haveria dois dias sextos, ou “bi-sexto”. Isto significa também que o dia extra em fevereiro não é dia 29 mas é o dia 24 que ocorre duas vezes. Hoje em dia, em vez de contar duas vezes o dia 24, acrescentamos um dia a mais no fim de fevereiro.

No Início da Idade Média, estabeleceu-se que a origem do calendário Juliano (o ano número “1”) seria o ano do nascimento de Jesus. O cálculo que foi feito pelo abade Dionysius Exiguus (Dionísio ou Denis, o Pequeno) colocava este nascimento em 753 AUC; o ano 754 AUC passa a corresponder a 1 AD, *anno domini*. Contudo, o cálculo de Dionysius estava historicamente errado, pois Jesus nasceu enquanto Herodes ainda estava vivo, mas este morreu em 750 AUC, ou seja, no ano 4 A.C.! Isto, é claro, é sem importância pois a origem dos calendários é arbitrária.


2.2.6 Calendário Gregoriano

O calendário Juliano foi um grande avanço em relação aos calendários precedentes. Contudo, no calendário Juliano, o ano tinha em média 365,25 dias, isto é, $(3 \times 365 + 366)/4$ enquanto que o ano trópico (que corresponde ao ciclo das estações do ano) tem aproximadamente 365,2422 dias. Isto significa que, a cada 128 anos o início da primavera (ou qualquer outra estação) adianta de um dia em relação ao calendário Juliano.

Se nos primeiros séculos, a diferença de alguns dias era imperceptível, no século **XVI** a diferença já atingia cerca de 10 dias. A primavera no hemisfério norte, isto é, a passagem do Sol pelo ponto vernal, Υ , começava no dia 10 ou 11 de março ao invés de 20 ou 21 de março (como nos primeiros séculos D.C.). Para a Igreja Católica isto era um problema grave, uma vez que a data da comemoração mais importante, a Páscoa, depende do dia do Equinócio de primavera (do hemisfério Norte).

Isto levou, em 1582, à adoção de um novo calendário – proposto por Aloysius Lilius e, posteriormente, por Cristóvão Clavius – oficializado pela Bula pontifícia “Inter Gravissimas” do papa Gregório **XIII** no Concílio de Trento. Para tanto, foram suprimidos por decreto os dias entre 4/10 e 14/10/1582, inclusive. A introdução do **ano bissexto** foi também modificada; a princípio, os anos múltiplos de 4 são bissextos mas os anos que são múltiplos de 100 e não são múltiplos de 400, não são bissextos. Assim, por exemplo, os anos 1980, 1996, 2000 são bissextos, mas 1700, 1800 e 1900 não o são.

Em resumo, um dado ano do calendário gregoriano será bissexto da seguinte forma:



Desta forma, o ano do calendário gregoriano tem, em média, uma duração de $365 + 1/4 -$

$1/100 + 1/400$ dias ou 365,2425 dias. A diferença com o ano trópico passa a ser 0,0003 dias por ano ou 1 dia a cada 3300 anos aproximadamente. Isto significa que o ano 4880 ou 4884 não deveria ser bissexto! Contudo, ao contrário do que alguns textos dizem, não existe uma regra para subtrair um dia a cada 3300 anos.

A origem (o ano número 1) do calendário Gregoriano é a mesma do calendário Juliano (e com o mesmo erro histórico...).

Notemos por último que o calendário gregoriano não foi adotado simultaneamente por todos em 1582. No início, o calendário foi adotado pelos países majoritariamente católicos (já que era um decreto papal), sendo adotado posteriormente e aos poucos pelos outros países. Vários países o adotaram somente no século **XX** (por exemplo a Turquia e a antiga União Soviética).

2.2.7 Calendário Judaico

O calendário Judaico, assim como o Babilônico, é luni-solar, meses de 29 e 30 dias que se alternam (semelhante ao calendário Romano) mais um mês adicional que é intercalado a cada 3 anos segundo um ciclo de 19 anos, o *Ciclo de Meton* (Sec. 2.1.6). A origem deste calendário é o dia da criação do mundo, em 3761 A.C., segundo o Velho Testamento (isto é, um dia arbitrário qualquer, já que a Terra se formou há 4,5 bilhões de ano e o Universo há mais de 13 bilhões).

2.2.8 Calendário Muçulmano

O Calendário Muçulmano (ou Islâmico) é lunar com 12 meses, e portanto, o início dos meses (e do ano) varia em relação às estações do ano. O início de cada mês é dado pelo dia em que se avista o quarto crescente da Lua após a Lua Nova. A origem deste calendário é o dia após a *Hégira*, o dia em que Maomé vai de Meca para Medina, em julho/622 D.C.. Por exemplo, o ano 1431 do calendário Muçulmano teve início em 18/dezembro/2009; o ano 1441 inicia em 01/setembro/2019.

Diferentemente do calendario Gregoriano, em que o dia começa à meia-noite, o dia no calendário Muçulmano começa no pôr do Sol.

2.2.9 Calendário da Revolução Francesa

Após a revolução francesa, a Convenção Nacional adotou em outubro de 1793 o chamado *Calendário Republicano*. O ano neste calendário começa no dia do equinócio de outono (do hemisfério norte) medido pelo Observatório de Paris (dia 22, 23 ou 24 de setembro). Assim, o ano 1 começou à meia-noite do dia 22/09/1792.

O ano é dividido em 12 meses iguais de 30 dias cada e, ao final dos 12 meses são acrescentados 5 dias (dias complementares), totalizando um ano de 365 dias. A semana de 7 dias é abolida e cada mês é dividido em 3 partes iguais de 10 dias. A cada 4 anos é acrescentado mais um dia aos 5 dias complementares, chamado de Dia da Revolução; este ano bissexto é chamado Sextile.

Os meses do calendário republicano têm nomes relacionados às estações do ano:

- Outono: Vendémiaire, Brumaire, Frimaire;
- Inverno: Nivôse, Pluviôse, Ventôse;
- Primavera: Germinal, Floreal, Prairial;
- Verão: Messidor, Thermidor, Fructidor.

O calendário republicano nunca foi adotado universalmente e foi abolido por Napoleão I em 01/01/1806 (11 nivôse do ano 14).

2.3 Dia Juliano

O uso de calendários tradicionais, com anos e meses de duração variável não é cômodo. O uso de calendários era incrivelmente mais complexa durante a idade média. No século **XVI**, o francês *Joseph Justus Scaliger* (1549–1609) procurou organizar as informações e uso de calendários em vigor desde a antiguidade. Em 1583, ele publica *Opus de emendatione temporum* no ano seguinte à reforma Gregoriana do calendário.

Nesta obra, Scaliger sugere o uso de um sistema contínuo para contagem dos anos com início no passado antes dos registros históricos. Para isto, ele usa três ciclos bem conhecidos do século **XVI**:

- **Ciclo solar:** é o ciclo do calendário Juliano em que os dias do ano caem no mesmo dia da semana (por exemplo, o dia 21 de março caindo num domingo). Devido aos anos bissextos, este ciclo tem $4 \times 7 = 28$ anos.
- **Ciclo metônico** ou “Ciclo áureo”, relacionado com a recorrência das fases da Lua aproximadamente no mesmo dia do ano. Este ciclo tem 235 lunações o que corresponde a um período de 19 anos (veja descrição na Sec. 2.1.6).
- **Ciclo de indicção** ou ciclo de impostos romanos. A *indicção* era usada desde o final da antiguidade pelo Império Romano do Oriente para ajustar os impostos anuais. O ciclo de indicção tinha 15 anos de duração.

A ideia de Scaliger foi combinar os três ciclos definindo um período de $28 \times 19 \times 15 = 7980$ anos onde cada ano poderia ser caracterizado de forma unívoca a cada ciclo. Este período foi chamado de *Período Juliano*, em razão da associação com o calendário Juliano (mas não devemos confundir o calendário instituído por Julio Cesar com o período definido por Scaliger).

Pela cronologia da época, Scaliger calculou que o início da contagem, correspondente ao ano 1 dos três ciclos, seria o ano 4713 A.C.. O ano de 1582 seria então o ano 6295 do Período Juliano, que irá terminar em 3267 e recomeçar em 3268. A relação com os ciclos solar, metônico e de indicção ficaria assim:

Ano:		4713 A.C.	1 A.C.	1 D.C.	1582	2000	2020	3267
Período Juliano:		1	4713	4714	6295	6713	6733	7980
ano no ciclo	solar :	1	9	10	23	21	13	28
	metônico:	1	1	2	6	6	7	19
	indicção:	1	3	4	10	8	13	15

Esta metodologia, contudo, não teve grande adesão na época. Apenas em 1849, o astrônomo inglês John Herschel começou a defender o uso de um sistema contínuo de contagem de tempo, não baseado em anos, mas em dias. Surgiu aí e popularizou-se o conceito de *dia juliano* ou *data juliana*.

Assim, para se contar os dias de um modo prático para a utilização nos cálculos astronômicos, foi criado um sistema onde os dias são contados de maneira consecutiva. Este sistema é chamado *dia juliano*, JD. Cada dia do calendário corresponde a um certo dia juliano. Por definição a contagem dos dias julianos, o dia 0 (zero), começa ao meio dia da segunda-feira de 1^o de janeiro de 4713 A.C. (extrapolando o calendário Juliano para o passado, ou na forma “astronômica” de contar os anos, -4712). Assim, por exemplo, o meio-dia de 1^o de janeiro de 2000 D.C. corresponde a JD 2.451.545,0 e a meia-noite de 13 de março de 1970 corresponde a JD 2.440.658,5.

Um outro exemplo, na descontinuidade entre o calendário Juliano e o Gregoriano (Sec. 2.2.6) a contagem de dias julianos permanece contínua. Assim, o meio-dia de 4/10/1582 (calendário Juliano) corresponde a JD 2.299.160,0 e o meio dia de 15/10/1582 (Gregoriano) corresponde

a JD 2.299.161,0. Ao contrário dos calendários utilizados habitualmente, a contagem de dias julianos não utiliza o conceito de meses ou anos.

Conversão calendário Gregoriano/Juliano para Dias Juliano. O cálculo do dia juliano para uma data qualquer é feito da seguinte forma (válida para $JD > 0$):

1. Suponha que a data seja dada pelo dia \mathcal{D} , mês \mathcal{M} e ano \mathcal{A} . O dia pode ser dado com decimais, por exemplo, o meio-dia do dia 13 é igual a 13,5. Os anos “A.C.” são contados de maneira matemática, isto é, 1 A.C. = 0, 2 A.C. = -1, 10 A.C. = -9, etc.
2. Se $\mathcal{M} = 1$ ou 2 , então $\mathcal{A} = \mathcal{A} - 1$ e $\mathcal{M} = \mathcal{M} + 12$; caso contrário tanto \mathcal{M} quanto \mathcal{A} permanecem o mesmo.
3. Se a data for posterior a 15/10/1582 (calendário Gregoriano) então calcule, $A_1 = \text{int}(\mathcal{A}/100)$ e $A_2 = 2 - A_1 + \text{int}(A_1/4)$.
Se a data for anterior a 4/10/1582 (calendário Juliano), então $A_2 = 0$.
4. Finalmente o dia juliano é:
 $JD = \text{int}(365,25 \times [\mathcal{A} + 4716]) + \text{int}(30,6001 \times [\mathcal{M} + 1]) + \mathcal{D} + A_2 - 1524,5$.

Conversão Dias Juliano para calendário Gregoriano/Juliano. Para calcularmos o dia do calendário, Gregoriano para depois de JD 2.299.160,0, Juliano antes disto, usamos o seguinte algoritmo:

1. Calcule $Z = \text{int}(JD + 0,5)$;
2. Se $Z < 2.299.161$ então $A = Z$, senão calcule $Y = \text{int}\left(\frac{Z - 1.867.216,25}{36524,25}\right)$ e, em seguida, $A = Z + 1 + Y - \text{int}(Y/4)$.
3. Agora calcule os seguintes números inteiros: $B = A + 1524$,
 $C = \text{int}([B - 121, 1]/365,25)$, $D = \text{int}(365,25 \times C)$, $E = \text{int}([E - D]/30,6001)$.
4. Calcule $F = JD - Z$, a parte fracionária do dia. Obtemos assim,
dia = $B - D - \text{int}(30,6001 \times E) + F$;
mês = $\begin{cases} E - 1 & ; \text{se } E < 14 \\ E - 13 & ; \text{se } E = 14 \text{ ou } E = 15 ; \end{cases}$
ano = $\begin{cases} C - 4716 & ; \text{se mês } > 2 \\ C - 4715 & ; \text{se mês } = 1 \text{ ou } 2 . \end{cases}$

Assim, por exemplo, o dia 01/01/2000 corresponde a JD 2.451.544,5 (o dia juliano começa ao meio dia, por isto o 0,5) ou JD 2.460.000,0 corresponde a 12h de 24/02/2023.

Século Juliano. Por definição, chamamos de *século juliano*, T , o intervalo de tempo igual a 36.525 dias. Em geral contamos os séculos julianos a partir de uma dada *época*. Ainda hoje encontramos as vezes T contados a partir do início do ano 1900 (mais precisamente o meio-dia de 31/12/1899, notado B1900.0), mas a época mais utilizada hoje em dia é a partir do início do ano 2000 (o meio-dia de 01/01/2000, ou J2000.0). Chamando de T_{B1900} os séculos julianos a partir de B1900.0 e T_{J2000} a partir de J2000.0 temos:

$$T_{B1900} = \frac{JD - 2.415.020}{36.525} \quad \text{e} \quad T_{J2000} = \frac{JD - 2.451.545}{36.525}. \quad (2.8)$$

Eventualmente, chamaremos T_{J2000} simplesmente de T , isto é, utilizaremos como época inicial o J2000.0. Analogamente ao século juliano, também podemos definir um *milênio juliano* de 365.250 dias.

2.4 Relação entre tempo sideral e tempo universal

Como vimos, o tempo sideral, T_s , é o ângulo horário do ponto vernal e está diretamente relacionado com o dia sideral terrestre (o período de rotação terrestre em relação ao ponto vernal).

O tempo sideral que corresponde a 0^h UT para um observador no meridiano principal (de Greenwich) é dado pela fórmula proposta em 1982 pela União Astronômica Internacional (UAI):

$$T_s = 6^{\text{h}}41^{\text{m}}50^{\text{s}}5484 + 8.640.184,812866 \times T_{\text{J2000}} + 0,093104 \times T_{\text{J2000}}^2 - 6,2 \times 10^{-6} \times T_{\text{J2000}}^3. \quad (2.9)$$

Para qualquer outra hora que não seja 0^h UT, multiplique a hora de tempo universal por 1,00273790935 e some com o resultado obtido utilizando a fórmula (2.9) para 0^h do dia em questão. Este fator, 1,00273790935, nada mais é que a razão entre o dia solar (24^h) e o dia sideral (23^h56^m4,0989^s).

Se quisermos calcular o tempo sideral local, devemos simplesmente acrescentar ou subtrair a longitude do local (como foi dito na seção 2.1.3).

2.5 Cálculo do domingo de Páscoa

A Páscoa é um evento religioso central no mundo cristão. A importância desta data é tal que desde o primeiro Concílio de Niceia (atual Turquia, a cerca de 100 km de Istambul) em 325 D.C. foram propostas regras para definir o cálculo do dia da Páscoa.

Com a reforma do calendário gregoriano foram fixadas a regra para determinação da Páscoa: o domingo de Páscoa é o primeiro domingo após a lua cheia que ocorre logo após o equinócio vernal (início do outono no hemisfério Sul). A regra não é aplicada de forma rigorosa em relação à astronomia, o equinócio vernal é fixado no dia 21/março (quando, na realidade, o equinócio vernal pode ocorrer até no dia 19/março e isto ainda depende do fuso horário adotado). Assim, o domingo de Páscoa só pode ocorrer entre os dias 22/março e 25/abril (inclusive). A figura 5.15 na página 155 mostra a frequência das datas do calendário em que ocorre o domingo de Páscoa no calendário Gregoriano. Os datas mais frequentes para o domingo de Páscoa são: 30/03, 05/04, 10/04 e 15/04 nos 3 mil primeiros anos do calendário Gregoriano. Contudo, usando um período muito maior, de 5,7 milhões de anos, a data mais frequente para a Páscoa é 19/04 segundo Jean Meeus.

Um algoritmo prático para calcular o dia e o mês do domingo de Páscoa foi proposto por J.-M. Oudin em 1940. Neste algoritmo, todas as variáveis são números inteiros de forma que, nas operações de divisão, desprezamos os restos (por exemplo, $17/4 = 4$, pois desprezamos o resto 0,25):

$$\begin{aligned} c &= a/100; & n &= a - 19 * (a/19); & k &= (c - 17)/25; \\ i &= c - c/4 - (c - k)/3 + 19 * n + 15; \\ i &= i - 30 * (i/30); \\ i &= i - (i/28) * (1 - (i/28) * (29/(i + 1)) * ((21 - n)/11)); \\ j &= a + a/4 + i + 2 - c + c/4; \\ j &= j - 7 * (j/7); & l &= i - j; \\ \Rightarrow & \begin{cases} m = 3 + (l + 40)/44; \\ d = l + 28 - 31 * (m/4), \end{cases} \end{aligned}$$

onde o dia é d e o mês é m do domingo de Páscoa no ano a . Por exemplo, para o ano $a = 1963$ temos:

$$\begin{aligned}
c &= 1963/100 = 19 ; & n &= 1963 - 19 * (1963/19) = 6 ; & k &= (19 - 17)/25 = 0 ; \\
i &= 19 - 19/4 - (19 - 0)/3 + 19 * 6 + 15 = 138 ; \\
i &= 138 - 30 * (138/30) = 18 ; \\
i &= 18 - (18/28) * (1 - (18/28) * (29/(18 + 1)) * ((21 - 6)/11)) = 18 ; \\
j &= 1963 + 1963/4 + 18 + 2 - 19 + 19/4 = 2458 ; \\
j &= 2458 - 7 * (2458/7) = 1 ; & l &= 18 - 1 = 17 ;
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} m = 3 + (17 + 40)/44 = 4 ; \\ d = 17 + 28 - 31 * (4/4) = 14 , \end{cases}$$

isto é, o domingo de Páscoa foi no dia 14/abril/1963. Na página 155 estão as datas do domingo de Páscoa entre 1990 e 2049.

Como a igreja católica ortodoxa ainda usa o calendário Juliano, que não é uma aproximação tão boa quanto o calendário Gregoriano para o ano Trópico, sua comemoração da Páscoa se dá geralmente 2 semanas após a data calculada pelo método acima.

2.6 Radiação solar e Insolação

A fim de ilustrar o uso de vários conceitos ligados à passagem do tempo, estações do ano e coordenadas astronômicas e geográficas iremos calcular a potência da radiação incidente na Terra. *Insolação* é o fluxo de radiação solar (energia por unidade de tempo e por unidade de área) que atinge a Terra. A potência total do Sol é $L_{\odot} = 3,84 \times 10^{26}$ Watt. por comparação, em 2012, a potência elétrica produzida no Brasil foi de $6,5 \times 10^{10}$ Watt.

O Sol está a cerca de 1 AU de distância (a distância varia ao longo do ano devido à excentricidade da órbita terrestre), logo o fluxo recebido no topo da atmosfera terrestre em um plano perpendicular aos raios solares é:

$$C_{\odot} = \frac{L_{\odot}}{4\pi(1 \text{ AU})^2} = 1365 \text{ Watt/m}^2 .$$

Este valor é chamado *Constante Solar*. Na literatura, encontramos o valor da Constante Solar entre 1361 a 1366 Watt/m².

O energia recebida no topo da atmosfera depende da posição do receptor (latitude), posição aparente do Sol e distância entre a Terra e o Sol. O Sol nem sempre está no zênite, portanto temos um efeito geométrico a considerar (Fig. 2.20).




Figura 2.20: O fluxo solar, f , depende da inclinação relativa da posição do Sol. Quando o Sol não está no zênite (direita) o fluxo coletado se dilui por um fator $\cos\theta = \cos(90^\circ - h)$, onde h é a altura do Sol. Por exemplo, se $h = 0$, o fluxo coletado é nulo.

A órbita da Terra não é exatamente um círculo, mas uma elipse atualmente com excentricidade $e = 0,0167$. Dentro de um intervalo de ± 4000 anos, a excentricidade da órbita terrestre é dada por:

$$e = 0,01670862 - 4,2037 \times 10^{-5}T - 1,236 \times 10^{-7}T^2 + 4 \times 10^{-11}T^3,$$

onde T é o intervalo de tempo medido a partir de J2000 em séculos julianos (de 36.525 dias, veja Sec. 2.3). Devido à excentricidade a distância Terra-Sol varia e, conseqüentemente, a insolação varia proporcionalmente ao quadrado da distância:

$$F_{\odot} = C_{\odot} \left(\frac{1 \text{ AU}}{r} \right)^2 \cos(90^{\circ} - h), \quad (2.10)$$

onde r é a distância entre o Sol e a Terra em unidades astronômicas¹ e aqui já levamos em conta a altura do Sol, ou o ângulo zenital, $\theta \equiv (90^{\circ} - h)$. A insolação, Eq. (2.10) depende da posição do Sol e do observador através das variáveis h e r .

Usando a transformação de coordenadas horizontais para coordenadas horárias, Eq. (1.20), temos a relação:

$$\begin{aligned} \text{sen } h &= \text{sen}(90^{\circ} - \theta) = \text{sen } \delta \text{sen } \phi + \cos \delta \cos \phi \cos H \\ \Rightarrow \quad \cos \theta &= \text{sen } \delta \text{sen } \phi + \cos \delta \cos \phi \cos H, \end{aligned}$$

onde ϕ é a latitude do observador, δ e H são a declinação e o ângulo horário do Sol.

Portanto, temos a insolação:

$$F_{\odot} = C_{\odot} \left(\frac{1 \text{ AU}}{r} \right)^2 (\text{sen } \delta \text{sen } \phi + \cos \delta \cos \phi \cos H),$$

onde r é medido em Unidades Astronômicas (AU).

Usando agora a relação entre as coordenadas eclíptica e equatorial, Eq. (1.15), nós temos para o Sol:

$$\text{sen } \delta = \text{sen } \varepsilon \text{sen } \lambda, \quad (\text{assumindo } \beta = 0),$$

onde $\varepsilon = 23^{\circ}439$ é a obliquidade da eclíptica (inclinação do eixo de rotação da Terra), e λ é a longitude do Sol.

Para a longitude do Sol, podemos aproximar seu movimento como uniforme ao longo de um círculo (não estamos preocupados com uma precisão de horas aqui). Logo, o movimento médio do Sol ao longo da eclíptica é simplesmente:

$$\lambda(t) = \frac{2\pi}{P} t \quad (\text{em radianos}),$$

onde P é o período de translação da Terra (1 ano $\approx 365,2422$ dias) e t é o tempo. Em $t = 0$, $\lambda = 0$, isto é, o Sol está no ponto vernal (por volta de 20/março).

A distância Terra-Sol é obtida pela equação de uma elipse (primeira lei de Kepler, veja Eq. (5.1):

$$r(t) = 1 \text{ AU} \frac{1 - e^2}{1 + e \cos \nu} \approx 1 \text{ AU} \frac{1 - e^2}{1 + e \cos[\lambda(t) - \omega]},$$

onde ω é a longitude do perigeu da órbita aparente do Sol, isto é, o periélio terrestre somado a 180° ($\approx 282^{\circ}5$) e ν é a *anomalia verdadeira*, medida a partir do perigeu. Em uma primeira aproximação, podemos tomar $\lambda = \nu + \omega$.

¹A Unidade Astronômica, AU, foi definida como o semi-eixo maior da órbita terrestre, com o Sol em um dos focos. 1 AU é aproximadamente a distância Terra-Sol. 1 AU = 149.597.870,7 km ou ~ 150 milhões de km.

Uma grandeza mais interessante do que o valor instantâneo de F_{\odot} é o valor médio da insolação durante um dia. Isto pode ser obtido integrando F_{\odot} entre o ângulo horário do nascer e do pôr do Sol. Por simetria, assumindo que as coordenadas do Sol (declinação e raio r) não variem significativamente durante um dia, podemos escrever:

$$\bar{F}_{\odot} = \frac{1}{2\pi} \int_{-H_d}^{+H_d} F_{\odot} dH = \frac{C_{\odot}}{\pi} \left(\frac{1 \text{ AU}}{r} \right)^2 \int_0^{+H_d} [\sin \delta \sin \phi + \cos \delta \cos \phi \cos H] dH.$$

(Os limites de integração são simétricos porque o meio-dia solar corresponde a $H = 0$.) Finalmente, temos:

$$\bar{F}_{\odot} = \frac{C_{\odot}}{\pi} \left(\frac{1 \text{ AU}}{r} \right)^2 [H_d \sin \delta \sin \phi + \cos \delta \cos \phi \sin H_d,] \quad (2.11)$$

onde H_d é o ângulo horário do nascer do Sol, isto é, quando a altura do Sol é $h = 0^\circ$ (veremos isto em mais detalhes na Sec. 3.5) Utilizando a transformação de coordenadas horárias em horizontais temos a relação

$$\cos H_d = -\tan \phi \tan \delta.$$

Aqui devemos apenas ter o cuidado no cálculo de H_d pois, além do círculo polar o Sol pode não se pôr (então $H_d = \pi/2$) ou o Sol pode não nascer ($H_d = 0$).

A figura 2.21 mostra a insolação média diária em função da época do ano e latitude, acima da atmosfera da Terra, usando as aproximações acima.




Figura 2.21: Insolação no topo da atmosfera em função da época do ano e da latitude. As linhas tracejadas horizontais marcam as latitudes dos trópicos de Câncer e Capricórnio e os círculos polares. As linhas tracejadas verticais mostram os momentos dos equinócios. A cor cinza é quando o Sol está abaixo do horizonte durante todo o dia.

Para calcular o valor médio anual, podemos somar a insolação média diária e dividir pelo período de um ano, $\bar{F}_{\text{anual}} = (\sum_{\text{dia}} F_{\odot})/365,24$. Obtemos assim a Fig. 2.22.

Fica claro que, como esperado, em média o equador terrestre recebe a maior quantidade de radiação solar. Entre os trópicos e os círculos polares a insolação decresce rapidamente. No Equador, em um ano, a taxa de insolação média é de $\sim 420 \text{ W/m}^2$ por dia, enquanto que no Polo Sul é apenas $\sim 180 \text{ W/m}^2$ e no Polo Norte, $\sim 170 \text{ W/m}^2$ por dia (a diferença é devido à Terra passar pelo periélio durante o Verão do Hemisfério Sul, veja Sec. 1.3.1).




Figura 2.22: Insolação média anual em função da latitude. Repare que o polo Sul recebe um pouco mais de radiação solar que o polo Norte devido à excentricidade da órbita terrestre. As linhas horizontais correspondem aos Trópicos de Câncer e Capricórnio, aos círculos polares e ao Equador.

Movimento, forma e perspectiva: Variação de coordenadas

3.1 Forma da Terra

A Terra não é uma esfera perfeita, mas, em primeira aproximação tem a forma de um elipsoide, “achatado” nos polos, Fig. 3.1. Mais precisamente, a forma da Terra pode ser aproximada por um elipsoide de revolução (a superfície descrita por uma rotação em torno do eixo menor de uma elipse) com um achatamento, $f \equiv 1 - b/a = 1/298,257223^1$, onde a e b são os raios equatorial ($a = 6.378.136,6$ metros) e polar respectivamente. Este achatamento se traduz em uma diferença de aproximadamente 21 km entre os eixos equatorial e polar. Além disto, o eixo de rotação da Terra (que é equivalente ao eixo menor do elipsoide) é inclinado em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol. Esta inclinação, ε , chamada *obliquidade da eclíptica*, é da ordem de $23^\circ 26' 21''$.




Figura 3.1: A forma da Terra pode ser aproximada por um elipsoide de revolução. A superfície de equipotencial (mesma aceleração da gravidade) define o *Geóide* que segue aproximadamente o nível do mar. Por fim temos a topografia da Terra com montanhas e vales acima e abaixo do Geóide.

Devido ao achatamento e à rotação da Terra, existem pelo menos três formas diferentes de se definir um sistema de coordenadas terrestres. Enquanto que a longitude é praticamente a mesma nos três sistemas, a latitude de um ponto na superfície terrestre é diferente segundo o sistema adotado.

A *latitude*, independentemente do sistema de coordenadas terrestre escolhido, é sempre medido a partir da “linha do equador” (ou melhor dizendo, do grande círculo do equador). Este é o grande círculo perpendicular ao eixo de rotação da Terra, e assim é definido de forma unívoca. A latitude é positiva ao norte do equador e negativa ao sul. Esta convenção sempre foi utilizada e nunca houve uma disputa quanto a isto.

Já para a *longitude*, a história é outra. As longitudes são medidas a partir de um meridiano principal mas como não existe um meridiano que se distingue dos outros, a definição de um meridiano principal é completamente arbitrária. Por exemplo, os franceses adotavam como meridiano principal o meridiano que passa pelo observatório de Paris, os norte americanos adotavam o meridiano de Washington, os holandeses, o meridiano de Amsterdam, os espanhóis o meridiano de Tenerife (Ilhas Canárias), e os portugueses o meridiano do Cabo de São Vicente (sul de Portugal). A adoção do meridiano de Greenwich como meridiano principal universal só

¹Valor do achatamento do elipsoide de referencia do padrão WGS-84 (*World Geodetic System*).

ocorreu em 1884 e, mesmo assim, alguns países ainda levaram algumas décadas para adotá-lo definitivamente.

3.1.1 Sistema astronômico de coordenadas geográficas

O sistema astronômico de coordenadas geográficas tem como plano fundamental o plano perpendicular ao eixo de rotação da Terra, definindo assim o *equador geográfico*. Para cada ponto na superfície terrestre, é definida ainda uma *vertical astronômica* que é a direção do zênite local, dado pela direção do campo gravitacional local, isto é, a vertical é aquela obtida com um fio de prumo (veja a figura 3.2).




Figura 3.2: Sistemas de coordenadas geográficas. A elipse representa um corte longitudinal do elipsoide de revolução que representa a Terra (o achatamento está aumentado para facilitar a interpretação da figura). O ponto c é o centro da Terra e ρ a distância de um ponto na superfície P ao centro. Os ângulos φ e φ' são as latitudes astronômicas e geocêntricas, respectivamente. O vetor \vec{g} representa o campo gravitacional local em P e Z é a direção do zênite

Como a Terra não é uma esfera perfeita, o prolongamento da vertical astronômica não passa pelo centro da Terra. O ângulo desta vertical com o plano do equador (ou o complemento do ângulo entre a direção do polo celeste com a vertical) define a *latitude astronômica* do ponto P .

3.1.2 Sistema geodético de coordenadas geográficas

A forma da Terra pode ser aproximada a um *geóide*. O geóide terrestre é a superfície de isopotencial gravitacional que coincide, em primeira aproximação, com o nível médio dos oceanos. A (pequena) diferença vem do fato que a distribuição de massas na Terra não é exatamente uniforme e, portanto, há pequenas diferenças entre o geóide e o nível médio dos mares. A superfície de isopotencial não é perfeita (e simples) como o elipsoide.

A diferença nas coordenadas geográficas determinadas no sistema astronômico e geodético é sempre inferior a alguns segundos de arco. As verticais do sistemas astronômico e geodético são praticamente as mesmas, a diferença é que a vertical do sistema geodético não é dada exatamente pela direção do campo gravitacional local. A diferença entre o geóide e o elipsoide de referência varia entre -108 (no Oceano Índico, ao sul da Índia) e $+85$ (na Indonésia) metros de altura.

É o sistema geodético de coordenadas que utilizamos para fins geográficos, atlas, mapas, etc.

3.1.3 Sistema geocêntrico de coordenadas geográficas

No sistema geocêntrico de coordenadas geográficas, também definimos o equador geográfico perpendicular ao eixo de rotação da Terra. Contudo, as *latitudes geocêntricas*, φ' , são definidas

pelo ângulo entre o raio vetor, ρ , de um ponto na superfície terrestre e o centro da Terra (cf. Fig. 3.2).

Enquanto que a latitude geodética, φ , é utilizada para se localizar pontos na superfície terrestre, é necessário, por outro lado, a latitude geocêntrica na astronomia de posição. A latitude geocêntrica é utilizada, por exemplo, para se corrigir o fato do observador estar sobre a Terra e não no centro, isto é, transformar um sistema de coordenadas geocêntrico em topocêntrico.

Assim torna-se necessário transformar as coordenadas geodéticas (ou astronômicas) habituais em coordenadas geocêntricas (e, é claro, realizar a transformação inverso caso necessário). Dado a simetria axial do problema, as transformações que nos interessam são somente nas latitudes, as longitudes sendo as mesmas nos dois sistemas. Podemos simplificar o problema e tratá-lo com duas dimensões apenas. Fazendo-se um corte longitudinal na superfície do geóide, ao nível do mar, nós temos a equação da elipse:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad (3.1)$$

onde a e b são os semi-eixos equatorial e polar da elipse e, pela trigonometria, os ângulos φ e φ' são:

$$\tan \varphi' = \frac{y}{x} \quad \text{e} \quad \tan \varphi = \frac{y}{x} \frac{a^2}{b^2}. \quad (3.2)$$

Substituindo a equação de φ na equação da elipse obtemos duas relações para x e y :

$$x^2 = \frac{a^2 \cos^2 \varphi}{1 - e^2 \sin^2 \varphi} \quad \text{e} \quad y^2 = \frac{a^2 (1 - e^2)^2 \sin^2 \varphi}{1 - e^2 \sin^2 \varphi}, \quad (3.3)$$

onde definimos a *excentricidade* da elipse como $e^2 \equiv 1 - (b/a)^2$. Mas, também podemos escrever uma elipse de forma paramétrica com as equações:

$$x = \rho \cos \varphi' \quad \text{e} \quad y = \rho \sin \varphi', \quad (3.4)$$

o que resulta, substituindo as equações precedentes nas equações (3.3), em:

$$\begin{aligned} \rho \cos \varphi' &= C \cos \varphi \\ \rho \sin \varphi' &= S \sin \varphi, \end{aligned} \quad (3.5)$$

onde, com um pouco de álgebra obtemos:

$$\begin{aligned} S &= \frac{a(1-e^2)}{(1-e^2 \sin^2 \varphi)^{1/2}} = (1-e^2) C \\ C &= \frac{a}{[\cos^2 \varphi + (1-f)^2 \sin^2 \varphi]^{1/2}} = \frac{S}{(1-f)^2}. \end{aligned} \quad (3.6)$$

Se o observador não estiver no nível do mar (isto é, sobre o geóide), mas tiver uma altitude a_{obs} , sendo $|a_{obs}| \ll \rho$, então as equações (3.5) podem ser escritas como:

$$\begin{aligned} \rho \cos \varphi' &= (C + a_{obs}) \cos \varphi \\ \rho \sin \varphi' &= (S + a_{obs}) \sin \varphi. \end{aligned} \quad (3.7)$$

Finalmente, a razão entre as equações (3.5) nos dá:

$$\tan \varphi' = \left(\frac{b}{a}\right)^2 \tan \varphi = (1-f)^2 \tan \varphi. \quad (3.8)$$

A diferença entre as latitudes geodéticas e geocêntricas, $\varphi - \varphi'$, é chamada *ângulo da vertical*. Desenvolvendo com relações trigonométricas o termo $\tan(\varphi - \varphi')$ obtemos a identidade:

$$\tan(\varphi - \varphi') = \frac{\tan \varphi - \tan \varphi'}{\tan \varphi \tan \varphi' + 1}, \quad (3.9)$$

e utilizando a equação (3.8) resulta em:

$$\tan(\varphi - \varphi') = \frac{[1 - (1 - f)^2] \tan \varphi}{(1 - f)^2 \tan^2 \varphi + 1} = \frac{m \operatorname{sen}(2\varphi)}{m \cos(2\varphi) + 1}, \quad (3.10)$$

onde definimos $m \equiv e^2/(2 - e^2)$. O ângulo da vertical pode ainda ser expandido em série, válido para $f \ll 1$

$$\varphi - \varphi' \simeq m \operatorname{sen} 2\varphi - \frac{m^2}{2} \operatorname{sen} 4\varphi + \frac{m^3}{3} \operatorname{sen} 6\varphi - \dots,$$

e aproximado simplesmente por:

$$\varphi - \varphi' \approx 692''{,}7262 \operatorname{sen} 2\varphi - 1''{,}1632 \operatorname{sen} 4\varphi + 0''{,}0026 \operatorname{sen} 6\varphi. \quad (3.11)$$

O ângulo da vertical é nulo nos polos e no equador, e atinge um valor máximo de cerca de $11'30''$ próximo da latitude de 45° (compare com a diferença entre os sistemas astronômico e geodético, onde a diferença é sempre menor que alguns segundos de arco).

Gravidade da Terra

Se a Terra fosse uma esfera sem rotação, a aceleração da gravidade seria simplesmente

$$g_0 = -\frac{GM}{r^2} = -9,78 \text{ m s}^{-2} \quad (\text{no nível do mar}),$$

onde o sinal de menos indica que a aceleração é em direção ao centro da Terra, r é o raio da Terra e M é a massa da Terra no interior da esfera de raio r .

Contudo, como vimos a forma da Terra é melhor aproximada por um elipsoide. A não esfericidade introduz uma dependência de \vec{g} com a latitude que, para elipsoides pouco achatados, pode ser aproximado por:

$$g = g_0(1 - f) \operatorname{sen}^2 \varphi' = g_0(1 - f) \operatorname{sen}^2 \varphi - \frac{f^2}{8} \operatorname{sen}^2(2\varphi),$$

onde as latitudes φ e φ' são os ângulos definidos na Fig. 3.2 e f é o achatamento do elipsoide.

Além disto, a Terra está em rotação o que produz no referencial terrestre uma força centrífuga de direção oposta à força gravitacional. Combinando o elipsoide e a rotação da Terra, podemos escrever a aceleração efetiva no nível do mar como:

$$g = -9,78033 \left[1 + 0,0053024 \operatorname{sen}^2 \varphi - 0,0000059 \operatorname{sen}^2(2\varphi) \right] \text{ m s}^{-2}. \quad (3.12)$$

Este resultado (com valores ligeiramente diferentes) foi obtido pela primeira vez por Alexis Claude Clairaut em 1743.

Também é comum encontramos a expressão obtida por Carlo Somigliana,

$$g = -9,78033 \left(\frac{1 + 0,00193185 \operatorname{sen}^2 \varphi}{\sqrt{1 - 0,00669438 \operatorname{sen}^2 \varphi}} \right) \text{ m s}^{-2}. \quad (3.13)$$

3.1.4 GPS

GPS é a sigla para *Global Positioning System* (Sistema de Posicionamento Global), controlado pelos EUA, e funcionando desde 1995. Este foi o primeiro *Sistema de navegação por satélite* (GNSS, *Global Navigation Satellite System*, em inglês), baseado na posição recebida na Terra por quatro ou mais satélites entre o total de 24 que estão distribuídos em seis trajetórias orbitais diferentes a 20.180 km de altitude (Fig. 3.3). A esta altitude, cada satélite dá uma volta completa em torno da Terra em $11^{\text{h}}58^{\text{m}}$, isto é, meio dia sideral.




Figura 3.3: Representação esquemática das 6 órbitas praticamente circulares, cada uma com 4 satélites GPS (para não sobrecarregar a figura, só aparecem 4 satélites). Todas as órbitas estão na mesma altitude e são inclinadas em relação ao equador com ângulo de $\approx 55^\circ$. Os nodos das órbitas estão distribuídos em intervalos de 60° ao longo do equador celeste (o círculo cinza espesso).

Além do sistema norte-americano, a Rússia tem um sistema semelhante de GNSS, o *GLONASS* (ГЛОНАСС, Sistema de Satélites para Navegação Global), com os primeiros satélites lançados em 1982. Com o fim da União Soviética o desenvolvimento do GLONASS sofreu atrasos em sua implementação completa. A partir de 2011 sua cobertura se tornou completamente global e atualmente funciona paralelamente ao sistema GPS (desde o início da década de 2010, muitos receptores captam os sinais do GPS e GLONASS).

A comunidade europeia está implantando um sistema próprio de posicionamento via satélite, chamado *Galileo*. Os primeiros satélites foram colocados em órbita em 2011 e começou a operar parcialmente em 2016. Este serviço deverá estar completamente operacional em 2020. O *Galileo* terá 24 satélites (mais 6 reservas) distribuídos em três órbitas a 23.222 km de altitude.

A China também desenvolveu seu próprio GNSS, o *BeiDou Navigation Satellite System* (BDS). Desde 2012, este sistema está em operação com 10 satélites. O BeiDou está ganhando uma nova geração de satélites que deverá estar em operação em 2020 com 35 satélites. BeiDou é o nome chinês do asterismo das 7 estrelas mais brilhantes da constelação da Ursa Maior (na Europa, este asterismo é conhecido como “panela”, “carruagem”, entre outros nomes).

Posicionamento com uso de GPS

Cada satélite GPS envia continuamente sua posição orbital e o momento em que estava nesta posição. Estes satélites possuem relógios com uma precisão de nanosegundo (10^{-9} segundos), necessário para que a precisão da medida seja de poucos metros na superfície da Terra.

Se um receptor capta o sinal de apenas um satélite podemos determinar a distância que estamos do satélite, $d = c\delta t$, onde δt é o intervalo de tempo entre a emissão e a recepção e c é a velocidade da luz. O receptor poderia estar em qualquer ponto de uma esfera de raio d centrada no satélite GPS. Com o sinal de 2 satélites, restringimos esta superfície à intersecção de duas esferas, um círculo como mostra a Fig. 3.4.




Figura 3.4: A intersecção de duas esferas é um círculo (em vermelho no painel a esquerda). A intersecção entre três esferas, se dá em 2 pontos. O usuário de um receptor GPS está em uma destas intersecções, captando o sinal de três satélites neste exemplo. O painel a direita mostra as pseudo-distâncias $c\delta t_i$ de cada um dos 4 satélites necessários para determinar a posição do observador, onde δt é o intervalo de tempo que o sinal leva para chegar no receptor.

Se captamos o sinal de três satélites temos duas soluções e podemos nos situar na superfície da Terra, pois uma das soluções pode ser descartada por estar longe da superfície terrestre (Fig. 3.4).

Contudo, existe um problema maior. Os relógios dos satélites GPS são muito precisos, porém os relógios dos receptores são, na grande maioria, muito menos acurados, o que prejudica a determinação das distâncias dos satélites. Um erro de microsegundos corresponde a uma incerteza de ~ 300 metros na posição do observador em relação aos satélites.

Para resolver este problema, precisamos da observação de um quarto satélite como veremos em seguida. A distância de um dado satélite i é:

$$d_i^2 = (x_i - x_0)^2 + (y_i - y_0)^2 + (z_i - z_0)^2,$$

onde (x_0, y_0, z_0) é a posição do observador em coordenadas cartesianas em relação ao centro da Terra e (x_i, y_i, z_i) são as coordenadas do satélite i . Por outro lado, a distância d_i também pode ser calculada por:

$$d_i = c(t_i - t_0 + t_c) = c(\delta t_i - t_c),$$

onde t_i é o momento em que o sinal é enviado do satélite, t_0 o momento em que o sinal chega no receptor (dado pelo relógio do receptor) e t_c é o erro do relógio no receptor em relação ao satélite. A distância calculada pela forma acima é chamada *pseudo-distância* (em inglês, *pseudo-range*, veja a Fig. 3.4, painel da direita). Igualando as equações acima para cada um dos 4 satélites obtemos um sistema de 4 equações:

$$\sqrt{(x_i - x_0)^2 + (y_i - y_0)^2 + (z_i - z_0)^2} = c(\delta t_i - t_c); \quad i = 1, 2, 3, 4, \quad (3.14)$$

onde as quatro incógnitas são as 3 coordenadas cartesianas da posição do observador e o erro no tempo, t_c . Por exemplo, suponha que um receptor GPS capte o sinal de 4 satélites com as seguintes coordenadas e momento de emissão:

	x_i	y_i	z_i		δt_i
Sat 1:	(17368,3,	17674,1,	-14422,1)	km;	0,0877270 seg
Sat 2:	(12981,8,	6081,11,	-24829,8)	km;	0,0935228 seg
Sat 3:	(11921,6,	25566,0,	5126,44)	km;	0,0934974 seg
Sat 4:	(18048,2,	18238,2,	-12792,9)	km;	0,0875838 seg

Resolvendo o sistema de 4 equações (3.14) obtemos duas soluções (isto porque as equações são quadráticas e admitem duas soluções):

	x_0 (km)	y_0 (km)	z_0 (km)	t_c (seg)	latitude	longitude	altitude (km)
solução 1:	(-6964,62,	-6983,8,	4286,51)	0,219056	41°29'04" N	134°55'16" E	4283,23
solução 2:	(4131,69,	4243,07,	-2607,55)	0,013500	23°45'48" S	45°45'43" O	0,00

Na tabela acima, as coordenadas cartesianas foram transformadas nas coordenadas polares usuais, longitude, latitude e altitude. Uma das soluções coloca o observador a mais de 4 mil km de altitude, mais de 10 vezes a altitude da *Estação Espacial Internacional* (ISS). Além disto, esta solução está do lado oposto do planeta, onde os satélites não poderiam ser observados. Assim, podemos descartar esta posição e a solução 2, portanto, deve ser a correta, onde o observador se encontra à beira mar na Barra do Una/SP.

3.2 Precessão e Nutação

Antes de vermos quais são as influências da precessão e nutação nas coordenadas dos astros, nós definiremos estes fenômenos e veremos quais são suas origens físicas.

3.2.1 Física da precessão e nutação

Como vimos, a Terra não é uma esfera perfeita e, além disto, seu eixo de simetria está inclinada em relação ao seu plano orbital (eclíptica) e ao plano orbital da Lua. A ação conjugada do Sol e da Lua no excesso de massa equatorial da Terra provoca um torque nesta. A figura 3.5 ilustra a ação de um corpo sobre o excesso de massa, δM , no equador terrestre. O torque é produzido pela diferença entre as forças $F - F_1$ e $F - F_2$. Esta diferença é $F_M = F - F_1 \approx G\delta M M_L/[1/r^2 - 1/(r - R_T)^2]$ e, quando $r \gg R_T$ podemos expandir δF em série de Taylor, o que resulta (mantendo apenas o primeiro termo da expansão) em:

$$F_M \approx G\delta M M_L \frac{2R_T}{r^3}. \quad (3.15)$$

Esta força F_M é chamada de força de maré pois é ela que produz as marés que observamos no mar.




Figura 3.5: Força de maré. O corpo de massa M_L atua sobre um elemento de massa δM . As forças F_1 , F_2 e F diferem devido ao fato do corpo principal ter um raio não nulo (R_T).

O efeito deste torque no eixo de rotação da Terra é o mesmo que ocorre com um pião cujo eixo de rotação não seja paralelo à vertical: o eixo de rotação gira em torno da vertical (no

caso da Terra, a vertical é o eixo perpendicular à eclíptica). Este efeito de giroscópio dá origem ao fenômeno da *precessão luni-solar*, já conhecido por Hiparco no século III A.C.

O período da precessão luni-solar é cerca de 25.700 anos, sendo que aproximadamente dois terços deste efeito é devido à Lua e um terço à ação do Sol. A ação do planetas, neste caso, é completamente desprezível pois, como vimos, este efeito é proporcional a M/r^3 (M é a massa e r a distância do corpo perturbador).

A precessão luni-solar tem um período muito superior ao período de translação da Terra e, por isto dizemos que é um efeito secular. Se as órbitas da Terra em torno do Sol e da Lua em torno da Terra fossem circulares e coplanares e, além disto a forma da Terra fosse um elipsoide de rotação perfeito, então a precessão luni-solar seria o único efeito notável sobre o eixo de rotação da Terra. Contudo, as condições supra citadas não são verificadas exatamente o que resulta em um movimento mais complexo do eixo terrestre em torno do polo da eclíptica. Por tradição separamos estes efeitos em duas partes: por um lado a precessão luni-solar (secular) que vimos anteriormente, por outro lado um efeito de período mais curto, mas de pequena amplitude, chamada *nutação*.

A nutação tem como efeito uma mini-precessão do eixo em torno de sua posição média cujo período é cerca de 18,61 anos (Fig. 3.11, mais adiante), sendo a Lua a principal responsável deste efeito. Na realidade, a nutação pode ser decomposta em várias centenas de termos periódicos, alguns com períodos da ordem de dias.

As órbitas dos planetas não são coplanares e, por esta razão, os demais planetas do sistema solar tem um efeito perturbador na órbita terrestre. Neste caso, não é o eixo de rotação da Terra que se move mas sim o plano da eclíptica (uma vez que este é definido pela órbita terrestre). Este efeito é chamado *precessão planetária*.

Finalmente, existe ainda um outro fenômeno que assimilamos à precessão, ligada à teoria da relatividade geral. Este efeito, muito menor que os precedentes, tem por origem o fato de que o referencial inercial na vizinhança da Terra (em órbita em torno do Sol) possui uma pequena rotação em relação ao referencial heliocêntrico inercial. Este fenômeno é chamado *precessão geodésica*.

3.2.2 Efeitos da precessão e nutação nas coordenadas

Na astronomia de posição, costuma-se tratar separadamente estes efeito nas coordenadas dos astros. A ação da Lua, Sol e planetas na inclinação do eixo terrestre e no movimento do eixo de rotação da Terra são divididos em três partes:

- Evolução secular da inclinação do eixo de rotação terrestre;
- Precessão geral, que inclui os termos seculares de grandes amplitudes devidos à precessão luni-solar, planetária e geodésica;
- Nutação, que inclui as variações periódicas de curta duração e pequena amplitude.

Evolução secular da obliquidade da eclíptica

Atualmente, a inclinação do eixo de rotação terrestre está diminuindo lentamente, isto é, a obliquidade da eclíptica, ε , diminui. O valor médio de ε é dado pela fórmula de J. Laskar válida para um intervalo de tempo de ± 10.000 anos a partir do ano 2000:

$$\begin{aligned} \varepsilon = & 23^{\circ}26'21''448 \\ & -4680''93 t - 1''55 t^2 + 1999''25 t^3 - 51''38 t^4 - 249''67 t^5 \\ & -39''05 t^6 + 7''12 t^7 + 27''87 t^8 + 5''79 t^9 + 2''45 t^{10}, \end{aligned} \quad (3.16)$$

onde $t = T/100$ e T é dado em séculos julianos a partir da época J2000, dado pela equação (2.8). O uso desta fórmula fora do seu período de validade dará resultados errados.

No início do Séc. XXI, $t \approx 0$, a taxa de variação da inclinação do eixo da Terra é de $-0''00128/\text{dia}$. Isto corresponde a cerca de 14,4 metros/ano no nível do mar. Isto significa que hoje em dia a linha imaginária dos Trópicos de Capricórnio e Câncer estão se aproximando do equador no ritmo de 1,44 km/século.

Em intervalos de tempo maior, o comportamento do eixo da Terra é oscilatório, sendo que a obliquidade da eclíptica varia aproximadamente entre 22 e 24,5 graus em um período de ~ 41.000 anos. A Fig. 3.6 mostra a variação da obliquidade em um intervalo de tempo de 2 milhões de anos, segundo cálculo de J. Laskar do *Bureau de Longitudes de Paris*.




Figura 3.6: Evolução da inclinação do eixo terrestre (obliquidade da eclíptica) em um intervalo de tempo de ± 1 milhão de anos a partir do presente. Podemos notar facilmente o ciclo de 41.000 anos de oscilação do eixo da Terra.

Precessão geral: rotação de coordenadas

A precessão também tem um efeito secular nas coordenadas. Por um lado, a precessão luni-solar produz uma rotação do eixo de rotação terrestre em torno do polo da eclíptica, fazendo com que o equador celeste (projeção do equador terrestre, perpendicular ao eixo de rotação) se mova em relação à eclíptica (veja figure 3.7).

Logo, a origem do sistema de coordenadas equatorial (e eclíptica) se move ao longo do grande círculo definido pela eclíptica.

Por outro lado, o efeito da precessão planetária é de alterar a orientação da órbita terrestre em torno do Sol em relação a um referencial fixo. Neste caso, é a própria eclíptica que precessa.

O principal efeito da precessão geral é um deslocamento retrogrado do ponto vernal em torno do polo da eclíptica com um período de ~ 25.700 anos ou cerca de $50''4$ por ano. Nas figuras 3.8 e 3.9 mostramos o percurso do polo celeste em torno do polo da eclíptica devido à precessão nos hemisférios Sul e Norte respectivamente.

O efeito total da precessão geral pode ser comparado a uma série de rotações tanto da eclíptica como do equador celeste, da mesma forma que quando fazemos uma transformação de coordenadas. Na realidade, o que fazemos aqui é uma transformação de coordenadas de uma época que tem a origem em um ponto vernal dado para outra época. Assim, em coordenadas eclípticas, seja λ_{t_0} e β_{t_0} a posição de uma astro em t_0 (isto é, no sistema de coordenadas definidas pela posição do ponto vernal em t_0), e λ_f e β_f a posição em t_f (que tanto pode ser antes ou depois de t_0). A relação entre estas coordenadas é (veja a figura 3.10):

$$\mathbf{R}_z([p_A + \Pi_A])\mathbf{I}(\beta_f, \lambda_f) = \mathbf{R}_x(\pi_A)\mathbf{R}_z(\Pi_A)\mathbf{I}(\beta_{t_0}, \lambda_{t_0}), \quad (3.17)$$




Figura 3.7: Efeito da precessão luni-solar no eixo de rotação da Terra e, conseqüentemente, no equador celeste. Na figura estão ilustrados o equador celeste em dois momentos T_1 e T_2 , mostrando o deslocamento do ponto vernal (γ , origem dos sistemas equatorial e eclíptico de coordenadas) sobre a eclíptica. Aqui, ‘PN’ significa polo norte celeste e ‘PE’ polo norte da eclíptica.




Figura 3.8: Trajetória do polo sul celeste em torno do polo sul da eclíptica devido à precessão (círculo vermelho). A volta completa leva cerca de 25700 anos.

o que resulta, após simplificação, em:

$$\begin{aligned}\cos \beta_f \cos(p_A + \Pi_A - \lambda_f) &= \cos \beta_{to} \cos(\Pi_A - \lambda_{to}) \\ \cos \beta_f \sin(p_A + \Pi_A - \lambda_f) &= \cos \beta_{to} \sin(\Pi_A - \lambda_{to}) \cos \pi_A - \sin \pi_A \sin \beta_{to} \\ \sin \beta_f &= \cos \beta_{to} \sin(\Pi_A - \lambda_{to}) \sin \pi_A + \cos \pi_A \sin \beta_{to},\end{aligned}\quad (3.18)$$

onde o ângulo Π_A é o arco $\widehat{\Upsilon_{to}N}$ e $p_A = \widehat{\Upsilon_f N} - \widehat{\Upsilon_{to}N}$.

A transformação em coordenadas equatoriais se faz utilizando as rotações:

$$\mathbf{R}_z([z_A + 90^\circ])\mathbf{I}(\delta_f, \alpha_f) = \mathbf{R}_x(\theta_A)\mathbf{R}_z(90^\circ - \zeta_A)\mathbf{I}(\delta_{to}, \alpha_{to}),\quad (3.19)$$

ou seja, após simplificação,

$$\cos \delta_f \cos(\alpha_f - z_A) = \cos \delta_{to} \cos(\alpha_{to} + \zeta_A) \cos \theta_A - \sin \delta_{to} \sin \theta_A$$




Figura 3.9: Trajetória do polo norte celeste em torno do polo norte da eclíptica devido à precessão (círculo vermelho).




Figura 3.10: Ângulos necessários para transformação de coordenadas de um instante t_0 a t_f devido à precessão geral (luni-solar e planetária). Definimos ainda $\zeta_A = 90^\circ - \widehat{\Upsilon_{t_0}Q}$ e $p_A = \widehat{\Upsilon_f N} - \widehat{\Upsilon_{t_0}N}$

$$\begin{aligned} \cos \delta_f \operatorname{sen}(\alpha_f - z_A) &= \cos \delta_{t_0} \operatorname{sen}(\alpha_{t_0} + \zeta_A) \\ \operatorname{sen} \delta_f &= \cos \delta_{t_0} \cos(\alpha_{t_0} + \zeta_A) \operatorname{sen} \theta_A + \operatorname{sen} \delta_{t_0} \cos \theta_A, \end{aligned} \quad (3.20)$$

onde $z_A = \widehat{\Upsilon_f Q} - 90^\circ$ e $\zeta_A = 90^\circ - \widehat{\Upsilon_{t_0}Q}$.

Nutação: coordenadas médias e verdadeiras

Contrariamente à precessão, que é um efeito secular de grande amplitude, a nutação corresponde a uma oscilação de curto período e pequena amplitude em torno de uma posição média (Fig. 3.11). Este efeito da nutação se traduz em uma oscilação da longitude e da obliquidade da eclíptica com período principal de cerca de 18,61 anos, e escrevemos as variações devido à nutação como $\Delta\psi$ e $\Delta\epsilon$, respectivamente. O valor de $\Delta\psi$ oscila entre $\pm 18''.5$ e $\Delta\epsilon$ entre $\pm 9''.8$ aproximadamente. Por ser muito menor que o efeito secular da precessão, a nutação só foi descoberta em 1747 por James Bradley.²

Quando corrigimos as coordenadas de um astro apenas utilizando os termos seculares da precessão e da inclinação da eclíptica, dizemos que as coordenadas são *médias*. Quando corrigimos também os efeitos periódicos da nutação, dizemos que as coordenadas são *verdadeiras*. Desta forma, em coordenadas eclípticas, a relação entre as coordenadas médias e verdadeiras se escreve simplesmente como:

$$\lambda_v = \lambda_m + \Delta\psi$$

²Publicada em Philosophical Transactions, 1748, vol. 45, p. 1.




Figura 3.11: Efeito da nutação. O eixo de rotação da Terra oscila (em vermelho) em torno de sua posição média (trajetória da precessão, em verde escuro). A direção de rotação da Terra está representada pela flecha azul clara. O efeito da nutação na figura está exagerado. O ângulo ε representa a obliquidade média da eclíptica na data.

$$\begin{aligned}\beta_v &= \beta_m \\ \varepsilon_v &= \varepsilon_m + \Delta\varepsilon,\end{aligned}\tag{3.21}$$

onde os índices v e m referem-se a verdadeiro e médio, respectivamente. Se quisermos as coordenadas equatoriais verdadeiras, devemos simplesmente utilizar as coordenadas eclípticas verdadeiras da Eq. 3.21 e realizarmos a transformação de coordenadas.

A teoria atual da nutação é baseada em um modelo geofísico da Terra complexo, levando-se em conta a elasticidade e não homogeneidade terrestre, além de um modelo detalhado dos movimentos relativos da Lua e da Terra em torno do Sol. Além do termo principal de período 18,61 anos, existem centenas de outros termos, com períodos de até alguns dias. Os principais períodos da nutação, além do principal são: 164,9, 13,55, 3399,2, 113,61, 13,58 e 9,084 dias.

Esta teoria nos dá os valores de $\Delta\psi$ e $\Delta\varepsilon$ com precisão de centésimos de segundo de grau para qualquer momento até cerca de quatro mil anos no futuro ou no passado (por exemplo, Fig. 3.12).




Figura 3.12: Variação da obliquidade ($\Delta\varepsilon$) e longitude ($\Delta\psi$) devido à nutação. A elipse azul representa o principal termo da nutação de 18,61 anos, com os semi-eixos indicados. A linha laranja mostra o efeito de usarmos também o 2º termo de 164,9 dias da nutação. Em destaque, abaixo, detalhe do movimento de nutação calculado com o modelo IAU2000A.

Desde 2006, a nutação é descrita pelo modelo IAU2000A que leva em conta a forma do geoide que descreve a Terra e os efeitos da atmosfera, oceanos e núcleo líquido (isto é, as componentes não sólidas da Terra). Além da Lua e do Sol, a ação dos planetas também é levada em conta. As constantes que descrevem a nutação, $\Delta\psi$ e $\Delta\varepsilon$ são dadas na forma de uma soma de mais de mil termos. Os principais são:

$$\begin{aligned}\Delta\psi = & -(17''2064161 + 0''0174666T) * \text{sen } \Omega - (1''3170906 + 0''0001675T) * \text{sen}(2[F - D + \Omega]) \\ & - 0''2276413 \text{sen}(2[F + \Omega]) + 0''2074554 \text{sen } 2\Omega + (0''1475877 - 0''0003633T) \text{sen } l' \\ & + 0''0711159 \text{sen } l - (0''0516821 - 0''0001226T) \text{sen}(l' + 2[F - D + \Omega]) \\ & - 0''0387298 \text{sen}(2F + \Omega) - 0''0301461 \text{sen}(l + 2[F + \Omega]) + \dots\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta\varepsilon = & (9''2052331 + 0''0009086T) \cos \Omega + (0''5730336 - 0''0003015T) \cos(2[F - D + \Omega]) \\ & + 0''0978459 \cos(2[F + \Omega]) - 0''0897492 \cos 2\Omega + 0''0224386 \cos(l' + 2[F - D + \Omega]) \\ & + 0''0200728 \cos(2F + \Omega) + \dots\end{aligned}$$

onde os argumentos das funções trigonométricas seno e cosseno são (aqui truncados em segunda ordem):

$$\begin{aligned}\Omega &= 450160''398036 - 6962890''5431T + 7''4722T^2; && \text{Longitude no nodo ascendente da Lua,} \\ D &= 1072260''70369 + 1602961601''2090T - 6''3706T^2; && \text{Elongação média entre a Lua e o Sol,} \\ F &= 335779''526232 + 1739527262''8478T - 12''7512T^2; && \text{Argumento da latitude média da Lua,} \\ l' &= 1287104''79305 + 129596581''0481T - 0''5532T^2; && \text{Anomalia média do Sol,} \\ l &= 485868''249036 + 1717915923''2178T + 31''8792T^2; && \text{Anomalia média da Lua,}\end{aligned}$$

e $T = (\text{JD} - 2451545.0)/36525$ é o número de séculos julianos desde J2000 (Sec. 2.3). As **anomalias**, definidas na seção 5.4.1, são ângulos que descrevem o movimento médio de corpos em órbita elíptica, medidos a partir do periastro.

3.3 Movimento do polo

Como vimos, a Terra não é uma esfera perfeita, mas sim um *elipsoide de revolução*. Isto implica que, se a direção do eixo de rotação não é exatamente a mesma que o eixo de simetria do elipsoide, então o eixo de rotação precessa em torno do eixo de simetria do elipsoide. Contrariamente à precessão e à nutação, este fenômeno é intrínseco da Terra, não dependendo da ação de outros astros.

Este efeito é pequeno e só foi medido pela primeira vez em 1891, apesar de que já havia sido previsto teoricamente desde o fim do século XVIII. A distância entre o polo definido pelo eixo de rotação instantâneo e o eixo de simetria nunca é superior a cerca de 20 metros, o que corresponde a alguns décimos de segundos de arco. Na figura 3.13 vemos o movimento do polo desde 1962 até primeiros meses de 2017 (indo da cor azul clara até vermelho na figura). A posição instantânea do eixo de rotação terrestre é dado em função de dois ângulos, X e Y , que são medidos em direção do meridiano de Greenwich e na direção do meridiano 90°W , respectivamente.

Este movimento é na realidade muito complexo devido à distribuição irregular de massas da Terra, além do fato da Terra não ser um corpo perfeitamente rígido. Os principais componentes deste movimento são um termo anual aproximadamente elíptica (devido à translação da Terra) e um termo aproximadamente circular com um período de ~ 435 dias, chamado *termo de Chandler*. Além disto, a posição média do polo se desloca sistematicamente (e lentamente) na direção 80° Oeste.




Figura 3.13: Movimento anual do polo terrestre (traço fino colorido, em unidades de milissegundo de arco, [mas]) determinado a partir das medidas feitas pelo IERS (*International Earth Rotation Service*). No polo, 100 mas ($0''1$) corresponde a aproximadamente 3 metros na superfície da Terra. O traço espesso mostra o movimento médio do polo em 55 anos e seu deslocamento sistemático em direção ao Canadá.

Devido à sua complexidade, não é possível prever com precisão a posição instantânea do eixo de rotação da Terra por mais do que alguns meses. O que pode ser feito com precisão é monitorar este movimento – isto é feito por colaborações internacionais coordenadas pelo “*National Earth Orientation Service*” (NEOS) e o “*International Earth Rotation Service*” (IERS).

A correção do movimento do polo é muito pequena, e ela é feita principalmente para corrigir o tempo universal (após a correção o tempo universal é chamado UT1).

3.4 Refração atmosférica

A *atmosfera terrestre* não é homogênea: a densidade da atmosfera diminui progressivamente a medida que a altitude aumenta. Como o índice de refração da atmosfera é função da densidade (quanto maior a densidade, maior o índice de refração), a luz de um astro sofre uma alteração em sua trajetória ao atravessar a atmosfera terrestre e esta alteração será função da altitude.

3.4.1 Aproximação de planos paralelos




Figura 3.14: Refração atmosférica na aproximação de planos paralelos. Os índices de refração variam de $n = 1$ (vácuo) a n_0 , o índice à altitude do observador, igual a 1,00028 ao nível do mar, a 0°C , para a luz visível (centro do filtro V , igual a 5500 \AA).

A figura 3.14 ilustra este fenômeno. Nós representamos a atmosfera como N camadas paralelas, cada uma com um índice de refração n_i . Nesta aproximação, nós desprezamos a curvatura da Terra, o que é válido apenas para direções próximas do zênite. Dado um astro cuja luz atinge a atmosfera com um ângulo z (ou seja, um astro de altura, $h = 90^\circ - z$), o raio luminoso é refratado pela atmosfera de forma que, na camada i , o ângulo com a vertical

será z_i e assim por diante até o observador que medirá um ângulo z_0 . Aplicando a lei de Snell-Descartes para camadas consecutivas temos:

$$\dots n_{i+1} \operatorname{sen} z_{i+1} = n_i \operatorname{sen} z_i = n_{i-1} \operatorname{sen} z_{i-1} \dots \quad (3.22)$$

Como $n = 1$ fora da atmosfera, podemos então deduzir que $\operatorname{sen} z = n_0 \operatorname{sen} z_0$, independentemente do número de camadas. Em outras palavras, este resultado é válido no limite de infinitas camadas ou de uma atmosfera contínua. Por outro lado, esta aproximação é boa apenas para astros que se encontram próximos do zênite. Para astros de altitude menor, é necessário levarmos em conta a curvatura terrestre e a aproximação de planos paralelos deixa de ser boa. Notemos também que a refração é *independente* do azimute do astro.

Se definirmos o *ângulo de refração*, (também conhecido como *refração astronômica*) $R \equiv z - z_0$, podemos escrever a lei de Snell-Descartes como:

$$n_0 \operatorname{sen} z_0 = \operatorname{sen} R \cos z_0 + \cos R \operatorname{sen} z_0 . \quad (3.23)$$

Para pequenos ângulos de refração, isto é, $R \ll 1$, podemos utilizar a aproximação $\operatorname{sen} R \approx R$ e $\cos R \approx 1$, o que implica em:

$$R = (n_0 - 1) \tan z_0 \text{ (radiano)} . \quad (3.24)$$

Assim, para $n_0 = 1,00028$ por exemplo, $R \approx 2,8 \times 10^{-4} \tan z_0$ radianos ou $R \approx 57''{,}8 \tan z_0$.

3.4.2 Fórmula geral da refração

Infelizmente a formula (3.24) só é válida para altitudes próximas de 90° . Para o caso geral, é necessário levarmos em conta a curvatura da Terra. A figura 3.15 representa este caso.




Figura 3.15: Refração atmosférica levando-se em conta a curvatura da Terra. A representação aqui é semelhante à figura 3.14 onde n é o índice de refração da atmosfera.

Utilizando a notação das figuras 3.14 e 3.15, a lei de Snell-Descartes nos dá, $n' \operatorname{sen} z' = n \operatorname{sen} \psi$ e, pelo triângulo CFE , nós temos $r' \operatorname{sen} \psi = r \operatorname{sen} w = r \operatorname{sen} z$ (pois $w = 180^\circ - z$). Assim, obtemos uma relação válida para qualquer camada:

$$r' n' \operatorname{sen} z' = r n \operatorname{sen} z . \quad (3.25)$$

Da mesma forma que para a aproximação de planos paralelos, podemos utilizar a relação acima até o observador resultando em

$$R_T n_0 \operatorname{sen} z_0 = r n \operatorname{sen} z , \quad (3.26)$$

onde R_T é o raio da Terra.

Calculemos agora a expressão (3.25) para duas camadas infinitesimais, isto é,

$$r n \operatorname{sen} z = (r + \delta r)(n - \delta n) \operatorname{sen}(z + \delta z) \quad (3.27)$$

onde lembramos que quando r aumenta o índice de refração n diminui. Desenvolvendo o produto acima e desprezando os termos cruzados de infinitesimais (como $\delta r \delta n$, por exemplo), obtemos

$$\frac{\delta z}{\tan z} + \frac{\delta r}{r} - \frac{\delta n}{n} = 0, \quad (3.28)$$

onde utilizamos $\operatorname{sen}(z + \delta z) = \operatorname{sen} z + \delta z \cos z$.

Utilizando o triângulo infinitesimal EFG , podemos escrever $\tan z = r \delta \theta / \delta r$, onde δr é o segmento GF e r é o segmento CG . Assim obtemos,

$$\frac{\delta z + \delta \theta}{\tan z} - \frac{\delta n}{n} = 0. \quad (3.29)$$

Introduzimos novamente o ângulo de refração R , a diferença entre o ângulo zenital aparente ($90^\circ - h$) e verdadeiro (medido fora da atmosfera). O ângulo de refração entre duas camadas infinitesimais é $\delta R = \alpha' - \alpha$, de acordo com a Fig. 3.15. Mas a diferença $\alpha' - \alpha$ é igual a $\delta z + \delta \theta$ (vendo que $\alpha = \theta + z$, θ sendo o ângulo do zênite ao segmento CF). Obtemos, então:

$$\frac{\delta R}{\tan z} = \frac{\delta n}{n} \quad (3.30)$$

Finalmente, utilizando a Eq. (3.26) podemos reescrever z em função de z_0 ,

$$\operatorname{sen} z = \frac{R_T n_0}{r n} \operatorname{sen} z_0 \Rightarrow \tan z = \frac{R_T n_0 \operatorname{sen} z_0}{\sqrt{r^2 n^2 - R_T^2 n_0^2 \operatorname{sen}^2 z_0}}, \quad (3.31)$$

e a Eq. (3.30) pode ser escrita em termos das quantidades referentes ao observador. Assim reescrevemos o termo $\tan z$ e transformamos as diferenças infinitesimais em diferencial e obtemos:

$$R = R_T n_0 \operatorname{sen} z_0 \int_1^{n_0} \frac{dn}{n \sqrt{r^2 n^2 - R_T^2 n_0^2 \operatorname{sen}^2 z_0}}, \quad (3.32)$$

onde os limites de integração são 1 fora da atmosfera e n_0 na camada do observador. Esta equação pode ser integrada, resultando em:

$$R = \arctan \left[\frac{\operatorname{sen} z_0}{\sqrt{\left(\frac{r}{n_0 R_T}\right)^2 - \operatorname{sen}^2 z_0}} \right] - \arctan \left[\frac{\operatorname{sen} z_0}{\sqrt{\left(\frac{r}{R_T}\right)^2 - \operatorname{sen}^2 z_0}} \right]. \quad (3.33)$$

Ao integrarmos a Eq. (3.32), nós consideramos a variável r constante; rigorosamente nós deveríamos levar em conta a dependência do índice de refração com a altura. Isto, contudo, é praticamente impossível dado o caráter dinâmico da atmosfera.

Podemos simplificar o problema da seguinte forma. Escrevemos o raio r como $r/R_T = 1 + s$, onde s é um número pequeno (a 65 km de altura a atmosfera já é tão tênue que a refração torna-se desprezível, o que corresponde a $s \sim 0,01$).

Além disto, introduzimos a quantidade α definida como $\alpha \equiv n_0 - 1$. Mesmo ao nível do mar, α é uma quantidade pequena, $\alpha \sim 3 \times 10^{-4}$.

Substituímos r e n_0 na expressão 3.33, para em seguida fazermos uma expansão de Taylor em s e em α , o que resulta em:

$$R = \frac{\alpha[1 - 2s + \cos(2z_0)] \sec^2 z_0 \tan z_0}{2}. \quad (3.34)$$

Com um pouco de trigonometria e álgebra podemos escrever esta expressão como:

$$R = \alpha(1 - s) \tan z_0 - \alpha s \tan^3 z_0. \quad (3.35)$$

Alguns autores conservam até termos contendo α^2 na expansão de Taylor da Eq. (3.33). Neste caso o ângulo de refração é dado por

$$R = \alpha(1 - s) \tan z_0 - \alpha \left(s - \frac{\alpha}{2}\right) \tan^3 z_0. \quad (3.36)$$

A fórmula acima é conhecida como *fórmula de Laplace* e, em geral é dada da seguinte forma:

$$R = \mathcal{A} \tan z_0 - \mathcal{B} \tan^3 z_0, \quad (3.37)$$

Para $z_0 \lesssim 75^\circ$, a fórmula de Laplace é razoavelmente precisa e os coeficientes são dados por $\mathcal{A} = 57''085$ e $\mathcal{B} = 0''067$, determinados empiricamente para condições normais de temperatura e pressão. Pode-se ver que, para pequeno z_0 , a fórmula (3.37) nos dá o resultado obtido na aproximação de planos paralelos (lembrando que $s \ll 1$).

Os coeficientes \mathcal{A} e \mathcal{B} dependem das condições atmosféricas pois o índice de refração depende da densidade (ou da pressão e temperatura) da atmosfera, assim como do comprimento de onda observado. Por esta razão, em geral o ângulo R é tabelado para um dado lugar em função da distância zenital. No horizonte ($z_0 = 90^\circ$) em geral é adotado um valor de $0^\circ 34'$ para o ângulo de refração.

Como α é proporcional à densidade da atmosfera, e s é proporcional à pressão atmosférica, costuma-se corrigir estas constantes da seguinte forma:

$$\alpha = \alpha_0 \frac{P}{101\,325} \frac{273,15}{T + 273,15} \quad \text{e} \quad s = s_0 \frac{T + 273,15}{273,15}, \quad (3.38)$$

onde s_0 e α_0 são os valores que correspondem às condições normais de temperatura e pressão. Na expressão acima P é a pressão em Pascals e T a temperatura em centígrados.

Para se levar em conta a variação do índice de refração com o comprimento de onda, utiliza-se a correção empírica seguinte:

$$R = R_0 \left(0,983 + \frac{0,00598}{\lambda^2} \right), \quad (3.39)$$

onde R_0 é o ângulo de refração em condições normais (isto é, $\lambda = 0,590\mu\text{m}$, que corresponde à cor amarela) e λ é o comprimento de onda em micrômetros. Entre a luz vermelha ($\lambda = 0,75\mu\text{m}$) e violeta ($\lambda = 0,4\mu\text{m}$), o ângulo de refração aumenta de cerca de 5%.

3.5 Nascer, pôr e crepúsculos

Devido à rotação diurna da Terra, os astros se levantam (ou nascem) no lado leste do horizonte e se põe no lado oeste (exceto é claro para os astros circumpolares). Se a declinação do astro for exatamente zero, então este astro se levanta na direção do leste geográfico e se põe no oeste. O mais notável destes eventos são o nascer e o pôr do Sol e da Lua.

Para os astros puntiformes (as estrelas e, em primeira aproximação, os planetas) o *nascer* e o *pôr* são definidos como o instante em que a altura h do astro é igual a zero. Para a Lua e

o Sol, que têm um diâmetro aparente da ordem de meio grau, o nascer e o pôr são definidos em relação à parte superior do disco aparente. É importante notar que, para todos os astros, o nascer e o pôr são definidos levando-se em conta a refração atmosférica.

Assim, utilizando as equações de transformação entre coordenadas horárias e horizontais, vemos que um astro se levanta (ou se põe) para um observador na latitude φ quando

$$\cos H = \frac{\sin h - \sin \varphi \sin \delta}{\cos \varphi \cos \delta}, \quad (3.40)$$

onde $h = -R - d/2$, R sendo o ângulo de refração no horizonte (em geral tomamos igual a $0^\circ 34'$) e $d/2$ é o semi-diâmetro do astro (para a Lua e para o Sol tomamos igual a $0^\circ 16'$ em primeira aproximação e, para os demais astros, igual a zero). A declinação aqui é verdadeira (corrigida da precessão e nutação). Se quisermos desprezar a refração atmosférica, tomamos $R = 0^\circ$.

A Eq. (3.40) admite em geral duas soluções ($\pm H$) que correspondem ao nascer e pôr do astro. Eventualmente podemos não ter nenhuma solução, isto é, $|\cos H| > 1$. Isto significa que o astro não se levanta nem se põe. Ele pode ser circumpolar ou estar sempre abaixo da linha do horizonte na latitude em questão.

O azimute do astro ao nascer ou se pôr é:

$$\cos A \cos h = \sin h \tan \varphi - \frac{\sin \delta}{\cos \varphi} \quad (3.41)$$

onde h é o mesmo da Eq. (3.40). O valor do azimute estará entre 0° e 180° no poente e entre 180° e 360° no nascer.

Uma vez calculado o ângulo horário pela Eq. (3.40), podemos calcular o tempo sidereal de Greenwich para $\pm H$, que corresponde ao pôr e ao nascer do astro, simplesmente com:

$$T_s = \alpha \pm H - \lambda \quad (3.42)$$

onde α é a ascensão reta do astro e λ é a longitude do observador (negativa a Oeste de Greenwich, positiva a Leste). Devemos agora calcular o tempo sidereal de Greenwich às 0h UT, T_{s0} , com a fórmula (2.9). O intervalo de tempo, medido em tempo sidereal, entre as 0h UT e o momento que nos interessa (nascer ou poente) é a diferença $T_s - T_{s0}$. Esta diferença é transformada em tempo solar (universal) utilizando-se o fator de conversão entre o dia solar e o dia sidereal (cf. seção 2.4), igual a 1,0027379. Matematicamente temos:

$$\Delta T_{UT} = 0,99727 \times (T_s - T_{s0}). \quad (3.43)$$

O instante do fenômeno será então 0h UT mais ΔT_{UT} , ou simplesmente ΔT_{UT} . Deve-se então somar os fusos horários (e eventual “hora de verão”) para obter-se o tempo legal na posição do observador.

O horário de nascer e ocaso variam ao longo do ano e dependem da latitude do observador. A figura 3.16 ilustra este fenômeno para 4 latitudes diferentes.

Nesta figura, podemos notar a diferença na duração do dia (entre o nascer e pôr do Sol) tanto ao longo de um ano como de diferentes latitudes. No exemplo de latitude $70^\circ N$, vemos que o Sol é circumpolar (não se põe) aproximadamente entre 17/maio e 27/julho.

3.5.1 Crepúsculo

Para o Sol em particular, definem-se outros fenômenos ligados ao nascer e pôr. Logo antes do nascer ou após o pôr do Sol, o céu não está totalmente escuro. Este intervalo de tempo que antecede o nascer ou sucede o ocaso do Sol, quando a iluminação é devido à luz solar




Figura 3.16: Variação do horário de nascer e pôr do Sol ao longo do ano para diversas latitudes. Também são mostradas as durações dos diferentes crepúsculos (descritos na próxima seção). A oscilação de alguns minutos visível no *trânsito solar* (passagem pelo meridiano principal, linha laranja) está relacionada à equação do tempo e aos analemas (Sec. 2.1.4) e às estações do ano (Secs. 1.3.1 e 1.5.2).

espalhada pela alta atmosfera, chama-se *crepúsculo*. O início ou fim do crepúsculo (se é de madrugada ou à noite) são definidos em termos da altura do Sol (novamente, levando-se em conta a refração atmosférica). Existem três definições distintas:

crepúsculo civil é definido pelo instante em que o *centro* do disco solar se encontra 6° abaixo do horizonte (ou, $h = -6^\circ$). Em geral, este é o limite em que a iluminação artificial começa a ser necessária para atividades como dirigir;

crepúsculo náutico é definido quando o centro do disco solar está a 12° abaixo do horizonte. Em geral, neste instante o horizonte aparente deixa de ser perceptível, isto é, confunde-se com o céu;

crepúsculo astronômico é o momento em que o disco solar se encontra a 18° abaixo da linha do horizonte. Normalmente, neste momento a alta atmosfera deixa de ser iluminada pela luz solar e as observações astronômicas podem ter início.

É interessante notar que nem sempre estes fenômenos (crepúsculo, nascer e pôr do Sol) ocorrem nas latitudes mais elevadas da Terra (Fig 3.16). Em latitudes elevadas, o crepúsculo é mais longo comparado a latitudes tropicais: por isto parece anoitecer mais rápido perto do equador do que em outros pontos na Terra.

3.6 Relação entre coordenadas geocêntricas e heliocêntricas

Em vários problemas de astronomia de posição é conveniente fazermos uma translação do sistema de coordenadas, passando do sistema geocêntrico ao heliocêntrico ou vice versa. Isto é feito de maneira mais simples utilizando-se o sistema de coordenadas eclípticas (Fig. 3.17).




Figura 3.17: Translação de coordenadas geocêntricas e heliocêntricas. As direções x e x' apontam para o ponto vernal e z e z' para o polo da eclíptica.

Em forma matricial, a translação se faz como $r\mathbf{I}(\lambda, \beta) - R_{\odot}\mathbf{I}_{\odot} = r'\mathbf{I}(\lambda', \beta')$, onde \mathbf{I}_{\odot} é a posição geocêntrica do Sol e as coordenadas “primas” são heliocêntricas. Explicitando vem:

$$\begin{aligned} r \cos \beta \cos \lambda - R_{\odot} \cos \lambda_{\odot} &= r' \cos \beta' \cos \lambda' \\ r \cos \beta \sin \lambda - R_{\odot} \sin \lambda_{\odot} &= r' \cos \beta' \sin \lambda' \\ r \sin \beta - 0 &= r' \sin \beta' \end{aligned} \quad (3.44)$$

onde utilizamos o fato de $\beta_{\odot} = 0$. Na realidade isto não é absolutamente verdadeiro pois, devido a perturbações planetárias, a latitude do Sol pode ser de alguns segundos de arco. Exceto por isso, a equação acima é geral e válida sempre. Note que aqui precisamos levar em conta a distância do astro (r em relação à Terra, r' em relação ao Sol). Isto é fundamental quando são corpos dentro do sistema solar, onde as distâncias são sempre comparáveis com a distância Terra–Sol (R_{\odot}).

As translações em coordenadas equatoriais podem ser feitas primeiro transformando-as em eclípticas, fazendo a translação e finalmente, transformando-as de volta em equatoriais.

3.7 Paralaxe

3.7.1 Paralaxe anual

Devido ao movimento anual da Terra em torno do Sol, a posição das estrelas mais próximas se desloca em relação às estrelas mais longínquas. Este efeito é chamado de *paralaxe* ou ainda *paralaxe anual* (Fig. 3.18). Comparando-se duas imagens da mesma região do céu com 6 meses de intervalo, o que é equivalente à metade do trajeto da Terra em torno do Sol, a posição das estrelas próximas se deslocam em relação às estrelas mais distantes devido a um efeito geométrico de perspectiva (paralaxe).

A paralaxe de uma estrela é definida como³:

$$\text{sen } \varpi = 1/r, \quad (3.45)$$

onde r é a distância da estrela medida em unidades astronômicas (AU, onde 1 AU é aproximadamente igual ao semi-eixo maior da órbita terrestre em torno do Sol, igual 149.597.870,7 km). Para as estrelas, o ângulo de paralaxe ϖ nunca é maior que $0''8$, razão pela qual a primeira medida de paralaxe anual foi feita somente em 1838 por Friedrich W. Bessel. Como $\varpi \ll 1$, podemos utilizar simplesmente $\varpi = 1/r$ (ϖ em radianos).

³O ângulo de paralaxe às vezes é representado por p ou π . Para não confundir com o número $\pi = 3.14159 \dots$, usamos o símbolo ϖ (\code{\varpi} em L^AT_EX).




Figura 3.18: Efeito da paralaxe na posição das estrelas mais próximas. Observando-se uma estrela próxima com 6 meses de intervalo, a posição aparente desta se desloca em relação ao fundo de estrelas distantes. O ângulo ϖ é a paralaxe da estrela, r é a distância da estrela e R a distância Terra-Sol.

Se a paralaxe é dada em segundos de arco, então o seu inverso $1/\varpi$ tem unidades de *parsec* (do inglês PARalaxe SECond), isto é, por definição 1 pc é a distância que corresponde a uma paralaxe de $1''$. Um parsec é exatamente igual a $648.000/\pi$ AU ou aproximadamente 3,2616 anos-luz.

Pela equação (3.45) fica claro que medindo-se a paralaxe obtemos imediatamente a distância da estrela. É desta forma que a distância das estrelas mais próximas são determinadas na prática. Com telescópios terrestres, pôde-se chegar até medidas de cerca de $0'',01$, isto é, até distâncias de ~ 300 anos-luz.

Com o satélite Hipparcos da ESA foi possível determinar a paralaxe até cerca de $0'',001$, o que significa que podemos determinar diretamente a distância das estrelas até cerca de 3.300 anos-luz (ou seja, cerca de 12% da distância ao centro da nossa galáxia). Este alcance mudou no final da segunda década do Séc. XXI com as observações realizadas pelo satélite Gaia da ESA, que pode medir com precisão paralaxes de 10^{-4} a 10^{-5} segundos de arco (dependendo do brilho da estrela).

Na tabela 3.1 está a lista das 23 estrelas mais próximas do Sol e a Fig. 3.19 mostra sua distribuição espacial. Estas estrelas estão contidas em um volume de raio $R = 4,1$ pc (para referência, a distância do Sol ao centro da Galáxia é $R \simeq 8,0$ kpc). A estrela mais próxima do Sol é Alfa Centauri C ou *Proxima Centauri* com paralaxe de $0,768''$, isto é, 1,30 pc (ou 4,25 anos-luz) e magnitude $V = 11,09$ descoberta em 1915 pelo astrônomo Robert Innes. Em 2016, foi descoberto um exoplaneta de tipo terrestre em órbita desta estrela.

Efeito da paralaxe anual nas coordenadas

O efeito da paralaxe nas coordenadas eclípticas pode ser calculado facilmente através da translação entre as coordenadas geocêntricas e heliocêntricas, lembrando que, observado do Sol, a posição de uma estrela não sofre o efeito da paralaxe (veja a Fig. 3.18). Para isto utilizamos as equações que fazem a translação das coordenadas eclípticas de geocêntrica a heliocêntrica, Eq. (3.44).

Como estamos interessados em corpos distantes do sistema solar podemos introduzir as seguintes transformações:

$$\lambda' = \lambda - \Delta\lambda$$

Tabela 3.1: Paralaxe das estrelas mais próximas do Sol medidas pelo satélite *Hipparcos*. ‘ V_{mag} ’ e ‘ M_V ’ são as magnitudes aparente e absoluta, respectivamente, na banda V ; μ é o movimento próprio total da estrela.

Asc. Reta J2000.0	Declinação J2000.0	μ (" / ano)	Paralaxe (")	Tipo Espec.	V_{mag}	M_V	Massa M_{\odot}	Nome
14 ^h 29 ^m 43 ^s ,0	-62° 40' 46"	3.853	0.77199	M5.5	11.09	15.53	0.107	Próxima Centauri
14 ^h 39 ^m 36 ^s ,5	-60° 50' 02"	3.710	0.74723	G2	0.01	4.38	1.144	alfa Centauri A
14 ^h 39 ^m 35 ^s ,1	-60° 50' 14"	3.724	0.74723	K0	1.34	5.71	0.916	alfa Centauri B
17 ^h 57 ^m 48 ^s ,5	+04° 41' 36"	10.358	0.54698	M4.0	9.53	13.22	0.166	Estrela de Barnard
10 ^h 56 ^m 29 ^s ,2	+07° 00' 53"	4.696	0.41910	M6.0	13.44	16.55	0.092	Wolf 359
11 ^h 03 ^m 20 ^s ,2	+35° 58' 12"	4.802	0.39342	M2.0	7.47	10.44	0.464	Lalande 21185
06 ^h 45 ^m 08 ^s ,9	-16° 42' 58"	1.339	0.38002	A1	-1.43	1.47	1.991	Sirius (alfa CMA)
06 ^h 45 ^m 08 ^s ,9	-16° 42' 58"	1.339	0.38002	DA2	8.44	11.34	0.5	Sirius B
01 ^h 39 ^m 01 ^s ,3	-17° 57' 01"	3.368	0.37370	M5.5	12.54	15.40	0.109	BL Ceti
01 ^h 39 ^m 01 ^s ,3	-17° 57' 01"	3.368	0.37370	M6.0	12.99	15.85	0.102	UV Ceti
18 ^h 49 ^m 49 ^s ,4	-23° 50' 10"	0.666	0.33722	M3.5	10.43	13.07	0.171	Ross 154
23 ^h 41 ^m 54 ^s ,7	+44° 10' 30"	1.617	0.31637	M5.5	12.29	14.79	0.121	Ross 248
03 ^h 32 ^m 55 ^s ,8	-09° 27' 30"	0.977	0.31122	K2	3.73	6.19	0.850	épsilon Eridani
23 ^h 05 ^m 52 ^s ,0	-35° 51' 11"	6.896	0.30508	M1.5	7.34	9.75	0.529	Lacaille 9352
11 ^h 47 ^m 44 ^s ,4	+00° 48' 16"	1.361	0.29814	M4.0	11.13	13.51	0.156	Ross 128
22 ^h 38 ^m 33 ^s ,4	-15° 18' 07"	3.254	0.28950	M5.0	13.33	15.64	0.105	EZ Aquarii
22 ^h 38 ^m 33 ^s ,4	-15° 18' 07"	3.254	0.28950	—	13.27	15.58	0.106	
22 ^h 38 ^m 33 ^s ,4	-15° 18' 07"	3.254	0.28950	—	14.03	16.34	0.095	
21 ^h 06 ^m 53 ^s ,9	+38° 44' 58"	5.281	0.28608	K5.0	5.21	7.49	0.703	61 Cygni A
21 ^h 06 ^m 55 ^s ,3	+38° 44' 31"	5.172	0.28608	K7.0	6.03	8.31	0.630	61 Cygni B
07 ^h 39 ^m 18 ^s ,1	+05° 13' 30"	1.259	0.28517	F5 IV	0.38	2.66	1.569	Prócion (alfa CMi)
07 ^h 39 ^m 18 ^s ,1	+05° 13' 30"	1.259	0.28517	DA	10.70	12.98	0.5	
18 ^h 42 ^m 46 ^s ,7	+59° 37' 49"	2.238	0.28383	M3.0	8.90	11.16	0.351	
18 ^h 42 ^m 46 ^s ,9	+59° 37' 37"	2.313	0.28383	M3.5	9.69	11.95	0.259	
00 ^h 18 ^m 22 ^s ,9	+44° 01' 23"	2.918	0.27987	M1.5	8.08	10.31	0.486	GX And
00 ^h 18 ^m 22 ^s ,9	+44° 01' 23"	2.918	0.27987	M3.5	11.06	13.30	0.163	GQ And
22 ^h 03 ^m 21 ^s ,7	-56° 47' 10"	4.704	0.27607	K5	4.69	6.89	0.766	épsilon Indi
08 ^h 29 ^m 49 ^s ,5	+26° 46' 37"	1.290	0.27580	M6.5	14.78	16.98	0.087	DX Cancrri
01 ^h 44 ^m 04 ^s ,1	-15° 56' 15"	1.922	0.27439	G8	3.49	5.68	0.921	tau Ceti
03 ^h 36 ^m 00 ^s ,0	-44° 30' 46"	0.814	0.27201	M5.5	13.03	15.21	0.113	RECONS 1
01 ^h 12 ^m 30 ^s ,6	-16° 59' 57"	1.372	0.26884	M4.5	12.02	14.17	0.136	YZ Ceti
07 ^h 27 ^m 24 ^s ,5	+05° 13' 33"	3.738	0.26376	M3.5	9.86	11.97	0.257	Estrela de Luyten
18 ^h 45 ^m 05 ^s ,3	-63° 57' 48"	2.664	0.25950	M8.5	17.40	19.47	0.07	
02 ^h 53 ^m 00 ^s ,9	+16° 52' 53"	5.106	0.25941	M6.5	15.14	17.21	0.08	
05 ^h 11 ^m 40 ^s ,6	-45° 01' 06"	8.670	0.25527	M1.5	8.84	10.87	0.393	Estrela de Kapteyn
21 ^h 17 ^m 15 ^s ,3	-38° 52' 03"	3.455	0.25343	M0.0	6.67	8.69	0.600	AX Microscópio
10 ^h 48 ^m 14 ^s ,7	-39° 56' 06"	1.530	0.24853	M8.5	17.39	19.37	0.07	
22 ^h 27 ^m 59 ^s ,5	+57° 41' 45"	0.990	0.24806	M3.0	9.79	11.76	0.279	Kruger 60 A
22 ^h 27 ^m 59 ^s ,5	+57° 41' 45"	0.990	0.24806	M4.0	11.41	13.38	0.160	Kruger 60 B
06 ^h 29 ^m 23 ^s ,4	-02° 48' 50"	0.930	0.24444	M4.5	11.15	13.09	0.170	Ross 614 A
06 ^h 29 ^m 23 ^s ,4	-02° 48' 50"	0.930	0.24444	M-	14.26	16.17	0.097	Ross 614 B

$$\begin{aligned}\beta' &= \beta - \Delta\beta \\ r' &= r - \Delta r,\end{aligned}\tag{3.46}$$




Figura 3.19: Distribuição dos sistemas estelares mais próximos. A cor e o tamanho das estrelas são proporcionais ao seu tipo espectral e diâmetro. Figura tirada de RECONS (*Research Consortium on Nearby Stars*)

onde os valores $\Delta\lambda$ e $\Delta\beta$ são ângulos muito pequenos e Δr é muito menor que r . Substituindo as equações (3.46) em (3.44), desenvolvendo os senos e cossenos das diferenças e ignorando os termos infinitesimais cruzados, obtemos:

$$\begin{aligned} R_{\odot} \cos \lambda_{\odot} &= \cos \beta \cos \lambda \Delta r - r \sin \beta \cos \lambda \Delta\beta - r \cos \beta \sin \lambda \Delta\lambda \\ R_{\odot} \sin \lambda_{\odot} &= \cos \beta \sin \lambda \Delta r - r \sin \beta \sin \lambda \Delta\beta + r \cos \beta \cos \lambda \Delta\lambda \\ 0 &= \sin \beta \Delta r + r \cos \beta \Delta\beta \end{aligned} \quad (3.47)$$

o que resulta após simplificação em:

$$\begin{aligned} \Delta\lambda \cos \beta &= -\varpi \sin(\lambda - \lambda_{\odot}), \\ \Delta\beta &= -\varpi \cos(\lambda - \lambda_{\odot}) \sin \beta, \end{aligned} \quad (3.48)$$

onde utilizamos $\varpi = R_{\odot}/r$ (pois $R_{\odot} = 1$ AU).

As equações (3.48) representam uma elipse na esfera celeste de semi-eixos ϖ e $\varpi \sin \beta$ (Fig. 3.20) Esta elipse é chamada *elipse paraláctica* e representa o deslocamento aparente devido ao efeito de paralaxe ao longo de um ano. O semi-eixo maior é paralelo à eclíptica e o semi-eixo menor é perpendicular.

Para coordenadas equatoriais podemos proceder da mesma forma, considerando a mesma situação da figura 3.17 (mas em coordenadas equatoriais). A variação das coordenadas α e δ devido à paralaxe anual é dada por:

$$\begin{aligned} \Delta\alpha \cos \delta &= -\varpi(\sin \alpha \cos \lambda_{\odot} - \cos \varepsilon \cos \alpha \sin \lambda_{\odot}), \\ \Delta\delta &= -\varpi(\sin \delta \cos \alpha \cos \lambda_{\odot} + [\cos \varepsilon \sin \delta \sin \alpha - \sin \varepsilon \cos \delta] \sin \lambda_{\odot}), \end{aligned} \quad (3.49)$$

Em termos das coordenadas cartesianas geocêntricas do Sol, $X_{\odot} = \cos \lambda_{\odot}$ e $Y_{\odot} = \sin \lambda_{\odot} \cos \varepsilon$ (assumindo que $Z_{\odot} = 0$), a variação das coordenadas equatoriais se escreve como:

$$\Delta\alpha \cos \delta = -\varpi(X_{\odot} \sin \alpha - Y_{\odot} \cos \alpha),$$




Figura 3.20: Elipse paraláctica. Trajetória aparente devido ao efeito de paralaxe anual. O gráfico a esquerda ilustra um exemplo com $\varpi = 0{,}8''$ e diferentes latitudes. Quando o astro se encontra no polo da eclíptica, sua trajetória aparente é praticamente um círculo; quando o astro está na eclíptica ($\beta = 0$) sua trajetória é um “vai-e-vem” linear.

$$\Delta\delta = -\varpi(X_{\odot} \cos \alpha + Y_{\odot} \sin \alpha) \sin \delta. \tag{3.50}$$

3.7.2 Paralaxe diária

A *paralaxe diária* ou geocêntrica, p , ocorre devido ao fato de que um observador não se encontra no centro da Terra mas na sua superfície. Em outras palavras, a paralaxe diária corresponde à translação que transforma um dado sistema de coordenadas de geocêntrico a topocêntrico (Fig. 3.21). A paralaxe diária só é relevante para a Lua ($p_{\text{Lua}} \approx 57'$), o Sol ($p_{\text{Sol}} \approx 8{,}8''$) e, eventualmente, os planetas mais próximos.




Figura 3.21: Paralaxe diária. A distância geocêntrica do observador ao centro da Terra é ρ , r é a distância geocêntrica do astro observado e r' a distância topocêntrica. A esquerda, o ângulo p é a paralaxe diária; a direita, o ângulo P é a paralaxe horizontal (o astro está no horizonte, $z' = 90^\circ$).

A paralaxe diária p é a diferença entre os ângulos com a vertical geocêntrica, z , e topocên-

trica, z' , isto é, $p = z' - z$. Pela lei dos senos temos (veja a figura 3.21):

$$\text{sen } p = \frac{\rho}{r} \text{sen } z'. \quad (3.51)$$

Quando a altura do astro é 0° (ou $z' = 90^\circ$), chamamos o ângulo p de *paralaxe horizontal* e utilizamos a notação P . Assim temos simplesmente,

$$\text{sen } P = \frac{\rho}{r}. \quad (3.52)$$

Como $z' = p + z$, então $\text{sen } z' = \text{sen } p \cos z + \cos p \text{sen } z$ e podemos escrever a paralaxe diária em função de z e da paralaxe horizontal como:

$$\tan p = \frac{\text{sen } z \text{sen } P}{1 - \cos z \text{sen } P}. \quad (3.53)$$

É importante notarmos que, pelo fato de não estarmos no centro da Terra, haverá um efeito de paralaxe devido à rotação terrestre sobre o seu eixo, análogo ao caso da paralaxe anual (Fig. 3.22).




Figura 3.22: Efeito da paralaxe diária na posição de um astro próximo devido à rotação da Terra. Observando-se um astro próximo com 12 horas de intervalo, a posição aparente desta se desloca em relação ao fundo de estrelas distantes. O ângulo p é a paralaxe do astro, r é a distância geocêntrica e r' a distância topocêntrica.

Efeito da paralaxe diária nas coordenadas

Da mesma forma que fizemos para a paralaxe anual, podemos calcular o efeito da paralaxe diária na posição de um astro utilizando uma translação do sistema de coordenadas geocêntrico para topocêntrico. Contudo, neste caso, é mais conveniente trabalharmos no sistema de coordenadas horizontais ou horárias (veja a Fig. 3.23 para o sistema de coordenadas horárias).

Assim, em notação vetorial, a translação de um sistema de coordenadas horizontais geocêntrico para topocêntrico se faz pela soma de vetores $r\mathbf{I}(A, h) = r'\mathbf{I}(A', h') + \vec{\rho}_{\text{horiz}}$, onde as grandezas 'primas' são topocêntricas. Isto corresponde ao sistema de equações:

$$\begin{aligned} r \cos A \cos h &= r' \cos A' \cos h' + \rho \text{sen}(\varphi - \varphi') \\ r \text{sen } A \cos h &= r' \text{sen } A' \cos h' + 0 \\ r \text{sen } h &= r' \text{sen } h' + \rho \cos(\varphi - \varphi'), \end{aligned} \quad (3.54)$$

onde $\vec{\rho}_{\text{horiz}}$ é a posição geocêntrica do observador no sistema de coordenadas horizontais, que é obtido por uma rotação de $90^\circ - \varphi$ (note que é a latitude geodética utilizada na rotação) da




Figura 3.23: Translação de coordenadas horárias topocêntricas para geocêntricas. φ' é a latitude geocêntrica e ρ a distância do observador O ao centro da Terra, C .

posição geocêntrica em coordenadas horárias ($\vec{\rho}_{\text{horário}}$):

$$\mathbf{R}_y(90^\circ - \varphi) \underbrace{\begin{pmatrix} \rho \cos \varphi' \\ 0 \\ \rho \sin \varphi' \end{pmatrix}}_{\rho_{\text{horário}}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \rho \sin(\varphi - \varphi') \\ 0 \\ \rho \cos(\varphi - \varphi') \end{pmatrix}}_{\rho_{\text{horizontal}}}.$$

Em coordenadas horárias, utilizamos a mesma soma vetorial, mas neste caso temos $r\mathbf{I}(H, \delta) = r'\mathbf{I}(H', \delta') + \rho_{\text{horário}}$, lembrando que $H = T_s - \alpha$ e $H' = T_s - \alpha'$ (T_s sendo o tempo sideral local do observador, igual ao tempo sideral de Greenwich corrigido da longitude). Obtemos assim o sistema de equações:

$$\begin{aligned} r \cos H \cos \delta &= r' \cos H' \cos \delta' + \rho \cos \varphi' \\ r \sin H \cos \delta &= r' \sin H' \cos \delta' + 0 \\ r \sin \delta &= r' \sin \delta' + \rho \sin \varphi'. \end{aligned} \quad (3.55)$$

Utilizando transformações análogas àquelas utilizadas na paralaxe anual, isto é:

$$\begin{aligned} H' &= H - \Delta H \\ \delta' &= \delta - \Delta \delta \\ r' &= r - \Delta r, \end{aligned} \quad (3.56)$$

e tomando as diferenças como infinitesimais obtemos os resultados seguintes:

$$\begin{aligned} \Delta H \cos \delta &= -P \cos \varphi' \sin H, \\ \Delta \delta &= -P(\cos H \sin \delta \cos \varphi' - \cos \delta \sin \varphi'), \end{aligned} \quad (3.57)$$

onde utilizamos $P = \rho/r$.

No caso da Lua e de objetos muito próximos (satélites artificiais), não podemos supor que as diferenças nas equações (3.56) sejam infinitesimais. Neste caso é necessário utilizarmos o sistema de equações (3.55) sem fazermos aproximações.

3.8 Movimento próprio de estrelas

Apesar do termo “estrelas fixas”, nenhum astro é realmente estacionário. Da mesma forma que os planetas orbitam o Sol, as estrelas também seguem suas órbitas nas galáxias. No caso da nossa galáxia, a Via Láctea, uma espiral gigante, praticamente todas as estrelas orbitam em torno do centro galáctico. Este movimento orbital pode ser decomposto em duas componentes principais: uma órbita aproximadamente circular em torno do centro galáctico e um movimento de direção aleatória. No caso das estrelas na vizinhança solar, o movimento em torno do centro galáctico tem magnitude da ordem de 200 km/s e o movimento aleatório cerca de 10–20 km/s.




Figura 3.24: Órbita típica de uma estrela da vizinhança solar. O principal movimento é a órbita aproximadamente circular (traço pontilhado) com velocidade v_ϕ . Superposto a este movimento há uma componente de direção aleatória que pode ser decomposta em coordenadas cilíndricas com módulos δv_z , (direção “vertical”, perpendicular ao plano Galáctico) δv_R (direção radial) e δv_ϕ .

Do ponto de vista de um observador no Sistema Solar, o *movimento próprio* das estrelas, μ , é uma composição entre os movimentos das estrelas e do Sol em relação a um referencial fixo, uma vez que é observado da Terra. É claro que as estrelas terão, em geral, um movimento radial e transversal em relação ao Sol (e naturalmente à Terra), como mostra a figura 3.25. A componente radial não altera a posição de uma estrela na esfera celeste, apenas o movimento relativo transversal é que terá algum efeito na posição do astro (o movimento radial altera a distância da estrela a nós).




Figura 3.25: Decomposição do movimento próprio. \vec{v} é o vetor velocidade relativa da estrela em relação ao observador, \vec{v}_{rad} é a velocidade radial, na direção da linha de visada do observador, \vec{v}_{perp} é a componente perpendicular, contida no plano do céu. É esta componente que corresponde a μ e altera a posição do astro na esfera celeste.

A relação entre a velocidade transversal (perpendicular à linha de visada), a distância do astro e o movimento próprio (Fig. 3.26) é dada por:

$$v_{\text{perp}} = 977\,820 \times \frac{\pi}{180 \times 3600} \times \frac{\mu}{\varpi} \simeq 4,7406 \frac{\mu}{\varpi} \text{ km/s}, \quad (3.58)$$

onde μ é dado em segundos de arco por ano e ϖ em segundos de arco (lembrando que o inverso de ϖ é a distância em parsec). O primeiro termo numérico é a conversão de parsec/ano em km/s e o segundo termo numérico corresponde à conversão entre segundos de arco e radianos. Aqui assumimos que μ é pequeno e podemos aproximar $\sin \mu \approx \mu$ (em radianos).




Figura 3.26: Relação entre o movimento próprio, μ , a distância ($1/\varpi$, o inverso do ângulo de paralaxe) e a velocidade transversal, v_{perp} .

O efeito do movimento próprio na posição aparente é pequeno devido à distância das estrelas. Uma estrela que tenha uma velocidade transversal de ~ 50 km/s e esteja a 5 pc (ou $\sim 16,3$ anos-luz) terá um movimento aparente de apenas $\sim 2,1''$ por ano. Foi somente em 1718 que Halley suspeitou da existência do movimento próprio das estrelas, comparando a posição de Arcturus (alfa Boötes ou Boieiro) medida por Hiparco 20 séculos antes de suas próprias medidas.




Figura 3.27: Movimento próprio e paralaxe da estrela de Barnard observado por Dennis di Cicco. O traço contínuo é o movimento próprio (medido pelo satélite Hipparcos) enquanto que a oscilação em torno desta reta é devido à paralaxe (portanto um reflexo do movimento de translação da Terra em torno do Sol).

Existem cerca de 35 estrelas com movimento próprio superior a $3''$ por ano, sendo a estrela de maior movimento próprio a Estrela de Barnard, com um movimento de $10,3''$ por ano (descoberto em 1916 por Edward Barnard; veja Fig. 3.27). Ela é uma anã vermelha invisível a olho nu (magnitude 9.54) que se encontra na constelação de Ophiuchus. A estrela visível a olho nu com maior movimento próprio é épsilon da constelação Indus, também uma anã

vermelha com movimento próprio de $4''69$ por ano.

Outro efeito devido ao movimento próprio das estrelas é que a forma das constelações se altera com o tempo. Este efeito é pequeno, mas para os primeiros habitantes da América do Sul, que chegaram talvez há cerca de 50.000 anos (sítio arqueológico de Pedra Furada, no Piauí), não havia o que hoje chamamos de constelação do Cruzeiro do Sul (Fig. 3.28).




Figura 3.28: Movimento próprio das estrelas que compõem o Cruzeiro do Sul. Da esquerda para a direita vemos as configurações observadas há 40.000 anos no passado, no centro hoje (no ano 2.000) e a direita no futuro, daqui 40.000 anos. Note que daqui há 20 mil anos a estrela α Centauri estará muito próxima da posição ocupada atualmente pela estrela δ Crucis (conhecida como *Pálida*). O campo mostrado tem cerca de $9,5^\circ$ de lado.

3.8.1 Efeito do movimento próprio nas coordenadas

Em geral, o movimento próprio das estrelas são dados em relação à ascensão reta e à declinação, μ_α e μ_δ , em segundos de arco por ano. A variação temporal de μ em um dado referencial é desprezível (mas será possivelmente mensurável a partir das próximas observações espaciais). Se uma estrela tem coordenadas α_0 e δ_0 em uma época t_0 , suas coordenadas em uma outra época t será, em primeira aproximação:

$$\begin{aligned}\alpha &= \mu_\alpha(t - t_0) + \alpha_0, \\ \delta &= \mu_\delta(t - t_0) + \delta_0.\end{aligned}\tag{3.59}$$

Notemos que os velocidades μ_α e μ_δ são dadas no mesmo equinócio (época) que as coordenadas α_0 e δ_0 . Isto significa que as coordenadas α e δ correspondem à posição do astro no momento t mas em relação ao equinócio t_0 : é necessária ainda a correção da precessão para que as coordenadas correspondam ao equinócio do momento t .

Em termos das componentes da velocidade própria, o *movimento próprio total*, μ , pode ser escrito como $\mu^2 = \mu_\alpha^2 \cos^2 \delta + \mu_\delta^2$.

Além das estrelas, os objetos extragalácticos (galáxias e quasares por exemplo) também se movimentam em relação a um referencial fixo e em relação a nós. Estima-se que o movimento próprio das galáxias mais longínquas deve ser inferior a 10^{-5} segundos de arco por ano. Contudo, para as galáxias próximas, sobretudo do grupo local, as primeiras medidas de movimento próprio começaram a produzirem resultados na segunda década do século XXI.

3.8.2 Movimento de estrelas próximas do Sistema Solar

A partir das coordenadas esféricas [por exemplo, ascensão reta e declinação, (α, δ)], paralaxe (ϖ), velocidade radial (v_r) e movimento próprio (μ_α, μ_δ), podemos determinar a posição em coordenadas cartesianas (x, y, z) e velocidade (v_x, v_y, v_z) de estrelas próximas e estimar seu movimento durante algumas dezenas de milênios. Tomando o Sol na origem, a relação é dada por:

$$\vec{r} = \begin{cases} x = r \cos \alpha \cos \delta; \\ y = r \sin \alpha \cos \delta; \\ z = r \sin \delta; \end{cases} \quad \text{e} \quad \vec{v} = \begin{cases} v_x = v_r \cos \alpha \cos \delta - v_\alpha \sin \alpha - v_\delta \cos \alpha \sin \delta; \\ v_y = v_r \sin \alpha \cos \delta + v_\alpha \cos \alpha - v_\delta \sin \alpha \sin \delta; \\ v_z = v_r \sin \delta + v_\delta \cos \delta; \end{cases} \quad (3.60)$$

onde

$$v_\alpha = 4,7406 \mu_\alpha / \varpi \quad \text{e} \quad v_\delta = 4,7406 \mu_\delta / \varpi,$$

como na Eq. (3.58), para que todas as velocidades sejam dadas em km/s.

A distância da estrela é $|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Se estivermos interessados no movimento das estrelas em um curto intervalo de tempo, menos de cerca de 1 milhão de anos, podemos ignorar a força que age na estrela devido ao resto da Galáxia. Neste caso, não há aceleração e o movimento das estrelas no espaço é retilíneo e uniforme. Assim, para descrever o movimento de estrelas próximas podemos escrever:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}t$$

onde \vec{r}_0 é a posição atual ($t = 0$) da estrela. Minimizando a equação acima, podemos determinar o momento em que a estrela passa pelo *periélio* (distância mais próxima do Sol):

$$t_{\min} = -\frac{\vec{r}_0 \cdot \vec{v}}{v^2} = -977,82 \times 10^3 \frac{1}{\varpi} \frac{v_r}{v^2} \text{ anos}, \quad (3.61)$$

onde as velocidades são dadas em km/s e a paralaxe ϖ em segundos de arco. A distância mínima no periélio é:

$$d_{\min} = \frac{1}{\varpi} \frac{v_t}{v} \quad \text{onde} \quad v_{\text{perp}} = 4,7406 \frac{\sqrt{\mu_\alpha^2 + \mu_\delta^2}}{\varpi} \quad \text{e} \quad v = \sqrt{v_{\text{perp}}^2 + v_r^2},$$

lembrando que v_{perp} é a velocidade transversal da estrela e μ é dado em segundos de arco por ano.

A figura 3.29 mostra a evolução da distância de algumas estrelas que hoje estão próximas do Sol. Hoje, *Proxima Centauri* é a estrela com a menor distância, mas daqui a 36 mil anos Ross 248 será a estrela nesta situação e 9 mil anos depois, será a vez de Gliese 445.

Estrelas de massa comparável ou maior que a do Sol que passem nas vizinhanças da *Nuvem de Oort*⁴ podem perturbá-la e lançar cometas na direção central do Sistema Solar.

3.9 Aberração da Luz

A aberração é um fenômeno que ocorre devido ao movimento relativo do observador ao astro observado e à velocidade finita de propagação da luz (mais precisamente, da radiação eletromagnética). Este efeito foi descoberto por James Bradley em 1728⁵ com observações da estrela Gama Draconis (Dragão). A figura 3.30 ilustra este efeito.

Se a velocidade da luz fosse infinita ou se o observador estivesse imóvel em relação ao astro, este astro seria observado com um ângulo θ . Mas como o observador tem uma velocidade V , enquanto a luz do astro percorre o trecho EO' em um tempo τ , o observador se desloca de O a O' , percorrendo uma distância $V\tau$. Assim, o astro é observado em O' com um ângulo θ' .

⁴A Nuvem de Oort é uma região ao redor do Sistema Solar onde postula-se a existência de corpos ricos em material volátil. Quando estes corpos são perturbados gravitacionalmente, suas trajetórias podem levá-los à região interna Sistema Solar, tornando assim cometas

⁵Philosophical Transactions, 1727/1728, vol. 35, p. 637.




Figura 3.29: Distâncias relativas ao Sol de algumas estrelas próximas. A *Nuvem de Oort* está representada para dar uma referência de escala. Esta figura foi feita usando dados da compilação RECONS, www.recons.org.




Figura 3.30: Esquerda: Aberração devida à velocidade V do observador. A diferença $\theta - \theta' = \alpha$ é devida à aberração. Direita: Este efeito é análogo à mudança de direção aparente da chuva quando corremos ou ficamos parado.

A diferença entre os ângulos θ e θ' é o ângulo de aberração. Note que este ângulo não depende do comprimento EO' . Pela lei dos senos temos:

$$\text{sen}(\theta - \theta') = \frac{V}{c} \text{sen } \theta', \tag{3.62}$$

onde c é a velocidade da luz. Como $V \ll c$, ($V \sim 30$ km/s) a diferença $\theta - \theta'$ é pequena e o seno pode ser simplificado resultando em:

$$\theta - \theta' = \kappa \text{sen } \theta'; \text{ com } \kappa = \frac{V}{c} \frac{1}{\text{sen } 1''}, \tag{3.63}$$

onde κ é a *constante de aberração*. O termo $\text{sen } 1''$ é utilizado para que κ tenha unidades de segundos de arco. Novamente, como θ e θ' são muito próximos, podemos empregar θ no lugar de θ' na expressão (3.63).

A observação do fenômeno de aberração (anual, discutido no próximo parágrafo) da luz é uma evidência direta do movimento da Terra ao redor do Sol. Logo, trata-se de uma evidência do sistema heliocêntrico defendido por Copérnico (Sec. 4.8.1), 185 anos antes da observação de Bradley.

3.9.1 Aberração anual

A aberração anual ou estelar é devido ao movimento da Terra em torno do Sol. Neste caso, o parâmetro de aberração tem o valor da velocidade média de translação da Terra:

$$\kappa = \frac{2\pi a}{Pc(1-e^2)^{1/2}} \frac{1}{\text{sen } 1''} \quad (3.64)$$

onde a é o semi-eixo da órbita terrestre, P o período (ou seja, o ano sideral) e e é a excentricidade. O valor de κ é de $20'',49552$ para a época J2000.0 (a época deve ser dada porque tanto P , a e e têm variações seculares devido às perturbações planetárias).

O procedimento para se corrigir a aberração anual é muito semelhante à correção da paralaxe, isto é, trata-se de uma soma vetorial. Neste caso temos:

$$r'\mathbf{I}(\lambda', \beta') = r\mathbf{I}(\lambda, \beta) + r\frac{\mathbf{V}}{c}, \quad (3.65)$$

onde \mathbf{c} é a velocidade da luz no vácuo, $r'\mathbf{I}(\lambda', \beta')$ são as coordenadas *aparentes* (corrigida da aberração) e $r\mathbf{I}(\lambda, \beta)$ são as coordenadas verdadeiras. \mathbf{V} é a velocidade do observador em relação ao astro observado.

Vamos considerar agora o caso de um observador na Terra, portanto girando em torno do Sol. Neste caso, \mathbf{V} é a própria velocidade de translação da Terra em torno do Sol (supondo, inicialmente que a observação seja feita no sistema geocêntrico). Temos assim, em coordenadas eclípticas, o sistema de equações:

$$\begin{aligned} r' \cos \beta' \cos \lambda' &= r \frac{V_x}{c} + r \cos \beta \cos \lambda \\ r' \cos \beta' \text{sen } \lambda' &= r \frac{V_y}{c} + r \cos \beta \text{sen } \lambda \\ r' \text{sen } \beta' &= 0 + r \text{sen } \beta \end{aligned} \quad (3.66)$$

onde utilizamos o fato de V_z (a velocidade da Terra perpendicular à eclíptica) ser praticamente igual a zero. Utilizando novamente as transformações (3.46), nas equações (3.66) obtemos:

$$\begin{aligned} -\Delta r \cos \beta \cos \lambda + \Delta \beta r \cos \lambda \text{sen } \beta + \Delta \lambda r \cos \beta \text{sen } \lambda &= r \frac{V_x}{c} \\ -\Delta \lambda r \cos \beta \cos \lambda - \Delta r \cos \beta \text{sen } \lambda + \Delta \beta r \text{sen } \beta \text{sen } \lambda &= r \frac{V_y}{c} \\ 0 - \Delta \beta r \cos \beta - \Delta r \text{sen } \beta &= 0, \end{aligned} \quad (3.67)$$

onde eliminamos os termos infinitesimais de ordem superior a um. A equação matricial acima corresponde a um sistema de três equações que pode ser resolvida facilmente, resultando em:

$$\begin{aligned} \Delta \lambda \cos \beta &= \frac{V_x}{c} \text{sen } \lambda - \frac{V_y}{c} \cos \lambda \\ \Delta \beta &= \text{sen } \beta \left(\frac{V_x}{c} \cos \lambda + \frac{V_y}{c} \text{sen } \lambda \right) \end{aligned} \quad (3.68)$$

A velocidade da Terra em torno do Sol é dado pela derivada temporal da posição do raio vetor R_{\odot} (que nos dá a posição heliocêntrica da Terra). Para uma trajetória elíptica temos:

$$\begin{aligned} \frac{V_x}{c} &= -\kappa(\text{sen } \lambda_{\odot} + e \text{sen } w) \\ \frac{V_y}{c} &= \kappa(\cos \lambda_{\odot} + e \cos w) \\ \frac{V_z}{c} &= 0 \end{aligned} \quad (3.69)$$

onde λ_{\odot} , w e e são a longitude do Sol, a longitude do periélio e a excentricidade da órbita terrestre, respectivamente. Assim, podemos escrever finalmente:

$$\begin{aligned}\Delta\lambda \cos\beta &= -\kappa[\cos(\lambda_{\odot} - \lambda) + e \cos(w - \lambda)] \\ \Delta\beta &= -\kappa \operatorname{sen}\beta[\operatorname{sen}(\lambda_{\odot} - \lambda) + e \operatorname{sen}(w - \lambda)].\end{aligned}\quad (3.70)$$

O efeito da aberração anual é fazer com que as estrelas descrevam uma elipse na esfera celeste, de forma análoga à paralaxe anual. Se desprezarmos a elipticidade da órbita terrestre, a expressão acima se simplifica substituindo $e = 0$.

Em coordenadas equatoriais, o efeito da aberração anual é dado por:

$$\begin{aligned}\Delta\alpha \cos\delta &= -\kappa[(\operatorname{sen}\lambda_{\odot} + e \operatorname{sen}w) \operatorname{sen}\alpha + (\cos\lambda_{\odot} + e \cos w) \cos\varepsilon \cos\alpha] \\ \Delta\delta &= -\kappa[(\operatorname{sen}\lambda_{\odot} + e \operatorname{sen}w) \cos\alpha \operatorname{sen}\delta + (\cos\lambda_{\odot} + e \cos w) \\ &\quad (\operatorname{sen}\varepsilon \cos\delta - \cos\varepsilon \operatorname{sen}\alpha \operatorname{sen}\delta)].\end{aligned}\quad (3.71)$$

3.9.2 Aberração planetária

No caso da aberração anual, nós só levamos em consideração o movimento da Terra em torno do Sol, desprezando o movimento próprio das estrelas. No caso dos astros do sistema solar é necessário levarmos também em conta seus movimentos. Desta forma devemos reescrever a equação (3.65) da seguinte forma:

$$\mathbf{r}' = \mathbf{r} + r \frac{\mathbf{V}_{\text{Terra}} - \mathbf{V}_p}{c}, \quad (3.72)$$

Por outro lado, para os corpos do sistema solar conhecemos com grande precisão a suas posições e, principalmente, seus movimentos. Por isso, ao invés de calcularmos a correção da aberração planetária utilizando a Eq. (3.72) e o método descrito acima para a aberração anual, o que se faz é calcularmos as posições tanto da Terra como do astro em questão a um instante δt anterior ao tempo que queremos. Este intervalo δt é dado por $c \times r$, onde c é a velocidade da luz e r a distancia geocêntrica do astro. Em outras palavras, levamos em consideração a velocidade finita da luz calculando as posições da Terra e do astro em um instante anterior ao da observação. Isto só é possível e relevante no caso de astros com movimento e posições bem determinados, como os corpos do sistema solar.

3.9.3 Aberração secular

O Sol, como todas as estrelas da Via Láctea, tem um movimento próprio em relação ao centro da Galáxia. Um sistema de referência centrado na Galáxia seria uma melhor aproximação de um referencial inercial do que um sistema ligado ao Sol.

Isto significa que o movimento do Sol na Via Láctea (e, conseqüentemente, o movimento da Terra) produz um efeito de aberração que chamamos de *aberração secular*. Este efeito, contudo, não é levado em conta na prática.

3.9.4 Aberração diária

A aberração diária é devido ao movimento de rotação da Terra em torno de seu eixo. Como a velocidade de rotação da Terra ($\sim 0,46$ km/s) é menor que sua velocidade de translação, este efeito é proporcionalmente menor que a aberração anual.

Outra diferença é que o eixo da rotação não é o mesmo que o eixo de translação; portanto a correção da aberração diária é feita de forma mais simples em coordenadas horárias. O

procedimento para deduzirmos a correção devido à aberração diária é exatamente como para a aberração anual (soma vetorial).

Devemos lembrar que a velocidade de rotação de um observador sobre a Terra depende de sua distância geocêntrica (que podemos considerar constante sobre toda a Terra) e sua latitude geográfica, φ . A velocidade do observador é, portanto, $V = 2\pi\rho \cos \varphi/86.164$, onde 86.164 é o número aproximado de segundos SI em um dia sideral e ρ é a distância geocêntrica.

As equações que obtemos para a correção da aberração diária são:

$$\begin{aligned}\Delta\alpha \cos \delta &= -\kappa' \cos \varphi \cos H \\ \Delta\delta &= -\kappa' \sin \delta \sin \varphi \sin H,\end{aligned}\tag{3.73}$$

onde φ é a latitude geográfica do observador, $H = T_s - \alpha$ (o tempo sideral T_s é local) e κ' é a constante de aberração do movimento diário, $\kappa' = 0''320$.

3.10 Desvio gravitacional da luz

Desde Newton, alguns físicos cogitaram que a trajetória da luz poderia ser afetada pela gravitação. Em 1911, Einstein faz uma previsão, baseada no que viria a ser alguns anos mais tarde a Teoria da Relatividade Geral, que os raios de luz de uma estrela distante sofreriam um desvio em sua trajetória devido à massa do Sol, alterando sua posição aparente na esfera celeste.

Em 1915, com a versão final da Teoria da Relatividade Geral, Einstein recalcula este efeito (corrigindo-o em relação ao cálculo 1911). O desvio gravitacional da luz foi confirmado experimentalmente durante um eclipse total, na manhã de 29 de maio de 1919 no Ceará, quando foi observado que as estrelas próximas (em distância angular) do Sol apresentavam um desvio em suas posições esperadas.




Figura 3.31: Desvio gravitacional da luz devido a presença de um corpo massivo (no caso, o Sol). O astro é observado em uma posição aparente distante $\Delta\theta$ da posição verdadeira. O ângulo ψ é a elongação heliocêntrica do astro em relação à Terra, D é a elongação geocêntrica em relação ao Sol e d_s é a distância Terra-Sol (1 unidade astronômica). A menor distância entre a trajetória da luz e o Sol, b , é o parâmetro de impacto.

Este fenômeno ocorre sempre que um fóton (não necessariamente de luz visível, podendo ser raios-X, rádio, etc...) passa nas proximidades de um corpo massivo (Fig. 3.31). É este desvio gravitacional da luz que produz os chamados *arcos gravitacionais* que são imagens de galáxias longínquas deformadas devido ao campo gravitacional de algum objeto que se encontre entre nós e a galáxia (por exemplo, um aglomerado de galáxias que funciona como uma *lente gravitacional*).

No caso da astronomia de posição, estamos interessados na mudança da posição aparente de astros cujos raios luminosos são desviados pela massa do Sol. A teoria geral da relatividade

prevê que o desvio gravitacional da luz será⁶:

$$\Delta\theta = \frac{2GM_{\odot}}{c^2 d_s} \frac{\sin \psi}{1 + \cos \psi}; \quad \left(\text{obs.: } \frac{\sin \psi}{1 + \cos \psi} \equiv \tan \frac{\psi}{2} \right), \quad (3.74)$$

onde ψ é o ângulo entre o astro e a Terra visto do Sol, M_{\odot} e d_s são a massa do Sol e sua distância da Terra; G e c são a constante da gravitação e a velocidade da luz no vácuo, respectivamente. A constante na Eq. (3.74) vale $0''00407$. O desvio tem um valor mínimo (e nulo) quando $\psi = 0$, o astro está exatamente entre o Sol e a Terra (o que ocorre com os planetas internos e a Lua).

Para os astros que estão a uma distância muito maior que a distância Terra–Sol (qualquer astro fora do sistema solar e, em primeira aproximação, os planetas mais distantes), podemos dizer que $D \approx 180^\circ - \psi$, onde D é a *elongação* geocêntrica do astro (a distância angular entre o Sol e o astro). Podemos dar, então, o desvio gravitacional da luz em função da elongação:

D	90°	45°	20°	5°	2°	1°	$0;5$	$0;2666$
$\Delta\theta$	$0''00407$	$0''0098$	$0''023$	$0''093$	$0''233$	$0''466$	$0''933$	$1''751$

Note que quando a elongação é menor do que $\approx 0;2666 = 16'$ o astro está oculto, atrás do Sol (este ângulo corresponde ao raio do Sol observado a 1 U.A.). A figura 3.32 ilustra o efeito de desvio gravitacional da luz na posição aparente das estrelas.




Figura 3.32: Acima: Posição aparente de algumas estrelas quando o Sol está distante (distância angular). Abaixo: O mesmo campo quando o Sol está presente (por exemplo, observável durante um eclipse total do Sol). Os pontos verdes representam a posição do painel acima, sem o efeito gravitacional do Sol. As estrelas tendem a se afastar do corpo massivo (a “lente gravitacional”). O efeito aqui está bem exagerado para efeito de ilustração.

Quando consideramos a trajetória da luz de um astro distante muito próxima da superfície do Sol, podemos expressar o desvio gravitacional pela expressão:

$$\Delta\theta = \frac{4GM_{\odot}}{c^2 b},$$

onde b é chamado “parâmetro de impacto” (veja Fig. 3.74). Para uma trajetória rasante, $b = R_{\odot}$, onde R_{\odot} é raio do Sol. Assim, temos

$$\Delta\theta = \frac{4GM_{\odot}}{c^2 R_{\odot}} = 1''751, \quad (\text{caso rasante ao Sol}),$$

que é equivalente ao valor da tabela acima para $D = 16'$, pois $R_{\odot}/d_s = D = 180^\circ - \psi$ e $\sin \psi/(1 + \cos \psi) \rightarrow 2/D$ para $D \ll 1$.

⁶Veja o *Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac*.

A princípio, a trajetória da luz de um astro também é afetada pelo campo gravitacional da Terra, onde se encontra o observador. Contudo este efeito é sempre inferior a $0'',0003$ e pode ser desprezado sem problemas.

Em coordenadas equatoriais, o desvio gravitacional é calculado da seguinte maneira:


$$\begin{aligned} \cos D &= \sin \delta \sin \delta_{\odot} + \cos \delta \cos \delta_{\odot} \cos (\alpha - \alpha_{\odot}) ; \\ \Delta\alpha &= 0,000271 \frac{\cos \delta_{\odot} \sin(\alpha - \alpha_{\odot})}{(1 - \cos D) \cos \delta} \\ \Delta\delta &= 0'',00407 \frac{\sin \delta \cos \delta_{\odot} \cos(\alpha - \alpha_{\odot}) - \cos \delta \sin \delta_{\odot}}{(1 - \cos D)} , \end{aligned} \quad (3.75)$$

onde α_{\odot} e δ_{\odot} são as coordenadas geocêntricas do Sol.

3.11 Redução das coordenadas celestes: Redução ao dia

A transformação das coordenadas celestes de um astro entre dois sistemas de referências, em geral de uma posição catalogada para a posição aparente em uma data arbitrária, é chamada *redução ao dia*. A redução é um procedimento que envolve a precessão, nutação, aberração da luz, paralaxe, movimento próprio, e desvio gravitacional da luz.

Atualmente, as coordenadas das estrelas são geralmente dadas no chamado referencial J2000, por exemplo baseado no catálogo FK5 (*Fifth Fundamental Catalogue*), em relação ao equinócio médio de 01/01/2000, com origem no baricentro do Sistema Solar. O procedimento da redução das coordenadas está resumido abaixo:



A partir das coordenadas verdadeiras da data, podemos ainda obter as *coordenadas aparentes* topocêntricas, corrigindo as coordenadas pelo efeito da aberração diária, refração atmosférica e da paralaxe diária, se for necessário.

Para dar um exemplo, vamos calcular as coordenadas verdadeiras da Estrela de Barnard para o dia 13/11/2021 às 20 h UT. Iniciamos listando as coordenadas médias da estrela:

Coordenadas: asc. Ret.: $17^{\text{h}}57^{\text{m}}48,498$; decl.: $+04^{\circ}41'36'',21$ (J2000).

Movimento próprio: $\mu_{\alpha} = -0,7986$; $\mu_{\delta} = 10,3281$ ["/ano].

Paralaxe: $0.5483''$.

A dia juliana é $JD = 2.459.532,333$ (lembrando que JD começa ao meio-dia). Para este caso, nós temos as seguintes correções:

	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$
Mov. Próprio	-17,4920	226,1896
Aberração	-16,5245	5,9612
Paralaxe	-0,3393	-0,2033
Desvio grav.	0,0083	0,0039
Nutação	-14,3499	-4,2829

(em segundos de arco)

Obtemos assim as coordenadas geocêntricas médias J2000:

$$\alpha = 17^{\text{h}}57^{\text{m}}46,^{\text{s}}209 ; \delta = +4^{\circ}45'28'',19 \text{ (J2000)}.$$

As coordenadas geocêntricas médias da data são obtidas aplicando a correção da precessão:

$$\alpha = 17^{\text{h}}58^{\text{m}}51,^{\text{s}}025 ; \delta = +4^{\circ}45'24'',96 \text{ (data)}.$$

E, finalmente, as coordenadas geocêntricas verdadeiras são obtidas aplicando a correção da nutação:

$$\alpha = 17^{\text{h}}58^{\text{m}}50,^{\text{s}}068 ; \delta = +4^{\circ}45'20'',68 \text{ (data)}.$$

A partir deste ponto poderíamos calcular as coordenadas aparentes topocêntricas para um observador na superfície da Terra, dada suas coordenadas geográficas.

4.1 Introdução

A astronomia é tão antiga quanto a História. Contudo, no início, a astronomia tratava apenas de observações e da previsão de alguns fenômenos celestes de forma puramente empírica. Não havia a preocupação em criar-se teorias que explicassem os fenômenos observados. Isto não impediu que civilizações na Babilônia, China, Egito, México, etc..., desenvolvessem um conhecimento sofisticado do movimento aparente do Sol, da Lua e dos planetas.

Foi somente a partir do século VIII A.C., na Grécia, que verdadeiras teorias cosmológicas começaram a serem criadas com o intuito de não apenas descrever as observações mas explicá-las a partir de princípios básicos. É claro, não podemos esquecer que foram as observações acumuladas por séculos pelos povos da Mesopotâmia e do Egito que possibilitaram de maneira fundamental o desenvolvimento da astronomia como ciência na Grécia clássica.

É importante lembrar que a evolução das ideias astronômicas não evoluem de maneira linear, isto é, algumas ideias surgem para depois desaparecerem e apenas muito tempo depois voltarem; as vezes conceitos contraditórios surgem ao mesmo tempo para que um, nem sempre o fisicamente correto, prevaleça. A figura 4.1 nos dá uma linha do tempo dos principais filósofos e astrônomos gregos que contribuíram para a astronomia.




Figura 4.1: Linha do tempo do principais filósofos da Grécia clássica que tiveram destaque na astronomia.

4.2 Grécia clássica

4.2.1 Escola jônica

Grande parte do nosso conhecimento do pensamento e filosofia da Grécia pré-socrática (anterior a cerca de 400 A.C.) são de segunda mão: em muitos casos são traduções ou comentários feitos por autores mais recentes que chegaram a nós de maneira muito fragmentada.

O que se sabe das ideias do filósofo jônico **Tales de Mileto** (~ 624–547 A.C.) vieram de relatos de terceiros. Ele acreditava que a Terra fosse um disco circular achatado flutuando como uma madeira em um oceano cuja a água seria o princípio de tudo e limitado pela abóbada celeste. Chega a ser surpreendente que Tales tenha sido capaz de prever um eclipse do Sol

(como se alega) tendo a concepção de mundo que tinha. Se realmente ele pôde prever este eclipse, talvez isto tenha sido uma consequência do conhecimento adquirido em suas viagens pelo Egito.

Um contemporâneo de Tales, **Anaximandro** (~ 611–546 A.C.) é reputado por ter introduzido a utilização do *gnômon* (conhecer em grego; é uma vareta do relógio solar utilizada para se medir o azimute e a altura do Sol através de sua sombra) na Grécia. Anaximandro acreditava que a Terra deveria estar em equilíbrio no centro do Universo pois nesta posição a Terra não cairia em lugar algum. A Terra seria um cilindro e o céu seria esférico (e não um hemisfério), formado por várias camadas a distâncias diferentes, onde o Sol se encontraria na mais distante e as estrelas fixas na camada mais próxima. A Lua estaria numa camada intermediária. Isto mostra que Anaximandro desconhecia o fenômeno de ocultação das estrelas pela Lua (o que só é possível se a Lua estiver mais próxima que as estrelas), mas tem o mérito da introdução da ideia de distância dos astros à Terra.




Figura 4.2: Universo de Anaximandro. A Terra fica no centro do Universo, as estrelas são furos em uma esfera sólida, por onde escapa a luz. Em seguida vem um anel com a Lua e um anel mais distante com o Sol.

Anaxímenes de Mileto (585–526 A.C.), também da escola jônica, acreditava que as estrelas estariam “pregadas” na esfera celeste, que seria um sólido cristalino, e a Terra seria um disco achatado flutuando no ar. Esta era a visão de **Leucipo de Mileto** (~ 480–420(?) A.C.), onde a Terra é o hemisfério de uma esfera e, acima, o ar preenche o hemisfério superior (Fig. 4.3). Neste caso, as estrelas preenchem a última esfera.

Assim, para a escola jônica, a Terra era um disco achatado que estaria flutuando no Universo ou no seu centro, as estrelas eram “pregadas” na abóbada celeste e os planetas eram mencionados apenas superficialmente. Todos os astros seriam derivados de substâncias primárias (como o ar, fogo e água).

4.2.2 Escola eleática

A escola eleática foi fundada por **Xenofanes de Colophon** (~ 570–478 A.C.) e desenvolvida por **Parmênides** (nascido em Elea 504–450 A.C.). Esta é a época em que Atenas foi o maior centro filosófico do mundo antigo.

Xenofanes acreditava em uma Terra plana e sem limites, ancorada no infinito, com o ar acima também infinito. O Sol, estrelas e cometas seriam “nuvens” condensadas nesta atmosfera. A trajetória dos astros deveria ser retilínea sendo que, a aparência circular do movimento diário seria uma ilusão devida à distância que nos separa destes astros.




Figura 4.3: Modelo de Universo de Leucipo. A Terra é uma semi-esfera e os astros são fixados em esferas concêntricas transparentes.

Apesar da influência de Xenofanes, Parmênides acreditava que a Terra era uma esfera o que foi sem dúvida um dos maiores passos no avanço da ciência. Ele foi provavelmente o primeiro a dividir a Terra em cinco zonas: uma tropical (ou tórrida), duas temperadas e duas glaciais. A noção de esfericidade provavelmente surgiu a partir dos relatos de viajantes que descreviam estrelas visíveis no Sul (Egito, por exemplo) mas invisíveis na Grécia como a brilhante Canopus (declinação $\approx -52^\circ 42'$) ou estrelas que se tornam circumpolar quando viajamos para o norte. Também eram relatados mudanças na duração do dia; no verão, os dias eram mais “longos” nas regiões mais ao norte. Parmênides também considerava o Universo como uma série de camadas esféricas concêntricas, com a Terra no centro. Ele também sabia que as “estrelas” vespertina e matutina (ou estrela d’alva) eram o mesmo objeto (que hoje bem sabemos, é Vênus) e que a Lua brilhava graças à luz do Sol. Finalmente, ele acreditava que o Sol e a Lua seriam formados por matéria que havia se desprendido da Via Láctea (o Sol feito por matéria quente e a Lua, fria). Curiosamente, como Anaximandro, Parmênides acreditava que as estrelas estariam mais próximas da Terra que o Sol e a Lua.

Notemos apenas que, nesta mesma época (século V A.C.), surgiram as teorias da matéria composta por átomos (minúsculas partículas indivisíveis, a chamada *teoria atomista*) defendidas por Leucipo (já citado acima), Empédocles e Demócrito (que foi aluno de Leucipo).

Nascido na ilha de Chios (Quios em português) **Oenopides** viveu em Atenas durante o século V A.C. A ele é atribuído a primeira determinação quantitativa da obliquidade da eclíptica (inclinação do eixo de rotação terrestre) por volta de 450 A.C.

Nesta mesma época, **Hipócrates de Quios** (que também viveu em Atenas) especulava sobre a natureza dos cometas e da Via Láctea. Sua ideia era que existia apenas um cometa que sempre voltava para a Terra.

4.2.3 Escola pitagórica

A escola pitagórica foi fundada por **Pitágoras** (nascido em 580 A.C. em Samos e morto em Metaponto por volta do ano 497 A.C.) no sul da Itália mais ou menos na mesma época do florescimento da escola eleática. Da mesma forma que a maioria de seus contemporâneos, nada do que foi feito por Pitágoras chegou a nós diretamente. A escola pitagórica teve grande influência no pensamento do mundo antigo não apenas pela sua longevidade (cerca de dois séculos como

escola propriamente dita e até o século II D.C. haviam seguidores da escola pitagórica) como também pelo fato de seu membros terem uma participação política importante.

A principal ideia da filosofia de Pitágoras era de que o Universo era governado pela matemática. A regularidade dos movimentos celestes e os intervalos regulares das harmonias musicais levou os pitagóricos à conclusão de que cada um dos planetas, assim como as estrelas, estariam em esferas cujo movimento produziriam uma nota musical. Esta música celestial seria, é claro, impossível de ser escutada pelos seres humanos.

Segundo Pitágoras, o Universo seria formado de quatro elementos (terra, água, ar e fogo), tendo uma forma esférica assim como a Terra, também esférica e localizada no centro. É possível que tenha sido Pitágoras o primeiro a utilizar a palavra “cosmo” (em grego, *κόσμος*) para designar o firmamento. Pitágoras também reconheceu que as “estrelas” matutina e vespertina eram o mesmo corpo celeste (Vênus), que a Lua brilhava refletindo a luz solar e que os planetas tinham uma trajetória inclinada em relação ao equador celeste (o que hoje em dia explicamos pelo fato dos planetas do sistema solar estarem praticamente confinados a um plano, o plano da eclíptica).

Foi provavelmente na escola pitagórica que o movimento de oeste para leste dos planetas foi descoberto (para a escola jônica, acreditava-se que os planetas se moviam de leste para oeste mas as vezes mais lentamente que as estrelas fixas).

Filolau (ou Philolaus, nascido no sul da Itália por volta de 480 A.C.), discípulo de Pitágoras, foi provavelmente o primeiro filósofo grego a sugerir que a Terra não se encontra no centro do Universo. Segundo Filolau, no centro do Universo existiria um fogo central chamado Héstitia (*Ἑστία*). A Terra (esférica) giraria diariamente em torno deste fogo central, mostrando sempre a mesma face, o lado não habitável; a Europa e o mundo conhecido dos gregos ficaria do lado oposto ao fogo central. É interessante notar que, apesar da teoria de Filolau implicar na rotação da Terra em torno de seu eixo, ele não reconheceu este fato explicitamente. A Lua, o Sol e os planetas também girariam em torno de Héstitia, além da órbita terrestre. A partir do fogo central nós teríamos a Terra, a Lua, o Sol, Vênus, Mercúrio, Marte, Júpiter e Saturno.

Filolau também supôs a existência de uma ‘anti-Terra’, um mundo que eventualmente se localizaria entre a Terra e o fogo central (portanto invisível da Europa). A conjectura desta anti-Terra foi motivada em parte pelo fato do número dez ser considerado perfeito pelos pitagóricos. Deveria haver, portanto, dez corpos no Universo – a Terra, a Lua, o Sol, os cinco planetas conhecidos e a esfera das estrelas fixas somavam apenas nove.

4.2.4 Sistema de Eudoxo

O matemático e filósofo **Eudoxo** nasceu em Cnidus, na Ásia Menor por volta do ano 408 A.C. e morreu em 355 A.C. Eudoxo viajou muito, estudando vários meses com Platão (Atenas 427–347 A.C.), passando mais de um ano no Egito e na volta construiu um observatório próprio. Ele foi o primeiro a propor um ciclo solar de 4 anos, com três anos de 365 dias e um ano de 366, ciclo este que somente foi posto em prática pela primeira vez por Júlio César (o calendário Juliano) cerca de 3 séculos mais tarde. Ele também contribuiu para as primeiras descrições sistemáticas das constelações.

Mas a maior contribuição de Eudoxo foi o seu sistema de *esferas homocêntricas* (de mesmo centro), que daria uma explicação teórica aos movimentos irregulares dos astros. De acordo com os paradigmas da época, Eudoxo acreditava que cada planeta, o Sol e a Lua estavam fixados em esferas, com a Terra no centro. Além disto, o único movimento permissível seriam circulares e regulares (as esferas de cada astro girariam uniformemente).

A inovação de Eudoxo foi supor que cada planeta estaria ligado a várias esferas homocêntricas, e não apenas uma. Cada uma destas esferas giraria de forma uniforme, mas a composição

de seus movimentos (que seriam independentes) produziria o movimento irregular observado. Se Eudoxo acreditava ou não na existência física destas esferas, não sabemos.

Para os planetas, Eudoxo imaginou quatro esferas: a primeira que gira em um dia tendo um eixo polar (isto reproduz o movimento diário de leste para oeste); uma segunda esfera cujo eixo seria perpendicular à eclíptica com rotação oposta à primeira (responsável pelo fato dos planetas percorrerem a eclíptica de oeste para leste, e não o equador celeste). Uma terceira esfera é necessária para produzir o movimento retrógrado dos planetas e a quarta esfera, ligada à terceira, seria responsável pela pequena inclinação dos planetas em relação à eclíptica. Para o Sol e a Lua, apenas três esferas homocêntricas eram necessárias (figura 4.4).




Figura 4.4: Movimento do Sol segundo a teoria das esferas homocêntricas de Eudoxo. As esferas têm mesmo raio e foram desenhadas desta forma para maior clareza. A primeira esfera (mais externa no desenho), é responsável pelo movimento aparente diário; as duas outras esferas reproduzem o movimento aparente anual do Sol. A inclinação da terceira esfera (mais central) é igual à obliquidade da eclíptica. A Terra fica imóvel no centro.

Apesar de sofisticada, a teoria de Eudoxo era capaz apenas de explicar o movimento dos planeta de modo aproximado; no caso de Marte a teoria das esferas homocêntricas apresentava grandes divergências. Contudo, esta teoria podia explicar relativamente bem as diferenças de duração das estações do ano. Dado o estado das observações da época, esta teoria foi sem dúvida um marco na astronomia de posição.

4.2.5 Sistema de Aristóteles

Aristóteles (Stagira, Macedônia 384–322 A.C.), foi discípulo de Platão (e tutor de Alexandre Magno da Macedônia), mas no fim da vida desenvolveu seu trabalho em direções menos espirituais que as de seu mestre (o qual dizia que as ideias e os espíritos são o mundo real, e os fenômenos visíveis uma simples representação grosseira do mundo espiritual). É graças a Aristóteles que nós conhecemos muito da Grécia pré-socrática.

Aristóteles acreditava que o Universo era esférico e finito, composto por quatro elementos básicos: água, terra, fogo e ar. A Terra, esférica, ocupava a posição central e era imóvel. Aristóteles também acreditava que os planetas estivessem fixados em esferas e adotou o sistema de esferas homocêntricas de Eudoxo. Contudo, Aristóteles acreditava que estas esferas eram reais, feitas por cristais transparentes. Aristóteles ainda desenvolveu o sistema de Eudoxo acrescentando mais esferas a alguns planetas (em particular Marte), melhorando assim o acordo entre observação e teoria. O modelo de Universo de Aristóteles (Fig. 4.5) conheceu um tal sucesso

que, ainda hoje, quando fazemos referência ao modelo onde a Terra está imóvel no centro do Universo, dizemos *modelo aristotélico*.




Figura 4.5: Universo aristotélico. A Terra fica imóvel no centro e os astros celestes estão colados em esferas concêntricas.

Além disto, Aristóteles compreendia que as fases da Lua dependiam de quanto a Lua é iluminada pelo Sol, em relação a um observador na Terra. Também explicou que os eclipses do Sol ocorrem devido à ocultação deste pela Lua. Da mesma forma, um eclipse da Lua ocorreria quando esta passa pela sombra da Terra. Observando que a sombra da Terra projetada na Lua era esférica, Aristóteles dava outro argumento para a esfericidade da Terra. Como Parmênides, Aristóteles também argumenta sobre a esfericidade terrestre notando que algumas estrelas visíveis do Egito, não o são da Grécia. Aristóteles chega mesmo a citar o trabalho de matemáticos (infelizmente sem citar os nomes) que estimam em 400.000 *stadia* (~ 63.000 km) a circunferência da Terra.

4.3 Sistema híbrido de Heráclides

Heráclides Ponticus (de Pontus) viveu entre c. 388–315 A.C., sendo portanto contemporâneo de Aristóteles. Apesar de nascido em Heráclea, logo imigrou para Atenas, onde talvez tenha tido contato com Platão. Provavelmente ele também foi influenciado pelos pitagóricos.

Contrariamente aos seus contemporâneos, Heráclides explicava o movimento diário dos astros dizendo que a Terra girava em torno dela mesma em torno de um eixo que passava pelos polos celestes. Infelizmente, foi a visão de Aristóteles, isto é, de uma Terra imóvel, que prevaleceu nos séculos que vieram.

Mas a maior contribuição de Heráclides diz respeito às órbitas dos planetas. Sempre houve muita controvérsia sobre as posições de Mercúrio e Vênus: alguns autores colocavam-nos acima do Sol; outros os colocavam entre a Lua e o Sol. Um meio termo foi encontrado por Heráclides colocando estes dois planetas não em órbita em torno da Terra, mas em torno do Sol. Estes planetas girariam em círculos em torno do Sol que, por sua vez, giraria em torno da Terra (como os demais planetas e a Lua). Isto explicava entre outras coisas a presença destes dois planetas sempre próximos do Sol.

4.3.1 Aristarco

O matemático **Aristarco**, nascido em Samos (c. 310–230 A.C.), foi influenciado pelas ideias de Heráclides e foi sem dúvida o primeiro a defender claramente a ideia de que o Sol estava

no centro do Universo. A Terra e os demais planetas girariam em círculos em torno do Sol. Como Heráclides, o movimento diário dos astros era explicado por Aristarco devido à rotação da Terra em torno de seu eixo.

Tanto o modelo geocêntrico de Aristóteles como o heliocêntrico de Aristarco davam conta das observações disponíveis nesta época. A preferência pelo modelo geocêntrico foi mais motivada por razões místicas, religiosas e ideológica do que argumentos científicos.

Aristarco também contribuiu para o estudo das distâncias e tamanho da Lua e do Sol. Apesar dos resultados errôneos – por exemplo, ele dava a distância do Sol igual a cerca de 20 vezes a distância da Lua à Terra – seus métodos estavam teoricamente corretos.

4.3.2 Eratóstenes

Eratóstenes de Cirena (276–194 A.C., contemporâneo de Arquimedes) foi um dos primeiros diretores da Biblioteca de Alexandria. Eratóstenes foi o primeiro a medir precisamente o diâmetro da Terra por volta de 240 A.C. Antes desta medida, já havia aquela dada por Aristóteles e uma outra citada por Arquimedes (isto é, não foi ele o autor da medida) dando o valor de 300.000 *stadia*¹

Eratóstenes sabia que na cidade de Siena (atualmente Assuã, próximo à primeira catarata do Nilo, no Egito), um gnômon não produzia sombra ao meio-dia (verdadeiro) do dia do solstício de verão (em outras palavras, Siena se encontra praticamente no trópico de Câncer). Por outro lado, também no solstício de verão, o Sol não se encontra exatamente na vertical em Alexandria, mas a cerca de 7;2 do zênite (ou 1/50 de circunferência). Eratóstenes concluiu que Alexandria deveria estar a 1/50 da circunferência da Terra ao norte de Siena, ou seja, a diferença em latitudes das duas cidades seria 7;2. Por outro lado, Eratóstenes conhecia a distância entre estas duas cidades, cerca de 5000 *stadia* e sabia que elas se encontravam praticamente no mesmo meridiano (na realidade há uma diferença de ~ 2;5 em longitude, isto implica em um erro de ~ 4% na medida da circunferência da Terra). Por uma simples regra de três, Eratóstenes concluiu que a circunferência total da Terra seria $50 \times 5000 = 250.000$ *stadia* (Fig. 4.25, página 127). Este valor foi posteriormente mudado para 252.000 *stadia*.

A questão é, quanto valia exatamente um *stadium*, já que esta unidade tinha valores diferentes em diferentes momentos da História e para diferentes povos. Se o valor de um *stadium* é 158 metros (possível valor usado no Egito, na época de Eratóstenes), então a circunferência da Terra teria ~ 39.700 km, valor muito próximo da circunferência polar medida hoje em dia, 39.940,6 km.

Eratóstenes também determinou mais precisamente o valor da inclinação do eixo terrestre, a obliquidade da eclíptica, $\varepsilon = 23^\circ 51'$ (o valor na época era $\varepsilon = 23^\circ 43' 30''$).

4.3.3 Aglaonice de Thessália

Aglaonice ou Aglaonike (final do século II A.C.?) é citada por Plutarco como uma astrônoma que sabia prever com acurácia os eclipses lunares. Este conhecimento de Aglaonice sugere que ela conhecia o ciclo de saros. Ela é provavelmente a primeira astrônoma que se tem registro histórico.

4.4 Hiparco

Hiparco de Nicea, que viveu entre cerca de 190 a 126 A.C., na maior parte do tempo na ilha de Rhodes, é considerado o mais importante astrônomo da Grécia antiga. Ele fez observações

¹O *stadium* (pl. *stadia*) é uma unidade de comprimento usada na Antiguidade. Devido a uma falta de padronização, a conversão entre stadium e metro é incerta, podendo ser equivalente desde ~ 150 até ~ 210 metros.

durante 33 anos em seu observatório, onde realizou medidas muito mais precisas que até então eram disponíveis e foi responsável por importantes inovações teóricas na astronomia.

Hiparco descobriu a precessão dos equinócios, mostrando que as coordenadas das estrelas variavam sistematicamente quando eram dadas em relação ao ponto vernal. Pelo mesmo raciocínio, ele explicou que a duração do ano não dependia do retorno das estrelas à mesma posição (ano sideral), mas sim da recorrência das estações, isto é, a recorrência de um dado solstício ou equinócio (ano trópico). Ele chegou a dar a duração do ano trópico como 365 dias e um quarto, diminuído de $\frac{1}{300}$ de dia, valor muito próximo do valor real. Ele interpretou corretamente este fato como devido ao movimento retrógrado, regular e contínuo, do ponto vernal.

Hiparco também confirmou o valor da obliquidade da eclíptica obtido por Eratóstenes, concebeu novos métodos para se medir a distância da Lua à Terra utilizando os eclipses do Sol e da Lua e produziu o primeiro catálogo de estrelas com 850 objetos, listando a latitude e a longitude em coordenadas eclípticas. As estrelas eram divididas segundo seu brilho em 6 ‘magnitudes’, sendo a 1^a magnitude as estrelas mais brilhantes e a 6^a, correspondendo às estrelas mais fracas. O sistema atual de magnitudes é muito semelhante ao sistema de Hiparco.

4.4.1 Gêmino de Rhodes

Após Hiparco, a astronomia grega entra em um período de decadência, quando as inovações e pensamentos originais diminuem. Temos, contudo, astrônomos que compilam o conhecimento da época de forma didática e cuja obra tem um alcance considerável. Este é o caso de **Gêmino de Rhodes** (~ 130 A.C. – 60 A.C. ou ~ 10 A.C. – 60 D.C. segundo a fonte); pouco se sabe sobre este grego (apesar do nome latino) que viveu na ilha de Rhodes e publicou “Introdução aos Fenômenos”. Este livro cita desde os dados colhidos na Babilônia até autores como Eudoxo e Eratóstenes. Gêmino descreve o céu e chama a atenção para o fato de que as estrelas fixas não estão situadas na superfície da esfera celeste, mas estão a distâncias diferentes. Ele conclui que nossa visão não pode distinguir estas distâncias e por isto a diferença entre estas distâncias é imperceptível.

4.5 Sistema de epiciclos: Ptolomeu

A teoria dos epiciclos surgiu gradualmente, talvez começando com a ideia de composição de movimentos de Eudoxo, a partir do final do século III A.C. A motivação observacional desta teoria estava no movimento aparente dos planetas, ora direto, ora retrógrado, e estacionário quando passa de direto para retrógrado (chamado ‘estações’ do planeta). **Apolônio** de Perga (~ 262–190 A.C.) foi o primeiro a dar uma forma rigorosa à teoria dos epiciclos por volta de 230 A.C. (Fig. 4.6, à esquerda). Apolônio discorreu sobre as seções cônicas (veja na seção 5.3.1) e propôs um sistema de mundo onde os planetas giravam ao redor do Sol e o Sol ao redor da Terra.

Na verdade, a semente do pensamento que levou ao sistema de epiciclos já aparecia no sistema híbrido de Heráclides, onde os planetas inferiores giravam em torno do Sol que, por sua vez, girava em torno da Terra. No sistema de epiciclos, contudo, os planetas não giravam em torno de um corpo ou ponto material: não havia nada no centro dos epiciclos.

Hiparco foi o responsável pelo desenvolvimento e aprimoração da teoria proposta por Apolônio, com a introdução do conceito de excentricidade, isto é, a Terra não estava no centro do deferente (Fig. 4.6, no meio). Hiparco também notou que, para que o epiciclo seja sempre menor que o deferente (um requisito da teoria), era necessário introduzir epiciclos suplementares para cada planeta (Fig. 4.6, à direita).




Figura 4.6: Sistema de epiciclos. **Esquerda:** a Terra se encontra no centro do círculo (deferente) onde o epiciclo orbita. O planeta por sua vez gira em torno do ponto C , centro do epiciclo. **Meio:** Hiparco notou que, para levar em conta a velocidade variável no movimento anual do Sol, a Terra deveria ser deslocada do centro do deferente (E). Isto é, existe uma excentricidade na posição da Terra (ainda hoje se emprega este termo quando nos referimos a elipses, cujo centro não coincide com o foco). **Direita:** Para poder explicar precisamente todas as irregularidades das órbitas dos planetas, Ptolomeu introduziu epiciclos que giram em torno de epiciclos.

4.6 Sistema geocêntrico de Ptolomeu

Cláudio Ptolomeu, o último dos grandes astrônomos gregos da Antiguidade, viveu entre cerca de 85 a 165 D.C., na maior parte do tempo em Alexandria. Entre outras coisas, Ptolomeu estendeu o catálogo de Hiparco, acrescentando cerca de 130 estrelas e aumentando a precisão das medidas das coordenadas. O catálogo original foi perdido, mas traduções sobreviveram até nós graças aos astrônomos árabes. Por isto o catálogo de Ptolomeu é conhecido como *Almagesto*, do árabe *Al-majisti*, uma corruptela do grego *μεγίστη* (“magiste”, magistral).

Foi Ptolomeu quem deu a forma definitiva para o sistema geocêntrico do Universo, baseado na teoria dos epiciclos, e foi com esta forma que este sistema de Mundo sobreviveu até o século **XV**. Graças às suas novas observações e habilidade com a geometria, ele melhorou consideravelmente a precisão da teoria dos epiciclos.

O sucesso do sistema de Ptolomeu vem da precisão e relativa facilidade em se prever a posição dos planetas, Sol e Lua. No entanto, com o passar do tempo, a qualidade das observações foram aumentando e para que esta teoria continuasse a funcionar era necessário muitas vezes acrescentar alguns epiciclos a mais para um dado planeta.

Uma versão simplificada do sistema de Ptolomeu (Fig. 4.7) pode ser descrita da seguinte maneira: o raio dos epiciclos dos planetas internos, Mercúrio e Vênus são definidos pela *elongação máxima* (as configurações planetárias será visto na seção 4.9) que estes planetas podem ter (cerca de 28° para Mercúrio e 47° para Vênus). O centro do epiciclo destes planetas estão sempre alinhados com o Sol. Já para os planetas externos, o período de translação do planeta ao longo do círculo do epiciclo é igual ao período de translação do Sol ao redor da Terra, um ano. Isto ocorre para que as laçadas dos planetas externos (veja Fig. 1.9 na seção 1.3) ocorram com a frequência e na posição corretas. Como consequência, o raio que liga o centro do epiciclo ao planeta externo é sempre paralelo à direção Terra–Sol.

É interessante notar que, do ponto de vista matemático, não há nenhum problema intrínseco com a teoria de epiciclos. Na verdade, esta teoria nada mais é do que uma representação em série de funções circulares (senos e cossenos) da posição dos planetas. Na mecânica celeste atual, é desta maneira que representamos as posições dos planetas, Lua e Sol, com a diferença




Figura 4.7: Sistema de Ptolomeu mostrando a relação entre as posições dos epiciclos de Mercúrio e Vênus alinhado com a direção Terra–Sol, assim como os raios dos epiciclos dos planetas externos paralelos à direção Terra–Sol.

de que a série de funções circulares é obtida com a teoria da gravitação universal e não de forma puramente empírica.

O problema da teoria de Ptolomeu estava na interpretação física. O fato dos planetas girarem em séries de epiciclos em torno de nada não tem sentido fisicamente em um referencial inercial. Fenômenos como a aberração e a paralaxe (desconhecidos na época) também são incompatíveis com o Universo geocêntrico.

Por outro lado havia o problema de que, seguindo os princípios gregos (e sustentados ferozmente pela toda poderosa igreja católica medieval) o círculo era a única forma geométrica perfeita e os epiciclos só poderiam ser compostos de círculos (e não elipses, por exemplo) e o movimento em cada epiciclo deveria ser uniforme. Além disto, a Terra, como obra divina, só poderia estar no centro do Universo, e não perambulando por aí. Foram estes vínculos que, durante séculos, obrigavam Ptolomeu e seus seguidores a complicar a teoria dos epiciclos a cada novo avanço das observações para poder explicá-las.

4.7 Entre Ptolomeu e Copérnico

A ciência Helênica, que já estava perdendo seu vigor desde a época de Hiparco, deixa de ter um papel importante acompanhando a queda do império Romano na Europa ocidental (século V D.C.). **Téon de Alexandria** (ou Theon, 335–405?) foi um dos últimos estudiosos da Grécia Clássica a reeditar e comentar os trabalhos de Euclides e Ptolomeu. Sua filha, **Hipátia** (355?–415) está entre as primeira mulher de destaque na Astronomia chegando a ser diretora da escola neoplatônica em Alexandria. Ela foi tristemente assassinada por uma multidão de cristãos fanáticos.

O último trabalho de destaque foi a enciclopédia de **Marciano Capella** (~ 400–450?) publicada por volta de 420, alguns anos após o saque de Roma pelos Visigodos liderados por Alarico I. Nesta enciclopédia o destaque é o modelo geocêntrico com a exceção de Mercúrio e Vênus que estariam em órbita ao redor do Sol (como o modelo híbrido de Heráclides). A enciclopédia de Capella foi importante e discutida durante o período de Carlos Magno, quatro séculos mais tarde.

4.7.1 Astronomia fora da Europa

Cerca de 2 séculos depois do início da expansão islâmica em 632 D.C., a Astronomia se desenvolve com vigor no mundo árabe. Em um primeiro momento, até meados do séc. IX D.C. a cultura islâmica absorve e traduz tratados gregos e indianos versando sobre astronomia, matemática e geometria. Em particular é feita a tradução árabe da obra de Ptolomeu, *Almagesto* (e, por isto, é conhecida por nós pelo seu nome árabe). Em 830, **Muhammad al-Khwarizmi** (~ 780–850?) de cultura Persa, publica a primeira obra de impacto da astronomia islâmica, o *Zij al-Sindh* (*Zij* significa um manual de astronomia). Neste livro, estão resumidos conceitos matemáticos e astronômicos indianos e gregos.

A astronomia de posição está intimamente ligada à religião islâmica pois, em suas orações, o muçulmano deve se posicionar na direção de Meca. Esta direção, um ângulo azimutal medido a partir do norte, é chamado *Qibla* e é determinado com métodos astronômicos. O *Qibla* aponta para a direção mais curta, isto é, para o segmento de grande círculo que liga a Meca ao local da prece (veja Seção 1.7.1).

Ahmad al-Fargani (~ 800?–861), nascido no atual Uzbequistão escreveu “Elementos de Astronomia sobre movimentos celestes” em Bagdá onde, além de resumir o trabalho de Ptolomeu, atualiza algumas das constantes astronômicas e posições de estrelas. Seus livros chegaram à Europa onde foram traduzidos em Latim.

Por volta do ano 900, **Muhammad al-Battani** (853–929, na Europa conhecido como Albatenus) determina com precisão de segundos a duração do ano trópico e descobre o movimento do periélio da órbita terrestre, isto é, a precessão da órbita terrestre (não confunda com a precessão do eixo da Terra).

Abd al-Rahman (903–986, dito **al-Sufi**, isto é, o Sábio) publica em 964 um extenso e preciso catálogo de estrelas com desenhos de constelações onde figura pela primeira vez a galáxia de Andrômeda. **al-Sufi** também menciona o que pode ser a Grande Nuvem de Magalhães, galáxia irregular vizinha da Via Láctea visível a partir do Sul do Península Arábica (ao sul do paralelo 15° N).

Ibn al-Haytham (964–1040) nascido na Pérsia, escreveu no Egito o *Kitab al-Manazir*, o Livro de Óptica, um precursor da óptica física de grande influência na Idade Média.

O iraniano **Abu al-Biruni** (973–1048) se especializou em instrumentação astronômica, escrevendo tratados sobre a esfera armilar, o astrolábio e o planisfério. Para **al-Biruni**, além da Terra esférica e em rotação ser um modelo natural de Universo, ele imaginava que todos os corpos tenderiam a cair para o centro da Terra.

Abu Ishaq Ibrahim ibn Yahya al-Zarqali (1029–1087), conhecido como **al-Zarkali** ou **Arzachel** nasceu e viveu a maior parte do tempo em Toledo. Após a conquista da cidade pelo rei de Castilha, Alfonso VI em 1085, **al-Zarkali** vai para Córdoba. Colaborou de forma importante na produção das *Tábuas de Toledo*, com previsões das posições dos planetas, Lua e Sol. Também determinou com precisão o movimento (precessão) do apogeu solar (a posição em que a Terra se encontra mais distante do Sol). Seus trabalhos foram traduzidos e citados, entre outros, por Geraldo de Cremona, Regiomontanus e Copérnico.

Ibn Rochd de Córdoba (conhecido como **Averróis** ou Alverroes, 1126–1198) nascido na Andaluzia teve uma grande influência na Europa Medieval com seus textos e traduções de obras gregas clássicas, com ênfase em lógica, medicina e astronomia. Defendia um modelo de Universo estritamente concêntrico. **Averróis** desenvolveu uma versão primitiva do conceito de inércia dos corpos em movimento. Acusado de heresia no final da vida, morre no exílio no Marrocos.

Nascido no Marrocos, **Nur ad-Din al-Bitruji** (meados do século XII–1204, era conhecido na Europa com o nome latinizado **Alpetragius**) viveu na Andaluzia onde apresentou o primeiro modelo planetário geocêntrico da Idade Média como uma alternativa ao sistema

de Ptolomeu. A originalidade do seu trabalho vem da procura de uma razão física para o movimento dos astros.

Em 1270, **Nasir al-Din al-Tusi** (1201–1274), argumenta sobre a rotação da Terra utilizando a observação da paralaxe de cometas. No livro *Zij-i Ilkhani*, publica o mais sofisticado modelo de movimento dos planetas até então. Nasir al-Tusi foi diretor do importante observatório de Maragheh (hoje no Irã), construído por ordem do neto de Genghis Khan.

Muhammad Taragi ibn Shah-Rukh ibn-Timur, mais conhecido como **Ulugh Beg** (ou Bek, ~ 1394–1449), neto de Tamerlão, construiu o maior observatório até então em Samarcanda (hoje no Uzbequistão) no final da década de 1420, baseado no observatório de Maragheh. Lá foram catalogadas cerca de 1000 estrelas, com várias correções em relação a catálogos mais antigos.

4.7.2 Precursores da revolução copernicana

Aos poucos, principalmente após o século **X**, o conhecimento astronômico do mundo islâmico penetra na Europa por Constantinopla (Istambul, Turquia) e, principalmente, através da Espanha.

Geraldo de Cremona (1114?–1187) traduz pela primeira vez o *Almagesto* diretamente do Árabe para o latim, além de outros trabalhos sobre ciências desenvolvidas no Islã.

Robert Grosseteste (1175?–1253) bispo inglês, produziu vários tratados científicos. Por volta de 1225, Grosseteste publica o livro “*De Luce*” (sobre a luz) onde argumenta sobre a origem das esferas celestes (onde se encontram os astros) devido a uma possível interação entre luz e matéria. Em seu cenário cosmológico, o Universo começa com uma explosão, seguido de uma condensação da matéria.

Michael Scot (1175?–1232) filósofo e médico nascido no sul da Escócia, passou pelas Universidades de Oxford e de Paris antes de se estabelecer em Toledo, Espanha (naquela época próximo da fronteira da Espanha islâmica). Sua maior contribuição foi a tradução e crítica de textos árabes, de Alpetragius e Averróis, principalmente relacionados aos trabalhos de Aristóteles.

João de Sacrobosco (1195?–1256?) nascido possivelmente na Inglaterra, foi o autor de uma das obras de astronomia mais populares da Idade Média, o *Tratado da Esfera* (1230), o primeiro livro de Astronomia a ser impresso (em 1472). Este livro, didático e bem ilustrado, explicava fenômenos como os eclipses, o sistema de Ptolomeu e argumentava sobre a esfericidade da Terra e da esfera celeste, e foi utilizado e reproduzido com frequência até o século **XVIII**.

Campano de Novara (1220–1296), matemático italiano, escreveu a primeira obra européia sobre planetários (movimento dos planetas) e se interessou pela descrição geométrica do movimento retrógrado dos planetas.

Guilherme de São Clodoaldo (Guillaume de Saint-Cloud, fim do séc. **XIII**), astrônomo francês publicou em 1292 sua *Tabule Almanach Planetarium* com efemérides do Sol, da Lua e dos planetas. Também descreve o eclipse do Sol (parcial na França) de 04/06/1285.

Nicolas de Oresme (1323–1382), nascido na França, foi um filósofo influente que estudou diversas disciplinas, entre elas física e astronomia. Ele discutiu criticamente as ideias de Aristóteles, discordando do conceito de uma Terra estática. Para Nicolas, a rotação da Terra em torno de um eixo poderia explicar o movimento diurno dos astros.

Nicolau de Cusa (1401–1464) sugeriu que a Terra fosse esférica (o que já era conhecido na Grécia clássica) e que orbitava o Sol. Também sugeriu que as estrelas eram “sois” distantes.

Georg von Peurbach (1423–1461), também escrito Peurbach, foi um astrônomo austríaco autor de um dos primeiros livros impressos, “*Theoricae novae planetarum*”, baseado em

autores árabes como al-Battani e al-Fargani. Seu livro é citado por Copérnico e Kepler e é reeditado até o século XVII.

Johannes Müller de Königsberg conhecido como *Regiomontanus* ou *Monte Regio* (1436–1476), escreveu vários tratados de Astronomia utilizando várias fontes árabes, em particular o *Almagesto*. A partir de 1454, utiliza a então recém inventada imprensa para publicar seus livros e de outros autores, por exemplo, o livro de von Peurbach citado no parágrafo acima. Em 1456, observa o cometa que seria reconhecido mais tarde como cometa de Halley.

Regiomontanus foi convocado a Roma pelo Papa Sisto IV para estudar uma possível reforma do calendário Juliano, que apresentava uma divergência notável com o início das estações do ano. Contudo ele morre antes de completar este trabalho. A reforma do calendário só será feita cerca de um século mais tarde.

4.8 Sistema heliocêntrico de Copérnico

4.8.1 Copérnico

Nicolau Copérnico (Niklas Koppernigk) nasceu em 19/02/1473 em Torun, na Polônia. Em 1491 ele foi estudar na universidade de Cracóvia. Em 1496 ele foi para a Itália estudar direito e em 1501 voltou novamente à Itália para estudar medicina. Durante seus estudos, Copérnico teve contato com a renascença italiana e foi muito influenciado pelo pensamento grego clássico. A ideia de uma Terra que gira em torno de si mesma e que não está no centro do Universo, não era desconhecida de Copérnico.

Sua grande obra, *De revolutionibus orbium caelestium* (“Sobre as revoluções das órbitas celestes”) foi publicada no ano de sua morte, 1543. Neste trabalho, Copérnico refuta os argumentos de Ptolomeu de que a Terra não poderia se mover e estava no centro do Universo. Ptolomeu dizia (com razão) que, se a Terra se movesse, haveria mudança na aparência das constelações (o que chamamos hoje de paralaxe). Mas Copérnico argumentou (também corretamente) que as estrelas deveriam estar muito afastadas, com distâncias muito maiores que o diâmetro da órbita terrestre (ou seja, a paralaxe não é perceptível em observações a olho nu).

O que provavelmente levou Copérnico a adotar o sistema heliocêntrico, onde o Sol estaria imóvel no centro do Universo, foi a complexidade em que se encontrava o sistema de epiciclos na sua época. Devido ao avanço das observações, era necessário um sistema extremamente complexo para poder explicar precisamente o movimento dos planetas. Uma vez que Copérnico se convenceu de que não havia nenhuma contradição com a hipótese de uma Terra em movimento, ele pôde enfim conceber um sistema de mundo muito mais simples que o sistema geocêntrico, capaz de explicar o movimento observado dos planetas, baseado nas ideias gregas antigas (Filolau, Heráclides e, principalmente, Aristarco de Samos).

Em seu sistema heliocêntrico, os planetas giram em torno do Sol em círculos perfeitos e apenas a Lua gira em torno da Terra (Figura 4.8). Além disto, todos os planetas girariam de maneira uniforme e no mesmo sentido. O movimento diário da esfera celeste era explicado simplesmente pela rotação da Terra em torno de seu eixo.

O grande feito de Copérnico não foi apenas recuperar ideias da Grécia antiga e aplicá-las com êxito na descrição do Sistema Solar, mas também ir de encontro a mais de 15 séculos de preconceito contra um Universo onde a Terra poderia mover-se.

4.8.2 Galileu Galilei

Algumas décadas mais tarde, em 1610, **Galileu Galilei** (1564–1642) fez descobertas que enterrariam de vez o sistema geocêntrico. Com a utilização da primeira luneta, Galileu descobriu




Figura 4.8: O sistema solar segundo Copérnico. Os planetas se movem em órbitas circulares em torno do Sol. Para poder prever corretamente a posição dos planetas, Copérnico também precisou introduzir epiciclos em seu sistema Heliocêntrico.

os quatro maiores *satélites de Júpiter* (que claramente não orbitavam a Terra) e as *fases de Vênus* (veja na Fig. 4.9 as diferentes previsões de como seriam as fases dos planetas internos).




Figura 4.9: Esquerda: Fases de um planeta interno (Mercúrio ou Vênus) visto da Terra no modelo heliocêntrico. Direita: Fases de um planeta interno observadas da Terra no modelo geocêntrico. Antes do uso da luneta por Galileu, não era possível distinguir as fases destes planetas.

Mas antes das descobertas de Galileu, durante a segunda metade do século XVI, começou a ficar claro que mesmo o sistema heliocêntrico de Copérnico, com órbitas circulares, não podia explicar em todos os detalhes o movimento dos planetas, em particular de Marte e da Lua. Também era necessária a introdução de epiciclos no sistema heliocêntrico, o que foi feito pelo próprio Copérnico em seu modelo planetário.

4.8.3 Brahe e Kepler

Nesta mesma época, dados de altíssima qualidade foram obtidos pelo astrônomo dinamarquês **Tycho Brahe** (1546–1601). Tycho fez as medidas mais precisas até então da posição de muitas estrelas e, principalmente, dos planetas. Inicialmente, Tycho fez suas observações a partir do observatório de *Uraniborg* (hoje parte da Suécia). Em 1597, Tycho foi forçado a deixar a

Dinamarca e emigrou para Praga (na época parte da Bohemia, Alemanha) onde continuou seu trabalho até morrer.

Além de observações precisas, Brahe propôs um sistema misto geocêntrico mas heliocêntrico para os planetas Mercúrio e Vênus (Fig. 4.10), semelhante ao modelo de Heráclides Ponticus do séc. **IV** A.C.




Figura 4.10: Universo segundo Tycho Brahe, com a Terra no centro mas com Mercúrio e Vênus orbitando o Sol.

Tycho Brahe tinha um brilhante assistente, o alemão **Johannes Kepler** (1571–1630). De família protestante, Kepler aprendeu o sistema de Copérnico na universidade de Tübingen, Alemanha, e tornou-se um adepto do heliocentrismo. Após mudar-se para a universidade de Graz, Áustria, Kepler publicou o livro “*Mysterium Cosmographicum*” onde apresenta seu modelo de Universo heliocêntrico baseado nos *sólidos platônicos* (Fig. 4.11). Estes objetos geométricos são poliedros regulares e convexos (onde todos os lados são iguais e regulares) e existem apenas 5 no espaço tridimensional: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Estudados e descritos por Euclides e Platão, eram considerados sólidos geométricos perfeitos.

O Sistema Solar de Kepler era construído colocando uma esfera central que continha a órbita de Mercúrio. Ao redor desta esfera coloca-se um octaedro e, ao redor do octaedro vem a esfera de Vênus. Em seguida vem um icosaedro inserido em mais uma esfera, a da Terra. Depois temos um dodecaedro e a esfera de Marte, um tetraedro e a esfera de Júpiter e, por fim, um cubo e a esfera de Saturno. Com este arranjo, as órbitas dos planetas têm as seguintes dimensões: 0,4588, 0,7947, 1, 1,2584, 3,7752, e 6,5389 (tomando o raio da órbita da Terra igual a um). Kepler tinha um conhecimento suficientemente bom das distâncias no Sistema Solar para verificar que estas distâncias não correspondiam às observadas, especialmente para os planetas externos. Assim, este modelo dos sólidos platônicos foi logo abandonado.

Mais tarde, nos primeiros anos do século **XVII**, Kepler, após estudar minuciosamente os dados de Tycho Brahe, chegou à conclusão de que os planetas não se moviam uniformemente em círculos (e eventualmente em epiciclos) em torno do Sol, mas simplesmente se moviam em elipses, com o Sol em um dos focos (veremos isto mais abaixo, Seção 5.3).

Finalmente havia-se chegado a um modelo de Universo simples, elegante e extremamente preciso para a época e, como foi visto posteriormente, fisicamente aceitável, como demonstrou a teoria da gravitação universal de **Isaac Newton** (1643–1727), publicada em 1687 no “*Philosophiae naturalis Principia Mathematica*”.




Figura 4.11: Primeiro modelo de Kepler, onde os planetas conhecidos orbitavam em esferas concêntricas. Os raios das esferas são definidos pelas razões entre os sólidos platônicos.

4.9 Configurações planetárias

Chamamos de *configurações planetárias* as posições relativas da Terra, do Sol e de um dos planetas. Na figura 4.12 estão ilustradas as principais configurações planetárias.




Figura 4.12: Configurações planetárias mais importantes. P_e e P_i se referem aos planetas exteriores e interiores, respectivamente. Em parênteses, as seguintes configurações: oposição (op), conjunção superior (cs), conjunção inferior (ci), máxima elongação ocidental (oc), máxima elongação oriental (or), quadratura ocidental (qoc) e quadratura oriental (qor).

No caso dos *planetas interiores*, isto é, planetas mais próximos do Sol do que a Terra (Mercúrio e Vênus), chamamos de *conjunção inferior* quando o planeta se encontra alinhado entre o Sol e a Terra. Note que não podemos observar o planeta neste momento, exceto nas raras ocasiões em que este alinhamento é perfeito e podemos ver a silhueta do planeta atravessando o disco solar. Quando o planeta interior se encontra alinhado com a Terra e o Sol

mas do lado oposto – o Sol se encontra entre o planeta e a Terra – chamamos esta configuração de *conjunção superior*.

A distância angular aparente entre um planeta e o Sol é chamado *elongação*. Este ângulo, para um planeta interno, oscila entre 0° nas conjunções superior e inferior até um certo valor máximo. Estes valores extremos definem as máximas elongações ocidental (a oeste do Sol) e oriental (a leste do Sol), veja a figura 4.13. O momento em que planeta interno está na sua máxima elongação é o momento mais propício para sua observação. Na elongação ocidental, o planeta é visto no fim da madrugada); na oriental, ele é visto no início da noite.




Figura 4.13: Detalhe das configurações planetárias mais importantes. Um planeta interior (P_i) é visível no Leste, pouco antes do nascer do Sol (ou seja, o planeta está a Oeste do Sol – **elongação ocidental**, [oc]), ou visível no Oeste pouco depois do pôr do Sol (ou seja, o planeta está a Leste do Sol – **elongação oriental**, [or]).

Os *planetas exteriores*, aqueles além da órbita terrestre (Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão), nunca estão em *conjunção inferior* (pois eles não podem estar entre a Terra e o Sol) e sua elongação varia entre 0° e 360° . Quando temos o alinhamento Terra–Sol–planeta exterior, chamamos esta configuração de *conjunção superior*, tal qual para os planetas interiores. Nesta configuração, o planeta se encontra na posição mais distante da Terra. Quando o alinhamento é Sol–Terra–planeta exterior, o planeta exterior está em *oposição*. Este é o momento mais propício para observação de um planeta exterior. Na página 160 temos uma lista com as datas de oposições de Marte, Júpiter e Saturno.

Finalmente, quando o ângulo entre o planeta e o Sol é de 90° , chamamos esta configuração de *quadratura*. Esta pode ser oriental ou ocidental, dependendo da posição relativa do planeta ao Sol, a leste ou a oeste, respectivamente.

O intervalo de tempo médio entre duas configurações planetárias idênticas consecutivas (por exemplo, duas oposições de Marte ou duas elongações ocidentais máximas de Vênus) define o *período sinódico* do planeta.

O período sinódico de um planeta está relacionado aos períodos de translação da Terra e do planeta em torno do Sol:

$$\frac{1}{P_{\text{sinód}}} = \pm \left(\frac{1}{P_{\text{Terra}}} - \frac{1}{P_{\text{planeta}}} \right), \quad (4.1)$$

onde o sinal é ‘+’ se o planeta for externo e ‘–’ se o planeta for interno. Veja a Tabela 4.1 com os valores referentes aos planetas do Sistema Solar.

4.10 Eclipses

Um eclipse ocorre quando um corpo deixa de ser visto devido a uma sombra. No caso do *eclipse do Sol*, este deixa de ser visto porque a Lua está entre o observador (na Terra) e o Sol,

Tabela 4.1: Movimento médio dos planetas e períodos siderais e sinódicos em relação à Terra. Valores baseados em Simon et al. (1994), A&A 282, 663.

Planeta	Movimento médio	Per. Sideral [dia (ano)]	Per. Sinódico [dia]
Mercúrio	4.092 °/dia	87.9693 (0.24084)	115.877
Vênus	1.602 °/dia	224.701 (0.61519)	583.921
Terra	0.9856 °/dia	365.256 (1.0000)	—
Marte	0.5240 °/dia	686.980 (1.8808)	779.936
Júpiter	4.985 ′/dia	4332.59 (11.862)	398.884
Saturno	2.008 ′/dia	10759.2 (29.457)	378.092
Urano	0.7038 ′/dia	30688.5 (84.019)	369.656
Netuno	0.3589 ′/dia	60182.3 (164.77)	367.487

isto é, a sombra da Lua passa pelo observador. No caso do *eclipse da Lua*, esta deixa de ser vista porque entra na sombra da Terra².

Quando a fonte luminosa e o corpo iluminado não são puntiformes existem duas regiões de sombra: a *umbra*, região que não recebe luz nenhuma da fonte luminosa, e a *penumbra*, região que recebe luz apenas de alguma parte da fonte. Isto é precisamente o que ocorre no sistema Sol–Terra–Lua (todos os corpos são extensos).

4.10.1 Eclipse do Sol

A geometria de um eclipse do Sol está ilustrada na figura 4.14.




Figura 4.14: Representação de um eclipse total do Sol. Para observadores que se encontram na umbra, o disco solar está completamente oculto pela Lua. Para os observadores que se encontram na penumbra, o disco solar está apenas parcialmente oculto (eclipse parcial). Caso a Terra estivesse mais próxima do Sol ou a Lua mais distante da Terra, o eclipse seria anular (o disco aparente da Lua seria menor que o disco solar). A flecha indica o movimento da sombra na superfície da Terra (de Oeste para Leste).

No caso desta figura, damos o exemplo de um *eclipse total*: a umbra da Lua atinge a superfície da Terra, todo o disco solar é ocultado pela Lua. Como as distâncias entre a Lua e a Terra e entre o Sol e a Terra não são constantes, nem sempre os eclipses são totais. Dependendo da distância, o diâmetro aparente da Lua varia entre $29'22''$ e $33'20''$; o do Sol varia entre $32'00''$ e $32'31''$ (Fig. 4.15). Assim, quando o diâmetro aparente da Lua é menor que o do Sol, temos um *eclipse anular* (Fig. 4.16).

O eclipses de tipo anular são um pouco mais frequentes (33% do total de eclipses) que os eclipses totais (27%). A maioria dos eclipses, contudo, são *parciais* (35%), quando a umbra da Lua não atinge a Terra³.

²Na realidade, a Lua não deixa de ser vista, pois ainda é iluminada pela luz do Sol que é espalhada pela atmosfera terrestre, dando-lhe uma cor avermelhada.

³As estatísticas são de Fred Espenak, disponíveis no site www.EclipseWise.com.




Figura 4.15: Comparação dos diâmetros aparentes do Sol e da Lua. A variação ocorre devido à elipticidade (achatamento) das órbitas da Terra e da Lua. Como a órbita lunar é mais excêntrica, a variação do tamanho aparente é maior.




Figura 4.16: A esquerda, os três tipos de eclipse do Sol. No caso do eclipse anular, a Lua se encontra próxima do apogeu e seu diâmetro aparente é menor do que o do Sol; no eclipse total, a Lua se encontra próxima do perigeu. A direita, representação da observação de um eclipse do Sol.

Em alguns casos relativamente raros, um eclipse pode começar como anular e, a medida que a sombra avança pela Terra o eclipse se torna total. No final do eclipse este se torna anular novamente. A principal razão disto é a curvatura terrestre que faz com que a distância relativa entre a Lua e os observadores dependa da posição na Terra. Em alguns casos, o eclipse pode começar total e terminar anular ou vice versa. Chamamos estes eclipses de *híbrido* ou *anular-total* do Sol. Por exemplo, os eclipses de 08/04/2008, 03/11/2013 e 20/04/2023 são de tipo híbrido.

Observamos também que a sombra da Lua percorre apenas uma pequena fração da superfície da Terra. Para observadores que não se encontram no caminho da totalidade, mas próximo dele (isto é, na penumbra), o eclipse será parcial (apenas uma parte do disco solar será ocultado pela Lua). Observadores ainda mais distantes, não observarão o eclipse. Isto é simplesmente um efeito da paralaxe diária na posição aparente da Lua.

O tamanho da umbra na superfície da Terra pode ser estimado utilizando as seguintes relações (veja Fig. 4.17):

$$\sin(\theta/2) = \frac{r_{\odot}}{l_U} = \frac{r_L}{l_U - (D_{\odot} - D_L)} = \frac{r_U}{l_U - (D_{\odot} - r_T)}; \quad (4.2)$$

onde D_{\odot} e D_L são as distâncias geocêntricas do Sol e da Lua, r_{\odot} , r_L e r_T são os raios do Sol, Lua e Terra, respectivamente. O raio da umbra na superfície terrestre é r_U (supondo que a projeção da umbra seja circular). Com um pouco de álgebra, mostramos que

$$l_U = \frac{D_{\odot} - D_L}{1 - r_L/r_{\odot}} \approx D_{\odot} \left(1 + \frac{r_L}{r_{\odot}}\right), \quad (4.3)$$

e teremos um eclipse total se $l_U \geq (D_{\odot} - r_T)$, isto é, a umbra atinge a superfície da Terra. Esta relação é equivalente a $d_L \geq d_{\odot}$, o *diâmetro aparente* da Lua é maior do que o da Sol.

O tamanho da umbra na superfície da Terra é dado por:

$$r_U = \frac{r_L(D_{\odot} - r_T) - r_{\odot}(D_L - r_T)}{D_{\odot} - D_L} \approx r_L - r_{\odot} \frac{D_L - r_T}{D_{\odot}}, \quad (4.4)$$




Figura 4.17: Geometria de um eclipse do Sol para estimarmos o tamanho da umbra na superfície terrestre.

onde assumimos que a projeção da umbra lunar na Terra é circular. Usando a Eq. 4.4 quando a Lua está no perigeu e a Terra no afélio obtemos $r_U \approx 96$ km. Isto não é rigorosamente preciso: devido à curvatura da Terra este é um valor mínimo. O tamanho real da umbra pode ser até o dobro do estimado pela fórmula acima próximo dos polos.

A umbra lunar tem no máximo 270 km de largura e tipicamente varia de algumas dezenas a ~ 100 km. Um cálculo feito por J. Meeus sugere que uma dada localidade na Terra observa, em média, um eclipse solar a cada 375 anos devido à largura do caminho do eclipse solar na superfície terrestre. A variância deste intervalo de tempo, contudo, é muito grande: em algumas ocasiões na mesma localidade poderíamos observar eclipses totais do Sol com um intervalo de poucos anos; outros lugares podem ficar sem ver um eclipse total por milênios.

A umbra se move na superfície da Terra com velocidade entre 1700 a 3400 km/h, no sentido Oeste para Leste (esta velocidade é pelo menos o dobro da velocidade dos aviões comerciais). O movimento da umbra na superfície terrestre é o resultado da composição de 3 movimentos: translação da Lua ao redor da Terra, translação da Terra em torno do Sol e a rotação terrestre. A principal componente é a translação da Lua e a velocidade da umbra na direção do Leste reflete a velocidade da Lua em órbita da Terra.

A fase de totalidade para um dado observador dura, aproximadamente, o tamanho do diâmetro da umbra dividido pela velocidade com que a umbra percorre o caminho da totalidade: a duração é tipicamente $\sim (150 \text{ km}/2000 \text{ km/s}) \sim 4,5$ minutos. Observamos que a fase de totalidade pode durar *no máximo* cerca de 7 minutos e meio (entre 3000 A.C. e 5000 D.C., o mais longo eclipse será em 16/jul/2186 com 7m29s de duração). Os eclipses anulares podem ser mais longos, chegando a durar até cerca 12 minutos e meio.

Pela geometria do eclipse, é claro que um eclipse do Sol só pode ocorrer na Lua Nova.

4.10.2 Eclipse da Lua

O eclipse da Lua se produz quando esta entra no cone de sombra da Terra como mostra a Fig. 4.18. Pela figura, vemos que os eclipses lunares só podem ocorrer na Lua Cheia.

Chamamos de fase de totalidade o intervalo de tempo em que a Lua percorre a umbra terrestre (Fig. 4.19). A fórmula (4.3) também vale para a umbra da Terra, bastando trocar r_L por r_T e fazendo $D_L \rightarrow 0$. A umbra da Terra é apenas 0,00925 vezes a distância Terra-Sol,




Figura 4.18: Representação de um eclipse da Lua ao passar pela sombra da Terra.

mas isto significa que a umbra se prolonga cerca de 1,4 milhões de km além da Terra, mais de 3,5 vezes o raio da órbita da Lua. Um observador na Lua nunca verá um eclipse anular do Sol. Se apenas uma parte da Lua passar pela umbra, então dizemos que é um *eclipse parcial*.

A Lua não passa sempre pela umbra da Terra. Em alguns casos só ocorre a passagem da Lua pela penumbra (não necessariamente de toda a Lua). Neste caso, onde não há contato com a umbra, chamamos de eclipse *penumbral* da Lua, Fig. 4.19 (por exemplo, como os eclipses de 28/12/2012, 10/02/2017 e 10/01/2020).




Figura 4.19: Esquerda: Exemplo de um eclipse da Lua visto da Terra (a umbra e a penumbra não são realmente visíveis). Neste exemplo a totalidade (intervalo de tempo em que a lua permanece na umbra terrestre) dura cerca de 1 hora e 15 minutos. Direita: Exemplo de um eclipse da Lua penumbral, quando a Lua não passa pela umbra da Terra.

Em contraste com os eclipses solares, que só podem ser vistos em uma pequena região sobre a Terra, os eclipses lunares são vistos por todo o hemisfério onde é noite. Em outras palavras, basta que a Lua esteja acima do horizonte (levando-se em conta a refração e a paralaxe) para que o fenômeno seja observável.

A duração máxima de um eclipse da Lua é de cerca de $3^{\text{h}}50^{\text{m}}$ e a duração da fase total não pode superar cerca de $1^{\text{h}}40^{\text{m}}$.

4.10.3 Ocorrência de eclipses

Como foi dito, os eclipses solares e lunares só podem ocorrer nas luas Novas e Cheias, respectivamente. Então porquê não observamos dois eclipses por mês? Os eclipses não ocorrem com esta frequência porque os planos orbitais da Lua em torno da Terra, e da Terra em torno do Sol não são coplanares (veja Figs. 4.20 e 4.21).




Figura 4.20: Geometria da órbita da Lua em relação à eclíptica. As órbitas não são coplanares e a reta da interseção é chamada linha dos nodos onde se encontram os nodos ascendente e descendente. A inclinação da órbita da Lua em relação à eclíptica é de cerca de $5^{\circ}1$.

Como a órbita da Lua é inclinada de cerca de $5^{\circ}1$ em relação à eclíptica, na Lua Nova nem sempre ela estará exatamente alinhada com o Sol e a Terra. Assim um eclipse só pode ocorrer quando o Sol e a Lua estiverem próximos à linha dos nodos da órbita lunar. Pode-se mostrar que a Lua não deve estar a mais de $4^{\circ}6$ do nodo para que o eclipse lunar seja total, e não mais que $10^{\circ}3$ para o eclipse total do Sol.




Figura 4.21: Duas vezes por ano (excepcionalmente até 3 vezes) a Lua, Terra e Sol estão alinhados próximos da linha dos nodos: nestes casos temos as temporadas de eclipses. Quando a conjunção não está alinhada com a linha dos nodos, a sombra da Lua não atinge a Terra e nem a Lua passa pela sombra da Terra.

A Lua, a Terra e o Sol estão alinhados próximos à linha dos nodos geralmente 2 vezes por ano e, com menos frequência, 3 vezes por ano. Isto ocorre porque a linha dos nodos tem um movimento retrógrado e o período com que a Terra passa pelo nodo é um pouco inferior ao ano Trópico. Nesta configuração temos a **temporada de eclipses** (Fig. 4.21). Inicialmente, com o alinhamento temos um eclipse (digamos do Sol); 2 semanas depois teremos um eclipse da Lua e, às vezes, com mais 2 semanas voltaremos a ter um eclipse do Sol. Esta temporada volta com o próximo alinhamento, um pouco menos de 6 meses depois.

Em um ano pode ocorrer no mínimo 2 eclipses solares (não necessariamente totais) e no máximo 5, o que é muito raro, em média um vez a cada 180 anos (a última vez foi em 1935 e a próxima será em 2206).

Incluindo os eclipses lunares, podem ocorrer no mínimo 4 eclipses (neste caso 2 são solares) e no máximo 7 (2 lunares e 5 solares ou 3 lunares e 4 solares – a última vez que isto ocorreu foi em 1982, a próxima será em 2038). O mais frequente, em cerca de 71% dos anos, é que ocorram 4 eclipses por ano.

Série de Saros

O plano orbital da Lua não é invariante, ele possui um movimento de precessão devido às perturbações do Sol, dos planetas e da não esfericidade da Terra. Podemos definir um período de tempo entre duas passagens consecutivas do Sol pelo nodo ascendente da órbita lunar; este é o **ano draconiano**. Este ano, como já foi visto, tem cerca de 346,62 dias. Dezenove anos




Figura 4.22: Frequência dos eclipses solares e lunares. Os eclipses se agrupam em diagonais correspondendo aos eclipses que ocorrem no nodo ascendente ou descendente da órbita lunar. Os grupos de 2 ou 3 eclipses que ocorrem no intervalo de cerca de 34 dias correspondem às “temporadas de eclipses”. O período de saros (ou simplesmente saros) tem um pouco mais de 18 anos e a figura ilustra 2 exemplos. Alguns eclipses têm o número de sua série de saros destacadas.

draconianos correspondem quase exatamente a 223 meses sinódicos (um **mês sinódico** ou lunação tem em média cerca 29,53 dias), isto é o período de recorrência das fases da Lua. Por último, existe uma outra coincidência, 223 meses sinódicos correspondem quase que exatamente a 239 meses anomalísticos (o **mês anomalístico** é o período de uma órbita lunar em relação ao perigeu). Resumindo, temos:

19 anos draconianos:	6585 dias	18 horas	44 minutos	= 18 anos	11,28 dias
223 meses sinódicos:	6585 dias	7 horas	43 minutos	= 18 anos	10,82 dias
239 meses anomalísticos:	6585 dias	12 horas	53 minutos	= 18 anos	11,04 dias

Em outras palavras, as configurações espaciais Terra–Sol–Lua se repetem quase que exatamente com um período de cerca de 18 anos trópicos e 11,3 dias. Portanto, a sequência de eclipses também se repete com este período. Esta recorrência dos eclipses já era conhecida dos Caldeus (cultura que existiu entre os séculos **IX** e **VI** na Mesopotâmia, eventualmente integrada à Babilônia) e é chamado *período de saros*. O termo **saros** foi utilizado pela primeira vez por Edmund Halley para designar o período de 223 meses sinódicos. A palavra saros vem do Caldeu e significa “3600”, sem relação com o período de recorrência dos eclipses; aparentemente Halley cometeu um erro ao usar a palavra “saros”. Contudo, o termo acabou sendo adotado de tal forma que alguns autores dizem que a palavra saros significa “repetição” em grego.

Ocorrem vários eclipses por ano o que significa que existem várias séries de saros ocorrendo

simultaneamente. Os saros são numerados seguindo a convenção de que eclipses de séries com números pares ocorrem próximo do nodo descendente enquanto eclipses que ocorrem próximos do nodo ascendente tem número ímpar.




Figura 4.23: Exemplo da semelhança da geometria de eclipses da mesma série de saros (aqui, series 139 [vermelho], 142 [azul] e 145 [verde]). A cada 18 anos, 11 dias e 8 horas, os eclipses se repetem a 120° para o Oeste (o que corresponde a 8h) de forma muito semelhante. A cada 3 saros, alguns eclipses praticamente ocorrem da mesma forma e no mesmo local (por exemplo, na serie de saros 139 de 1988 e 2042).

Uma série de saros tem duração limitada. A série começa com eclipses solares parciais próximos de um dos polos. A medida que a serie avança os eclipses se deslocam para o equador e, eventualmente se tornam anulares e/ou totais. Em seguida, os eclipse vão se deslocando para o outro polo, se tornam parciais e finalmente a serie termina. Uma serie de saros dura geralmente entre 1244 (com 70 eclipses solares) a 1316 anos (com 74 eclipses solares). A maior frequência é para a duração de 1280 anos, que corresponde a 72 eclipses solares. Nos casos extremos, podem haver até 87 eclipses solares em uma serie que dura 1551 anos.

A serie de saros de número zero ocorreu entre maio/2996 A.C. e junho/1675 A.C.. Hoje em dia as series ativas estão entre a 117 (de jun/792 a ago/2054) e a 156 (de jul/2011 a jul/3237).

Como os eclipses separados por um período de saros têm aproximadamente a mesma configuração espacial, os eclipses são muito semelhantes. A figura 4.23 ilustra esta semelhança entre os eclipses consecutivos de duas séries de saros.

A figura 4.24 mostra os eclipses do Sol, anular e total, entre 2005 e 2030. O próximo eclipse total visível no Brasil será em 12/08/2045, quando a totalidade será observada em Belém, São Luis e Recife. O próximo eclipse anular visível no Brasil será em 14/10/2023, observável na Amazônia (passando próximo de Manaus), norte de Tocantins, interior do Piauí, Juazeiro do Norte/CE e terminando em Natal/RN e João Pessoa/PB.

4.11 Determinação clássica de distâncias no Sistema Solar

4.11.1 Diâmetro da Terra

Como foi visto na seção 4.3.2, Eratóstenes foi o primeiro a dar uma medida precisa da circunferência da Terra. Seu método, como já foi descrito, baseava-se na comparação do ângulo zenital, z , do Sol nas cidades de Alexandria e Siena (hoje, Assuã no Egito), esquematizado na Fig. 4.25.

O ângulo zenital medido em Alexandria, z , corresponde à fração de circunferência entre as duas cidades. Assim, ignorando o efeito de refração, z está para a distância entre as cidades,




Figura 4.25: Ao meio-dia do solstício de Verão no hemisfério norte, o Sol tem um ângulo zenital z em Alexandria e zero em Siena (hoje, Assuã). A distância entre as duas cidades é d , R é o raio da Terra e ε é a obliquidade da eclíptica na época de Eratóstenes. Note que o ângulo zenital z é igual à diferença entre as latitudes de Alexandria e Assuã.




Figura 4.26: Método de Hiparco para determinar a distância D_L da Lua utilizando um eclipse lunar. Os ângulos p_\odot e d_\odot são a paralaxe diária e o semi-diâmetro angular aparente do Sol. O ângulo a é a paralaxe diária da Lua e c é o semi-diâmetro da sombra da Terra na órbita lunar, a uma distância D_L da Terra. R_T é o raio da Terra. O ângulo representado pela linha pontilhada tem 180° . As escalas estão exageradas para maior clareza.

Observando a geometria do problema (Fig. 4.26) podemos escrever o ângulo representado pelo traço pontilhado da seguinte forma:

$$d_\odot + \underbrace{(180^\circ - 90^\circ - p_\odot)}_{\text{triângulo retângulo com } p_\odot} + \underbrace{(180^\circ - 90^\circ - a)}_{\text{triângulo retângulo com } a} + c = 180^\circ$$

$$\Rightarrow p_\odot + a = d_\odot + c. \tag{4.8}$$

Há uma dificuldade, contudo, pois a paralaxe diária do Sol não era conhecida na época de Hiparco. Mas o ângulo p_\odot é muito menor que os outros ângulos que aparecem na Eq. (4.8),



Figura 4.27: O sistema Terra–Lua em escala real, tanto os tamanhos quanto a distância.

$p_{\odot} \approx 8''8$. Desprezando a paralaxe diária do Sol vem:

$$a = d_{\odot} + 180^{\circ} \frac{t_{\text{eclipse}}}{t_{\text{sinódico}}}, \quad (4.9)$$

ou seja, a paralaxe diária da Lua é obtida. Pela definição da paralaxe e pela Fig. 4.26, temos $\text{sen } a = R_T/D_L$ e, portanto, a distância Terra–Lua é achada em função do raio da Terra (que pode ser determinado pelo método de Eratóstenes, por exemplo).

Medida da paralaxe por dois observadores - Método 1

Vamos supor dois observadores, O_1 e O_2 , no mesmo meridiano, com latitudes geocêntricas φ_1 e φ_2 , que observam a Lua simultaneamente (veja Fig. 4.28 e o exemplo da Fig. 4.29).




Figura 4.28: Medidas simultâneas da paralaxe diária da Lua por dois observadores, O_1 e O_2 , no mesmo meridiano. O raio da Terra é ρ e D_L é a distância geocêntrica da Lua.




Figura 4.29: Paralaxe da Lua. A Lua e as Plêiades observadas simultaneamente em dois lugares com a mesma longitude, mas latitudes diferentes. Note a diferença da posição da Lua. A diferença em latitude é de cerca de 26 graus (ou 2872 km).

Desprezando a refração atmosférica, cada observador pode medir diretamente uma distância zenital topocêntrica da Lua, z'_1 e z'_2 .

Do ângulo formado por O_1, C e O_2 temos:

$$z_1 + z_2 = |\varphi_1 - \varphi_2|, \quad (4.10)$$

onde z_1 e z_2 são as distâncias zenitais geocêntricas da Lua. Note que se o observador O_2 estiver no hemisfério Sul, $\varphi_2 < 0$, e a Eq. (4.10) pode ser reescrita como $z_1 + z_2 = \varphi_1 + |\varphi_2|$.

Utilizando a definição de paralaxe diária, $z' = z + p$, temos para cada observador:

$$z_1 = z'_1 - p_1 \quad \text{e} \quad z_2 = z'_2 - p_2, \quad (4.11)$$

o que implica na relação:

$$p_1 + p_2 = z'_1 + z'_2 - |\varphi_1 - \varphi_2|. \quad (4.12)$$

ou seja, a soma das paralaxes pode ser determinada diretamente pelas observações (uma vez que conhecemos as latitudes dos observadores).

Vamos definir o ângulo θ como $\theta \equiv p_1 + p_2$, que é um ângulo obtido diretamente a partir das observações de O_1 e O_2 . A definição de paralaxe diária nos fornece as seguintes equações:

$$\text{sen } p_1 = \frac{\rho}{D_L} \text{sen } z'_1 \quad \text{e} \quad \text{sen } p_2 = \frac{\rho}{D_L} \text{sen } z'_2, \quad (4.13)$$

onde ρ é o raio da Terra (que supomos o mesmo para os dois observadores, isto é, desprezamos a achatamento terrestre) e D_L é a distância geocêntrica da Lua. Substituindo $p_1 = \theta - p_2$ e desenvolvendo $\text{sen}(\theta - p_2)$ obtemos:

$$\cos p_2 \text{sen } \theta - \cos \theta \text{sen } p_2 = \frac{\rho}{D_L} \text{sen } z'_1. \quad (4.14)$$

Dividindo a equação acima por $\text{sen } p_2$ (basta que O_2 não observe a Lua no zênite) resulta em:

$$\frac{\text{sen } \theta}{\tan p_2} = \cos \theta + \frac{\rho}{D_L} \frac{\text{sen } z'_1}{\text{sen } p_2}, \quad (4.15)$$

e substituindo $\text{sen } p_2$ [da Eq. (4.13)] podemos eliminar ρ e D_L :

$$\tan p_2 = \frac{\text{sen } \theta}{\cos \theta + \frac{\text{sen } z'_1}{\text{sen } z'_2}}. \quad (4.16)$$

A equação (4.16) nos dá a paralaxe diária p_2 a partir das latitudes geocêntricas e das distâncias zenitais topocêntricas medidas por cada um dos observadores. Uma vez que conhecemos p_2 , a distância da Lua é obtida através da própria definição de paralaxe:

$$D_L = \rho \frac{\text{sen } z'_2}{\text{sen } p_2} \quad \text{ou} \quad \text{sen } P = \frac{\text{sen } p_2}{\text{sen } z'_2}, \quad (4.17)$$

onde P é a paralaxe horizontal da Lua. Com um pouco de álgebra temos ainda:

$$\text{sen } P = \frac{\text{sen } \theta}{\sqrt{\text{sen}^2 z'_1 + \text{sen}^2 z'_2 + 2 \cos \theta \text{sen } z'_1 \text{sen } z'_2}}. \quad (4.18)$$

Medida da distância por dois observadores - Método 2

Vamos imaginar a situação descrita na Fig. 4.30, onde dois observadores separados por um ângulo θ sobre a Terra (uma esfera de raio r) medem simultaneamente a altura do objeto P .

Neste problema temos três relações simples que podem ser identificadas imediatamente:

$$p + (\varphi + c) + (\psi + c) = 180^\circ \quad \Rightarrow \quad 2c + p + \varphi + \psi = 180^\circ;$$

$$a + c = 90^\circ \quad \text{e} \quad \theta + 2a = 180^\circ.$$

De onde concluímos que: $2c = \theta$ e $\theta + p + \varphi + \psi = 180^\circ$.




Figura 4.30: Geometria para determinação da distância topocêntrica d entre o observador A e o objeto P , com auxílio da observação de B .

Por outro lado, aplicando a lei dos senos nos triângulos \widehat{AOB} e \widehat{ABP} (com o lado em comum E) temos:

$$\frac{\text{sen } \theta}{E} = \frac{\text{sen } a}{r} \quad \text{e} \quad \frac{\text{sen } p}{E} = \frac{\text{sen}(\varphi + c)}{d}.$$

Das relações acima, podemos eliminar a distância E . Em seguida, eliminamos os ângulos p , c e a com as relações obtidas previamente e concluímos que a distância entre os pontos A e P é:

$$\frac{d}{r} = \frac{\cos \varphi - \cos(\varphi + \theta)}{\text{sen}(\psi + \varphi + \theta)}. \quad (4.19)$$

Se tivermos dois observadores em latitudes diferentes cada um vai medir uma altura diferente da Lua no momento do trânsito (isto é, passagem pelo meridiano principal de cada observador). Tomando, por exemplo, um observador na latitude $-23^{\circ},5$ e outro em $-2^{\circ},5$ (mais ou menos como se um estivesse em São Paulo/SP e outro em São Luis/MA). O de SP mede a altura da lua no trânsito $50^{\circ},7$ e o de São Luis mede 72° . Usando a Fig. 4.30 identificamos os seguintes ângulos:

$$\theta = |-23^{\circ},5 - (-2^{\circ},5)| = +21^{\circ}; \quad \varphi = 360^{\circ} - 72^{\circ}; \quad \psi = 50^{\circ},7.$$

(note que os ângulos são medidos no mesmo sentido, por isto o fator 360° foi usado acima). Substituindo estes ângulos na Eq.(4.19) acima obtemos:

$$d = r \times 61,17.$$

Tomando $r = 6370$ km, obtemos para a distância da Lua 389.714 km.

4.11.3 Distância Terra – Sol

Aristarco de Samos concebeu um método para medir a distância da Terra ao Sol em função da distância Terra–Lua (veja Fig. 4.31).

Aristarco supôs corretamente que, no momento do quarto crescente ou quarto minguante, a Terra, a Lua e o Sol formariam um triângulo retângulo como mostra a figura 4.31. Se o ângulo θ , a distância angular entre a Lua e o Sol, for medido temos imediatamente a distância Terra–Sol:

$$D_{\odot} = \frac{D_L}{\cos \theta}. \quad (4.20)$$

O problema deste método está na dificuldade em determinar exatamente o momento do quarto crescente (ou minguante) e em se medir precisamente a distância angular entre a Lua




Figura 4.31: Método de Aristarco. D_L é a distância da Terra à Lua, D_{\odot} é a distância Terra–Sol. O ângulo θ corresponde ao momento em que metade do disco lunar (visto da Terra) está iluminado (quarto crescente como na figura ou quarto minguante).

e o Sol neste momento. O valor medido por Aristarco foi de cerca de 87° (na linguagem da época, “um quadrante diminuído de um treze avos de quadrante”), enquanto que o valor correto é $\theta \approx 89^\circ 51'$, variando durante o ano devido à órbita elíptica da Terra. Em outras palavras, devido a um erro que não chega a 3° , Aristarco subestimou a razão entre as distâncias D_L e D_{\odot} por um fator ~ 20 .

4.11.4 Distância Planetas – Sol

Os métodos descritos abaixo para determinarmos as distâncias dos planetas ao Sol foram propostos por Copérnico. Em ambos os casos, supomos que as órbitas dos planetas são circulares e que a velocidade angular dos planetas é constante (veja a Fig. 4.32).




Figura 4.32: Método de Copérnico para determinação da distância dos planetas ao Sol. (A) Geometria para os planetas inferiores (ou interiores); (B) geometria para os planetas superiores (ou exteriores). Para os planetas superiores são necessárias duas medidas em dois momentos distintos.

Planetas Interiores

Para se determinar a distância dos planetas inferiores (Mercúrio e Vênus) basta medir a distância angular entre o Sol e o planeta no momento em que este está em máxima elongação

(isto é, sua distância angular em relação ao Sol é máxima). Isto pode ser feito medindo-se sistematicamente a distância angular do planeta ao Sol e daí determinar o valor máximo.

Por outro lado, a distância do planeta ao Sol também é obtida resolvendo o triângulo retângulo formado pela Terra, Sol e o planeta (Fig. 4.32, a esquerda):

$$D_P = D_{\odot} \operatorname{sen} \theta. \quad (4.21)$$

onde θ é a elongação do planeta.

Temos então a distância do planeta ao Sol em função da distância Terra–Sol, que pode ser obtida, por exemplo, pelo método de Aristarco.

Planetas Exteriores

Para determinarmos a distância dos planetas superiores ao Sol devemos resolver o triângulo retângulo formado pelo Sol, T_2 (a Terra no momento t_2) e P_2 (o planeta neste mesmo momento, Fig. 4.32, a direita).

O problema está em medirmos o ângulo β . Isto pode ser feito observando o planeta superior em dois instantes, t_1 , quando o planeta está em oposição (isto é, ele está alinhado com a Terra e o Sol), e t_2 , quando o planeta está em quadratura (isto é, visto da Terra, o planeta e o Sol estão a 90° um do outro). Estes dois momentos podiam ser facilmente determinados por Copérnico.

Bastava então determinar quanto a Terra e o Planeta haviam percorrido em suas órbitas respectivas entre estes dois momentos, t_1 e t_2 . Conhecendo-se os períodos siderais da Terra e dos planetas superiores é fácil determinar λ_P e λ_T :

$$\lambda_T = 360^\circ \frac{t_2 - t_1}{T_{\text{sid Terra}}} \quad \text{e} \quad \lambda_P = 360^\circ \frac{t_2 - t_1}{T_{\text{sid Plan}}}, \quad (4.22)$$

onde $T_{\text{sid Terra}}$ é o ano sideral terrestre ($\sim 365,25$ dias) e $T_{\text{sid Plan}}$ é o ano sideral do planeta superior. Desta forma temos:

$$\beta = 360^\circ (t_2 - t_1) \left(\frac{1}{T_{\text{sid Terra}}} - \frac{1}{T_{\text{sid Plan}}} \right). \quad (4.23)$$

A distância do planeta ao Sol será finalmente dada por:

$$D_P = \frac{D_{\odot}}{\cos \beta}. \quad (4.24)$$

Tópicos de Astronomia de Posição

5.1 Estações do ano em outros planetas

Qualquer planeta que tenha o eixo de rotação inclinado em relação ao seu plano orbital em torno do Sol apresentará o fenômeno das *estações do ano*, assim como a Terra (veja Tabela 5.1). Os planetas Marte, Saturno e Netuno têm estações do ano semelhantes às da Terra.

Tabela 5.1: Inclinação dos eixos de rotação dos planetas (em graus).

Fonte: <https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/>

Mercurio	Vênus	Terra	Marte	Júpiter	Saturno	Urano	Netuno
0,03°	177,36°	23,44°	25,19°	3,12°	26,73°	97,77°	28,32°

Como Marte, Saturno e Netuno têm o eixo de rotação inclinado em relação ao seus respectivos planos orbitais, estes planetas têm estações do ano como a Terra: verão e inverno, outono e primavera. A diferença, é claro, é que estas estações são muito mais longas.

Marte tem uma órbita mais excêntrica que a Terra e, portanto, as durações das estações do ano são mais desiguais. Em termos de dias marcianos (24h 39m 35,2s) temos aproximadamente: 194, 178, 142 e 154 dias para Primavera, Verão, Outono e Inverno (no hemisfério Norte), respectivamente. Temos uma diferença de mais de 50 dias marcianos entre a Primavera e o Outono.

Por outro lado, Mercúrio e Júpiter giram quase que perpendicularmente ao plano orbital; estes planetas estão praticamente sempre na meia-estação (primavera ou outono). Vênus também tem o eixo de rotação quase na perpendicular ao plano orbital, mas sua órbita é retrógrada (isto é, o eixo de rotação tem direção invertida em relação ao eixo de rotação da Terra). Por fim temos Urano, com seu eixo de rotação praticamente “deitado” sobre seu plano orbital.

O planeta anão Plutão também tem seu eixo de rotação quase que paralelo a eclíptica. O equinócio de Outono foi em out/1987 e o solstício de Inverno (hemisfério Norte) será em maio/2029.

Para determinarmos o início das estações do ano nos planetas do sistema solar, definimos os equinócios como $\delta_{\odot} = 0$, onde δ_{\odot} é a declinação do Sol observada do planeta (planetocêntrica). Quando δ_{\odot} é um extremo, máximo ou mínimo, obtemos os solstícios.

Usando coordenadas as cartesianas do planeta, (x, y, z) , assumindo o Sol na origem (o que não é exato, mas é suficiente o grau de precisão que buscamos) e conhecendo as coordenadas equatoriais do polo norte celeste do planeta, (α_p, δ_p) temos:

$$\begin{cases} X = \cos \alpha_p \cos \delta_p; \\ Y = \sin \alpha_p \cos \delta_p; \\ Z = \sin \delta_p, \end{cases} \Rightarrow \quad \text{sen } \delta_{\odot} = -\frac{Xx + Yy + Zz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}.$$

Tabela 5.2: Início das estações do ano em **Marte**. O “*ano marciano*” número 1 é, por convenção arbitrária, o ano que inicia no equinócio de Marte de 11/abril/1955 (Piqueux et al., 2015). O primeiro equinócio corresponde à longitude heliocêntrica L igual a zero, quando a declinação do Sol (visto de Marte) passa do hemisfério Sul para o Norte (início da primavera marciana no hemisfério Norte).

Ano Marte	Equinócio Primavera	Solstício Verão	Equinócio Outono	Solstício Inverno
22	09/out/1994	26/abr/1995	26/out/1995	21/mar/1996
23	26/ago/1996	13/mar/1997	12/set/1997	06/fev/1998
24	14/jul/1998	29/jan/1999	31 jul/1999	25/dez/1999
25	31/mai/2000	16/dez/2000	17 jun/2001	11/nov/2001
26	18/abr/2002	03/nov/2002	05 mai/2003	29/set/2003
27	05/mar/2004	20/set/2004	22 mar/2005	16/ago/2005
28	21/jan/2006	08/ago/2006	07 fev/2007	04/jul/2007
29	09/dez/2007	25/jun/2008	25 dez/2008	21/mai/2009
30	26/out/2009	13/mai/2010	12 nov/2010	08/abr/2011
31	13/set/2011	30/mar/2012	29 set/2012	23/fev/2013
32	31/jul/2013	15/fev/2014	17 ago/2014	11/jan/2015
33	18/jun/2015	03/jan/2016	04 jul/2016	28/nov/2016
34	05/mai/2017	20/nov/2017	22 mai/2018	16/out/2018
35	23/mar/2019	08/out/2019	08 abr/2020	02/set/2020
36	07/fev/2021	25/ago/2021	24 fev/2022	21/jul/2022
37	26/dez/2022	12/jul/2023	12 jan/2024	07/jun/2024
38	12/nov/2024	29/mai/2025	29 nov/2025	25/abr/2026
39	30/set/2026	16/abr/2027	17 out/2027	12/mar/2028
40	17/ago/2028	03/mar/2029	03 set/2029	28/jan/2030
41	05/jul/2030	19/jan/2031	22 jul/2031	16/dez/2031
42	22/mai/2032	06/dez/2032	08 jun/2033	02/nov/2033
43	09/abr/2034	24/out/2034	26 abr/2035	20/set/2035
44	25/fev/2036	10/set/2036	13 mar/2037	07/ago/2037
45	12/jan/2038	29/jul/2038	29/jan/2039	25/jun/2039
46	30/nov/2039	15/jun/2040	16/dez/2040	12/mai/2041
47	17/out/2041	03/mai/2042	03/nov/2042	29/mar/2043
48	04/set/2043	20/mar/2044	20/set/2044	13/fev/2045
49	22/jul/2045	05/fev/2046	08/ago/2046	01/jan/2047

5.1.1 Visibilidade dos anéis de Saturno

Apesar de todos os planetas gigantes gasosos do Sistema Solar possuírem anéis compostos de pequenas rochas e gelo em órbita equatorial, o sistema de anéis de Saturno é sem dúvida o mais espetacular, geralmente visíveis com a ajuda de um pequeno telescópio. Galileu foi o primeiro a observar os anéis em 1610, mas não os reconheceu como tal. O holandês Christiaan Huygens foi o primeiro a reconhecer os anéis como um disco ao redor de Saturno em 1655.

A visibilidade dos anéis de Saturno dependem de sua orientação relativa em relação à Terra. Como os anéis são extremamente finos, por volta de 100 metros de espessura, não é possível observá-los quando Saturno está próximo do seu equinócio. A fig. 5.1 ilustra como os anéis são observados da Terra.

O ângulo de abertura dos anéis oscila quando observamos da Terra porque as órbitas, terrestre e de Saturno, não são coplanares; a órbita de Saturno tem uma inclinação de cerca de $2,49^\circ$ em relação à eclíptica fazendo com que o nosso ponto de vista varie ao longo de um ano.

Tabela 5.3: Data dos inícios das estações do ano de **Júpiter**. As estações se referem ao hemisfério norte; para o hemisfério sul basta trocar verão por inverno e primavera por outono. Datas estimadas com a teoria VSOP2000.

Equinócio Primavera	Solstício Verão	Equinócio Outono	Solstício Inverno
07/jan/1962	26/set/1964	24/ago/1967	13/nov/1970
17/nov/1973	07/ago/1976	04/jul/1979	23/set/1982
30/set/1985	20/jun/1988	15/mai/1991	04/ago/1994
11/ago/1997	30/abr/2000	26/mar/2003	17/jun/2006
22/jun/2009	10/mar/2012	04/abr/2015	27/abr/2018
02/mai/2021	20/jan/2024	16/dez/2026	08/mar/2030
12/mar/2033	01/dez/2035	27/out/3038	16/jan/2042
23/jan/2045	14/out/2047	07/set/2050	27/nov/2053
04/dez/2056	25/ago/2059	20/jul/2062	10/out/2065
15/out/2068	04/jul/2071	30/mai/2071	20/ago/2077
25/ago/2080	15/mai/2083	10/abr/2086	01/jul/2089
05/jul/2092	26/mar/2095	19/fev/2098	12/mai/2101
18/mai/2104	06/fev/2107	01/jan/2110	23/mar/2113

Tabela 5.4: Data dos inícios das estações do ano de **Saturno**. As estações se referem ao hemisfério norte; para o hemisfério sul basta trocar verão por inverno e primavera por outono. A duração das estações é diferente devido à excentricidade da órbita ao redor do Sol. Quando Saturno está próximo de seu equinócio, os anéis se tornam praticamente invisíveis da Terra. Datas estimadas com a teoria VSOP2000.

Equinócio Primavera	Solstício Verão	Equinócio Outono	Solstício Inverno
11/abr/1921	17/jan/1929	29/dez/1936	07/dez/1943
21/set/1950	04/jul/1958	16/jun/1966	23/mai/1973
03/mar/1980	10/dez/1987	19/nov/1995	26/out/2002
11/ago/2009	25/mai/2017	06/mai/2025	11/abr/2032
22/jan/2039	01/nov/2046	10/out/2054	14/set/2061
29/jun/2068	14/abr/2076	27/mar/2084	03/mar/2091
13/dez/2097	23/set/2105	02/set/2113	06/ago/2120

Tabela 5.5: Data dos inícios das estações do ano de **Urano**. As estações se referem ao hemisfério norte; para o hemisfério sul basta trocar verão por inverno e primavera por outono. No verão, diferente da Terra, o polo onde é verão está praticamente na direção do Sol, isto é, o Sol passa próximo do zênite no verão em Urano.

Equinócio Primavera	Solstício Verão	Equinócio Outono	Solstício Inverno
22/nov/1755	13/mar/1778	03/jan/1798	14/set/1817
29/nov/1839	27/mar/1862	17/jan/1882	21/set/1901
03/dez/1923	03/abr/1946	27/jan/1966	28/set/1985
07/dez/2007	11/abr/2030	01/fev/2050	01/out/2069
07/dez/2091	12/abr/2114	31/jan/2134	01/out/2153

5.2 Medida da velocidade da luz por Rømer

Em dezembro de 1676 foi publicada no *Journal de Sçavans*, na França, a primeira medida da velocidade da luz, proposta pelo astrônomo dinamarquês Ole Rømer (ou Olaus Roemer,

Tabela 5.6: Data dos inícios das estações do ano de **Netuno**. As estações se referem ao hemisfério norte; para o hemisfério sul basta trocar verão por inverno e primavera por outono.

Equinócio Primavera	Solstício Verão	Equinócio Outono	Solstício Inverno
07/ago/1716	24/mar/1757	31/ago/1798	02/mai/1840
18/dez/1880	08/nov/1921	09/jul/1963	16/mai/2005
03/abr/2046	25/fev/2087	08/jan/2129	04/set/2170




Figura 5.1: Aparência dos anéis de Saturno ao longo de sua órbita quando observados da Terra. Nesta figura, as imagens correspondem aos momentos de oposição, quando Saturno está mais próximo da Terra.

1644–1710). Até esta época, havia um debate se a luz se propagava instantaneamente ou se sua propagação tinha uma velocidade finita.

O método de Rømer baseia-se na observação do início (imersão) ou fim (emersão) do eclipse do satélite de Júpiter, Io. O momento do início ou fim do eclipse é praticamente instantâneo, uma vez que Io é pequeno (3640 km de diâmetro) e tem um movimento rápido (translação em torno de Júpiter leva 1 dia e 18,46 horas, aproximadamente). O eclipse na situação **A** da figura 5.3 acontecia antes do previsto, enquanto o eclipse na situação **B** ocorria após o previsto.

Rømer deduziu que a razão disto era a diferença das distâncias que a luz deveria percorrer. Cronometrando o avanço e o atraso, Rømer concluiu que havia uma diferença de 22 minutos caso Júpiter esteja em conjunção ou oposição. A diferença entre os percursos é de 2 U.A. (o diâmetro da órbita terrestre) e, portanto, a velocidade da luz seria $\sim 300 \times 10^6 / (22 \times 60)$ km/s, isto é, 227 mil km/s.

A medida de Rømer era imprecisa, na realidade a diferença é de 16,7 minutos, mas o resultado confirmou de vez que a luz se propaga com velocidade finita, e não instantânea.




Figura 5.2: Variação do ângulo em que os anéis são observados da Terra (azul) e do Sol (vermelho). O Norte é para cima na ilustração de Saturno.




Figura 5.3: Método de Rømer para medir a *velocidade da luz*, observando o início (ou fim) do eclipse de Io pela sombra de Júpiter. Na situação **A** o eclipse parecia ocorrer antes do previsto; na situação **B**, o eclipse parecia ocorrer com atraso. O desenho está fora de escala.

5.3 Leis de Kepler

Johannes Kepler nasceu em 1571 na cidade alemã de Weil e começou a cursar a universidade de Tübing em 1589. Em 1594 Kepler se torna professor de matemática em Graz, Áustria. Em 1600, foi convidado por Tycho Brahe para trabalhar em Praga. Após a morte de Brahe em 1601, Kepler foi nomeado “Matemático Imperial”, título que teve até 1612. Neste ano, Kepler se mudou para Linz onde ficou até 1626. Kepler morreu em 1630, na cidade de Regensburg.

Com os dados de excelente qualidade de Tycho Brahe – em particular em relação às posições de Marte –, Kepler descobriu as três **leis de movimento planetário** que levam o seu nome:

1ª lei (1609) As órbitas dos planetas são elipses, com o Sol localizado em um dos focos.

2ª lei (1609) A linha ligando o Sol ao planeta varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais.

(A 1ª e 2ª leis foram publicadas na obra “*Astronomia nova*”).

3ª lei (1619) O quadrado da razão dos períodos de translação de 2 planetas é proporcional ao cubo da razão de seus semi-eixos maiores, isto é,

$$\left(\frac{P_1}{P_2}\right)^2 = \left(\frac{a_1}{a_2}\right)^3.$$

(A 3ª lei foi publicada no livro “*Harmonice Mundi*”).

As leis de Kepler, deduzidas empiricamente, podem ser deduzidas a partir da teoria da *gravitação universal* de Isaac Newton (*Principia Mathematica*, publicado em 1687).

5.3.1 Primeira lei de Kepler

Rigorosamente, em um sistema de dois corpos puntiformes que interagem apenas pela gravitação, cada corpo descreve uma seção cônica (círculo, elipse, parábola ou hipérbole, veja Fig. 5.4), com o centro de massa da dupla em um dos focos. Se os corpos estão ligados gravitacionalmente, como no caso dos planetas com o Sol, por exemplo, então as órbitas são esféricas ou elípticas, dadas por:

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \theta}, \quad (5.1)$$

onde $e \equiv \sqrt{1 - (b/a)^2}$ é a excentricidade da elipse.




Figura 5.4: Seções cônicas, círculo, elipse, parábola e hipérbole. Acima: representação geométrica, intersecção de um cone por um plano. Abaixo: curvas planas das seções cônicas.

No caso onde a massa de um dos corpos é muito maior que do outro (p.ex., Sol–planeta, planeta–satélite) o centro de massa coincide, com grande precisão, com o corpo mais maciço. No caso do sistema Terra–Sol, o centro de massa se encontra a ≈ 450 km do centro do Sol (que tem um raio de 700 mil km).

A Fig. 5.5 mostra para comparação algumas elipses com diferentes elipticidades, inclusive uma elipse que corresponde à órbita terrestre.

5.3.2 Segunda lei de Kepler

A segunda lei de Kepler, ilustrada na Fig. 5.6, é uma consequência da conservação do *momento angular*. Assumindo que tratamos de um sistema de 2 corpos onde a massa de um dos corpos




Figura 5.5: Elipses (e um círculo a esquerda, $e = 0$) para comparação. A excentricidade $e = 0,017$ corresponde à órbita da Terra, dificilmente distinguível a olho de um círculo. A elipse mais a direita corresponde a uma razão entre o semi-eixo menor e maior igual a $1/2$. O foco das elipses e o centro do círculo estão na origem, $(0, 0)$.

é muito maior que o outro, temos

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = m \vec{r} \times \vec{v}, \quad (5.2)$$

onde L é o momento (quantidade de movimento) angular, p é a quantidade de movimento linear e r e v são o raio vetor e a velocidade do corpo mais leve de massa m .




Figura 5.6: Ilustração geométrica da segunda lei de Kepler: em intervalos de tempo iguais, o raio vetor varre áreas iguais. Aqui, as áreas a , b , c e d são iguais.

A área varrida pelo raio vetor que liga o corpo maciço (Sol, p.ex.) ao corpo mais leve (um planeta, p.ex.) é dada por (veja Fig. 5.7):

$$\text{área varrida} \equiv \delta A = \frac{1}{2} |\vec{r} \times \delta \vec{r}| = \frac{1}{2} |\vec{r} \times \vec{v} \delta t| = \frac{1}{2} \frac{|L|}{m} \delta t. \quad (5.3)$$

Mas como o momento angular se conserva, $|L|/m = \text{constante}$ e, portanto, $\delta A \propto \delta t$. Ou seja, para um mesmo intervalo δt , a área varrida δA é a mesma.




Figura 5.7: Área varrida pelo raio vetor r que percorre uma elipse.

Uma consequência da segunda lei de Kepler é que os corpos se deslocam com maior velocidade quando estão no periastro e com menor velocidade quando estão no apoastro.

5.3.3 Terceira lei de Kepler

A terceira lei de Kepler está relacionada com a conservação de energia. Para o caso de uma órbita circular podemos deduzir a 3ª lei de Kepler utilizando igualando a força centrípeta com a força gravitacional:

$$\frac{m v^2}{r} = \frac{g M m}{r^2} \Rightarrow v^2 = \frac{GM}{r}, \quad (5.4)$$

onde M é a massa do corpo mais maciço e vemos que, neste caso, não há dependência da massa do corpo menos maciço, m . Lembrando que o período orbital é $P = 2\pi r/v$, então vem:

$$\frac{(2\pi)^2 r^2}{P^2} = \frac{GM}{r} \Rightarrow \frac{r^3}{P^2} = \frac{GM}{4\pi^2}. \quad (5.5)$$

No Sistema Solar, em relação às órbitas dos planetas, M é sempre a mesma (a massa do Sol). Logo, para qualquer planeta, $r^3 \propto P^2$, onde r é o raio da órbita (assumindo órbita circular); genericamente, temos $a^3 \propto P^2$, onde a é semi-eixo maior da órbita elíptica. Em outros sistemas estelares ou planetários a terceira Lei de Kepler também é válida (Fig. 5.8).




Figura 5.8: A terceira Lei de Kepler se traduz em uma relação dita em lei de potência, $P \propto a^{3/2}$. Aqui observamos esta lei para os planetas (círculos vermelhos) e planetas-anões (círculos azuis) do Sistema Solar, assim como para os satélites de Júpiter (destaque no alto a esquerda).

Para o caso geral, a expressão acima tem uma pequena dependência com a massa do corpo mais leve:

$$\frac{a^3}{P^2} = \frac{G(M + m)}{4\pi^2}. \quad (5.6)$$

Com a terceira lei de Kepler é possível deduzir o tamanho do semi-eixo maior das órbitas planetárias conhecendo o período de translação. Em outros casos, se podemos medir o semi-eixo maior e o período, então podemos deduzir a massa do sistema.

5.4 Problema de 2 corpos

O chamado *problema de 2 corpos* é um dos mais importantes da astronomia e primeiro passo fundamental da *mecânica celeste*. Este problema trata de 2 corpos puntiformes de massas m_1 e m_2 , isolados do resto do Universo, que interagem apenas pela atração gravitacional (Fig. 5.9, painel (A)).




Figura 5.9: (A) Dois corpos de massas m_1 e m_2 com centro de massa na posição intermediária “c.m.” com os vetores de posição indicados em um referencial inercial. (B) Mesma configuração, mas com centro de massa na origem.

As equações que descrevem este sistema são dadas pela lei da *gravitação universal* de Newton:

$$\begin{aligned}\vec{F}_1 &= m_1 \ddot{\vec{r}}_1 = -Gm_1 m_2 \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{r_{12}^3}; \\ \vec{F}_2 &= m_2 \ddot{\vec{r}}_2 = -Gm_1 m_2 \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{r_{12}^3},\end{aligned}\quad (5.7)$$

onde usamos a notação $\ddot{\vec{r}} \equiv d^2\vec{r}/dt^2$. O vetor \vec{r}_0 na Fig. 5.9 é a posição do centro de massa ou *baricentro*:

$$\vec{r} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2} \equiv \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{M},$$

onde M é a massa total. Se somarmos as duas expressões da Eq. 5.7, lembrando que $(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = -(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)$, temos:

$$m_1 \ddot{\vec{r}}_1 + m_2 \ddot{\vec{r}}_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad m_1 \dot{\vec{r}}_1 + m_2 \dot{\vec{r}}_2 = \vec{v}_0 \quad \Rightarrow \quad m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 = M \vec{r} = \vec{v}_0 t + \vec{r}_0,$$

isto é, o centro de massa está em repouso (se $v_0 = 0$) ou em movimento retilíneo uniforme. Sem perda de generalidade, podemos adotar um sistema de referência onde o centro coincide com o centro de massa, pois continua sendo um referencial inercial. Neste novo referencial [Fig. 5.9, painel (B)], $m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 = 0$, portanto,

$$\begin{cases} \ddot{\vec{r}}_1 = -Gm_2 \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{r_{12}^3}; \\ \ddot{\vec{r}}_2 = -Gm_1 \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{r_{12}^3}, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \ddot{\vec{r}}_1 = -GM \frac{\vec{r}_1}{r_{12}^3}; \\ \ddot{\vec{r}}_2 = -GM \frac{\vec{r}_2}{r_{12}^3}, \end{cases} \Rightarrow \ddot{\vec{r}} = -GM \frac{\vec{r}}{r^3}; \quad (\vec{r}_{12} = \vec{r}) \quad (5.8)$$

O problema de 2 corpos fica reduzido a uma única equação vetorial. Como o vetor \vec{r} tem três componentes, então temos de fato 3 equações diferenciais de 2ª ordem, que necessitam de 6 constantes de integração, por exemplo, as coordenadas e a velocidade (com três componentes) iniciais.

Multiplicando vetorialmente a equação 5.8 pelo vetor \vec{r}_{12} obtemos:

$$\vec{r} \times \ddot{\vec{r}} = -GM \frac{\vec{r} \times \vec{r}}{r^3} = 0, \quad \text{pois } \vec{r} \times \vec{r} \equiv 0.$$

Logo, se $\vec{r} \times \ddot{\vec{r}} = 0$ então, integrando no tempo obtemos:

$$\vec{r} \times \dot{\vec{r}} = \vec{r} \times \vec{v} = \vec{h},$$

onde \vec{h} é uma constante do movimento que reconhecemos como o momento angular por unidade de massa, $\vec{h} \equiv \vec{L}/M$. Este resultado mostra que o momento angular se conserva e, portanto, o movimento de 2 corpos se dá em um plano perpendicular a \vec{L} . Esta é a base da 2ª Lei de Kepler. Esta é uma propriedade de qualquer sistema de forças centrais, como o caso de forças gravitacionais e eletrostáticas.

5.4.1 Órbitas keplerianas

Para determinarmos a órbita de um sistema de 2 corpos, fazemos o produto vetorial de \vec{h} com a equação 5.8:

$$\vec{h} \times \ddot{\vec{r}} = -GM \frac{\vec{h} \times \vec{r}}{r^3} = -\frac{GM}{r^3} \underbrace{(\vec{r} \times \dot{\vec{r}})}_{\vec{h}} \times \vec{r}.$$

O produto vetorial triplo pode ser re-escrito segundo a identidade:

$$(\vec{r} \times \dot{\vec{r}}) \times \vec{r} \equiv r^2 \dot{\vec{r}} - (r \dot{r}) \vec{r},$$

portanto,

$$\vec{h} \times \ddot{\vec{r}} = -GM \left(\frac{\dot{\vec{r}}}{r} - \frac{\dot{r} \vec{r}}{r^2} \right) = -GM \frac{d}{dt} \frac{\vec{r}}{r} = -GM \frac{d\hat{r}}{dt},$$

onde a notação \hat{r} significa vetor unitário ou versor. Integrando a expressão acima obtemos:

$$\vec{h} \times \dot{\vec{r}} = -GM \hat{r} - \vec{P}, \quad (5.9)$$

onde \vec{P} é uma constante de integração. Fazendo o produto escalar pelo vetor \vec{h} vem:

$$\vec{h} \cdot (\vec{h} \times \dot{\vec{r}}) = -GM \hat{r} \cdot \vec{h} - \vec{P} \cdot \vec{h} \Rightarrow \vec{P} \cdot \vec{h} = 0,$$

pois os vetores \vec{r} e \vec{h} são perpendiculares. Portanto, pelo resultado obtido, deduzimos que os vetores \vec{P} e \vec{h} também são perpendiculares.

Multiplicando a Eq. (5.9) pelo vetor \vec{r} resulta em:

$$\vec{r} \cdot (\vec{h} \times \dot{\vec{r}}) = -GM \vec{r} \cdot \hat{r} - \vec{r} \cdot \vec{P} \Rightarrow h^2 = GM r + \vec{r} \cdot \vec{P},$$

onde usamos a identidade $\vec{r} \cdot (\vec{h} \times \dot{\vec{r}}) \equiv -\vec{h}(\vec{r} \times \dot{\vec{r}}) = -\vec{h} \cdot \vec{h}$. O produto escalar entre dois vetores pode ser escrito em termos do ângulo entre as direções destes vetores, por exemplo, $\vec{r} \cdot \vec{P} = r P \cos \nu$. Portanto,

$$\frac{h^2}{GM r} = 1 + \frac{P \cos \nu}{GM}, \quad (5.10)$$

que a **equação de movimento** para um corpo sob ação da força da gravidade gerada por uma massa M . Esta equação é geralmente escrita na forma:

$$r(\nu) = \frac{q}{1 + e \cos \nu}; \text{ onde } e \equiv \frac{P}{GM} \text{ e } q = \frac{h^2}{GM} = \begin{cases} a(1 - e^2) & \text{se } e < 1; \text{ (elipse)} \\ a(e^2 - 1) & \text{se } e > 1; \text{ (hipérbole)} \end{cases} \quad (5.11)$$

A equação de movimento descreve uma **cônica** cuja forma depende de e , sua **excentricidade**, como vimos na seção 5.3.1. Demonstramos assim a 1ª Lei de Kepler. O ângulo ν é chamado **anomia verdadeira**, termo introduzido pelo próprio Kepler.¹ A Figura 5.10 ilustra o caso de órbita elípticas os vários ângulos e distâncias envolvidos.

Vemos ainda na expressão acima que a constante a é o semi-eixo maior no caso de uma elipse e $a(1 - e)$ e $a(1 + e)$ são os **apsides**, as distâncias mais próxima (periastro) e mais distante (apoastro) do foco da elipse (periélio e afélio, no caso de órbitas planetárias). O vetor \vec{P} que aparece na Eq. (5.9) é a direção do periastro. A anomia verdadeira é medida a partir do periastro em sentido anti-horário.

¹O termo *anomalia* vem do fato do ângulo variar de forma não uniforme, isto é anômala




Figura 5.10: Definições dos ângulos das anomalias verdadeira (ν) e excêntrica (E). O ponto B representa o corpo que nos interessa, em órbita elíptica com focos em F e F' . B' é a projeção vertical da posição do corpo B no círculo de raio a (círculo apsidal). P é o periastro da órbita e e é a excentricidade. Veja também a Fig. 5.4.

A equação do movimento, Eq. (5.11), dá a forma da órbita mas não descreve o movimento em função do tempo. Para tanto, Kepler introduziu a **anomalia excêntrica**, E , que é o ângulo a partir do centro da elipse (e não do foco) até a o ponto B' no círculo de raio a como ilustrado na Fig. 5.10 (o *círculo apsidal* de raio a).

No círculo temos $y_{\text{cir}} = \sqrt{a^2 - x^2}$ (para $y > 0$) e na elipse, $y_{\text{eli}} = (b/a)\sqrt{a^2 - x^2}$ ou seja, $y_{\text{eli}} = \sqrt{1 - e^2}y_{\text{cir}}$, já que $a/b = \sqrt{1 - e^2}$. Logo, na Fig. 5.10, temos $\overline{DB} = \sqrt{1 - e^2} \overline{DB'}$.

Por outro lado, também temos $\overline{DB'} = a \sin E$ e $\overline{DB} = r \sin \nu$, portanto,

$$r \sin \nu = a\sqrt{1 - e^2} \sin E \quad \text{e} \quad r \cos \nu = a(\cos E - e)$$

Elevando ao quadrado cada uma das expressões acima e somando, obtemos a relação o raio r e a anomalia excêntrica:

$$r = a(1 - e \cos E). \quad (5.12)$$

Finalmente, usando as equações (5.11) e (5.12) temos:

$$(1 - e \cos E) = \frac{1 - e^2}{1 + e \cos \nu} \Rightarrow \tan\left(\frac{\nu}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 + e}{1 - e}} \tan\left(\frac{E}{2}\right), \quad (5.13)$$

que relaciona as anomalias excêntrica e verdadeira.

Para obtermos a variação temporal das anomalias, no caso de órbitas elípticas ou circulares, usamos a 2ª Lei de Kepler para calcular a área colorida na Fig. 5.10, dada pelos pontos \widehat{BFP} que corresponde à área varrido pelo vetor posição do corpo B :

$$\text{área de } \widehat{BFP} = \pi ab \frac{t - \tau}{T}, \quad (5.14)$$

onde τ é o momento em que o corpo passa pelo periastro P , t é o momento em que o corpo chega em B e T é o período de uma órbita. Podemos definir a **anomalia média**, M como o ângulo medido a partir do centro que aumenta de forma uniforme com o tempo:

$$M = 2\pi \frac{t - \tau}{T} \Rightarrow \text{área de } \widehat{BFP} = \frac{ab}{2} M. \quad (5.15)$$

A área de uma elipse de semi-eixo maior a está relacionada à área de um círculo de raio a por uma transformação simples, dada pelo produto da área do círculo pela razão de eixos, b/a , da elipse. Assim:

$$\text{área de } \widehat{BFP} = \frac{b}{a} [\text{área de } \widehat{B'FP}].$$

Por outro lado, temos que a área de $\widehat{B'FP} = \widehat{B'OP} - \widehat{B'OF}$. Estas duas áreas são dadas por:

$$\text{área de } \widehat{B'OP} = \frac{1}{2}a^2E \quad \text{e} \quad \text{área de } \widehat{B'OF} = \frac{1}{2} \underbrace{(ae)}_{\text{base}} \times \underbrace{(a \operatorname{sen} E)}_{\text{altura}}.$$

Logo, área de $\widehat{B'FP} = \left(\frac{b}{a}\right) \frac{a^2}{2}(E - e \operatorname{sen} E)$.

Usando aa Eq. (5.15) obtemos finalmente:

$$\frac{ab}{2}(E - e \operatorname{sen} E) = \frac{ab}{2}M \quad \Rightarrow \quad E - e \operatorname{sen} E = M, \quad (5.16)$$

conhecida como **equação de Kepler**. Com as Eqs. (5.13) e (5.16), Kepler podia, a partir da anomalia média obter a anomalia verdadeira de um planeta e descrever seu movimento na órbita elíptica.

A equação de Kepler é transcendental, sem solução analítica, tendo que ser resolvida numericamente ou usando aproximações analíticas. A figura 5.11) ilustra a solução $E(M)$ graficamente para várias excentricidades.




Figura 5.11: Relação entre as anomalias médias, M , e excêntrica, E , para excentricidades de zero a um (em passos de $\Delta e = 0,1$) obtidas pela solução numérica da equação de Kepler.

Para excentricidade baixa ($e \lesssim 0,5$), podemos usar o método proposto pelo próprio Kepler de aproximações sucessivas:

$$\begin{aligned} \text{Faça: } E_0 &= M, \text{ e calcule: } E_1 = M + e \operatorname{sen} E_0. \\ \text{Em seguida calcule: } E_2 &= M + e \operatorname{sen} E_1; \quad E_3 = M + e \operatorname{sen} E_2; \dots \end{aligned}$$

Esta série converge em algumas iterações com um erro inferior à poucos segundos de arco.

A diferença entre as anomalias verdadeira e média, $(\nu - M)$, é chamada **equação do centro**. Para órbitas de baixa excentricidade, $e \lesssim 0,3$, a equação do centro pode ser bem aproximada por:

$$\begin{aligned} \nu - M \equiv C &= \left(2e - \frac{1}{4}e^3 + \frac{5}{96}e^5\right) \operatorname{sen} M + \left(\frac{5}{4}e^2 - \frac{11}{24}e^4 + \frac{17}{192}e^6\right) \operatorname{sen} 2M \\ &+ \left(\frac{13}{12}e^3 - \frac{43}{64}e^5\right) \operatorname{sen} 3M + \left(\frac{103}{96}e^4 - \frac{451}{480}e^6\right) \operatorname{sen} 4M + \left(\frac{1097}{960}e^5\right) \operatorname{sen} 5M. \end{aligned} \quad (5.17)$$

Movimento aparente do Sol

Do ponto de vista de um observador na Terra (mais precisamente, no baricentro do sistema Terra-Lua) o Sol descreve percorre uma órbita elíptica que se projeta como a eclíptica na esfera terrestre. O movimento médio do Sol é $2\pi/\text{ano}$, portanto $n \simeq 3548',1928/\text{dia}$. A anomalia média do Sol é $M = nt$, onde t é medido em dias.

A longitude do Sol, λ_{\odot} , em coordenadas eclípticas é medida a partir do ponto vernal, Υ , é dada por:

$$\lambda_{\odot} = L_0 + \nu \Rightarrow \lambda_{\odot} = L_0 + nt + C,$$

onde L_0 é a longitude do Sol em $t = 0$, $L_0 \simeq 280^{\circ}466$. Assim, a posição do Sol pode ser obtida de forma aproximada como:

$$\lambda_{\odot} = 280^{\circ}466 + n \text{JD}_{2000} + 2e \text{sen}(n \text{JD}_{2000}) + \frac{5}{4}e^2 \text{sen}(2n \text{JD}_{2000}),$$

onde $e \simeq 0,01671$ é a excentricidade da órbita da Terra (e só usamos a expansão da equação do centro até 2ª ordem) e JD_{2000} é o número de dias julianos desde a época J2000 ($\text{JD}_0 = 2451545$, veja sec. 2.3).

Por exemplo, se quisermos calcular a longitude do Sol no dia 14/12/2020 (dia de um eclipse solar total visível no Chile e Argentina, e parcialmente visto do Sul do Brasil), temos $\text{JD}_{2000} = 2459198 - 2451545 = 7653$ dias. Portanto,

$$M = n\text{JD}_{2000} = +0^{\circ}98561 \times 7653 = 7542^{\circ}8666 = 342^{\circ}867,$$

onde reduzimos o ângulo M para o intervalo 0° – 360° . Assim,

$$\lambda_{\odot} = 280^{\circ}466 + 342^{\circ}867 + 1^{\circ}91482 \text{sen } 342^{\circ}867 + 0^{\circ}019998 \text{sen}(2 \times 342^{\circ}867) = 262^{\circ}757.$$

O valor obtido através de um cálculo rigoroso, levando em conta as perturbações planetárias e da Lua resulta em $\lambda_{\odot} = 262^{\circ}955$, uma diferença de apenas $12'$. Com este método super-simplificado, é possível obter a posição do Sol com uma precisão típica inferior a meio grau. Para datas muito distantes de J2000 é necessário levar em conta a precessão dos equinócios.

5.5 Variações seculares dos movimentos da Terra

A órbita da Terra ao redor do Sol não é fixa, assim como a orientação da Terra, a inclinação do eixo de rotação em relação à eclíptica, (obliquidade) também não é, como vimos na Sec. 3.2.2.

A órbita da Terra é descrita por *parâmetros orbitais* que definem a trajetória da Terra no espaço. Devido às perturbações gravitacionais planetárias, não esfericidade do Sol e da Terra, e efeitos relativísticas, a órbita da Terra não é uma elipse fixa no espaço. A figura 5.12 ilustra a variação de alguns parâmetros orbitais em um intervalo de 2 milhões de anos.

Além de alterar a posição da Terra, e conseqüentemente, dos astros na esfera celeste, estas alterações podem ter um impacto no clima terrestre. Variações da excentricidade, longitude do periélio e da obliquidade afetam a insolação da atmosfera (veja Sec. 2.6). A variação do semi-eixo maior da órbita da Terra (mais precisamente, do sistema Terra-Lua) é inferior a 0,003% em um intervalo de tempo de 500 milhões de anos centrado em J2000.

A interação entre os parâmetros orbitais da Terra e mudanças climáticas foi sugerido em 1842 pelo matemático francês Joseph-Alphonse Adhémar, após a descoberta dos ciclos de glaciação e aquecimento, em seu livro “*Révolutions de la mer, déluges périodiques*”.

Esta ideia foi levada adiante de forma mais quantitativa pelo pesquisador sérvio Milutin Milankovitch (ou Milanković) em 1920, estendendo a relação entre órbita e clima para outros planetas do Sistema Solar.




Figura 5.12: Variação secular de alguns parâmetros orbitais terrestre no intervalo de tempo de 2 milhões de anos centrado em J2000.

A duração das estações do ano, definida pelas passagens do Sol pelos equinócios e solstícios (Secs. 1.3.1 e 1.5.2) também são afetadas pelas variações seculares do movimento da Terra. Calculando a duração de cada estação em função do tempo obtemos a Fig. 5.13. Durante o século xiii, a duração do Outono (hemisfério Sul) era virtualmente igual à duração do Inverno (93 dias e 7 horas), enquanto que a Primavera e o Verão tinham a mesma duração de 89 dias e 8 horas cada.

Devido a não simetria da distribuição de massas continentais e oceanos, a variação da duração das estações do ano podem levar a variações climáticas. As variações do movimento da Terra podem levar a mudanças climáticas em escalas de tempo de dezenas ou centenas de milhares de anos, mas não podem explicar alterações no clima em escalas de alguns séculos.

5.6 Baricentro do Sistema Solar e movimento do Sol

O *centro de massa* ou **baricentro**, \vec{r}_{cm} , de um sistema de N corpos é dado por:

$$\vec{r}_{\text{cm}} = (x_{\text{cm}}, y_{\text{cm}}, z_{\text{cm}}) = \frac{\sum_i^N \vec{r}_i \times m_i}{\sum_i^N m_i}, \quad (5.18)$$

onde $(x_{\text{cm}}, y_{\text{cm}}, z_{\text{cm}})$ são as coordenadas cartesianas do centro de massa e \vec{r}_i e m_i são as posições e massas individuais de cada corpo i do sistema (inclusive o Sol). Aqui, por simplicidade, assumimos que cada corpo se comporta como um ponto, e não um objeto extenso. Apenas para corpos não esféricos esta aproximação não é necessariamente boa.

Em um sistema gravitacional de 2 corpos, o baricentro se encontra em um dos focos das elipses, que correspondem aos movimentos orbitais. Por exemplo, no sistema Terra–Lua, ambos os corpos orbitam ao redor do baricentro. Como a Terra tem massa muito superior à da Lua, o baricentro encontra-se no interior da Terra. Por isto, muitas vezes ignoramos isto e assumimos que a Lua orbita a Terra, e não o baricentro do sistema Terra–Lua.




Figura 5.13: Esquerda: Duração em dias das estações do ano para o hemisfério Sul (para o hemisfério Norte basta trocar Primavera por Outono e Verão por Inverno). O ano zero corresponde a 1 A.C.. Nos painéis central e a direita, detalhe mostrando a duração das estações próximo da época atual. Para Primavera e Verão a duração é de 88 dias e 21 horas mais o número de horas indicado no gráfico. Para Outono e Inverno, as horas são somadas a 92 dias e 15 horas.

Tabela 5.7: Datas de distâncias mínimas (menor que $R_{\odot}/4$) entre o Sol e o baricentro do Sistema Solar. Distância em unidades de raios solares. Intervalo de tempo considerado 1700–2500.

data	$r_{\text{cm}}[R_{\odot}]$	data	$r_{\text{cm}}[R_{\odot}]$	data	$r_{\text{cm}}[R_{\odot}]$	data	$r_{\text{cm}}[R_{\odot}]$
31/07/1772	0.16606	18/05/1951	0.08592	09/03/2130	0.02248	30/12/2308	0.03315
06/06/1811	0.06230	23/04/1990	0.06391	04/04/2169	0.03566	02/04/2348	0.00934
17/11/1850	0.09873	25/01/2030	0.13422	05/04/2209	0.15895	19/04/2388	0.17607

No caso do Sistema Solar, o corpo mais importante, por causa de sua massa, é de longe o Sol. O centro de massa do Sistema Solar sempre está próximo do Sol, muitas vezes no seu interior. O Sol se move em relação ao baricentro devido às órbitas dos planetas, principalmente Júpiter e os outros gigantes gasosos. O produto do semi-eixo maior da órbita com a massa do planeta dividido pela massa do Sistema Solar nos diz o quanto um planeta pode perturbar o Sol e movê-lo do baricentro:

Júpiter	Saturno	Netuno	Urano	Terra	Venus	Éris	Marte	Plutão	Mercúrio
1,0672	0,5858	0,3326	0,1799	0,00065	0,00038	0,00012	0,00011	0,00006	0,00001

Deslocamento do Sol em relação ao baricentro do Sistema Solar em unidades de raio solar. Para corpos com órbitas muito elípticas, estes valores variam significativamente. Note que Júpiter sozinho é responsável por quase metade do deslocamento do Sol e que a contribuição dos planetas telúricos é praticamente insignificante.

A Fig. 5.14 ilustra a posição do baricentro em relação ao Sol entre 1980 e 2060 e a distância radial, $|\vec{r}_{\text{cm}}|$, entre 1850 e 2250. Os mínimos ocorrem quando Júpiter e Saturno estão alinhados em lados opostos em relação ao Sol.

Além do deslocamento no plano eclíptica, o Sol também se move na direção perpendicular a este plano. Este movimento é devido às órbitas planetárias não serem rigorosamente coplanares. O Sol pode oscilar até cerca de 43 mil km ($0,062 R_{\odot}$) acima ou abaixo do plano da eclíptica.




Figura 5.14: Em cima: Trajetória do baricentro do Sistema Solar em relação ao Sol (na realidade, é o Sol que se move em relação ao baricentro) observado do polo norte da eclíptica. O círculo amarelo representa o Sol e tem um raio, R_{\odot} , que corresponde a 695,7 mil km. O círculo central tem 10% do raio solar e o círculo externo cinza claro tem o dobro do raio do Sol. Em baixo: Variação da distância do Sol ao baricentro (em unidades do raio solar) em função do tempo.

Tabela 5.8: Datas de distâncias máximas (maior que $2R_{\odot}$) entre o Sol e o baricentro do Sistema Solar. Distância em unidades de raios solares. Intervalo de tempo considerado 1700–2500.

data	$r_{\text{cm}}[R_{\odot}]$	data	$r_{\text{cm}}[R_{\odot}]$	data	$r_{\text{cm}}[R_{\odot}]$
06/04/1804	2.10741	28/03/1983	2.09765	20/06/2316	2.03043
03/04/1843	2.06979	08/02/2162	2.05238	16/06/2495	2.06250

Referências Bibliográficas

- [1] Boczko R., 1984, 'Conceitos de astronomia', Editora Edgard Blücher Ltda.
- [2] Carroll B.W., Ostlie D.A., 1996, 'Modern Astrophysics', Addison-Wesley Publ. Company Inc.
- [3] 'Connaissance des Temps – Éphémérides Astronomiques', publicação anual do *Bureau des Longitudes de Paris*, França
- [4] Dreyer J.L.E., 1953, 'A History of Astronomy from Thales to Kepler', 2ª edição, Dover Publications, Inc.
- [5] Green R.M., 1985, "Spherical Astronomy", Cambridge University Press
- [6] Kovalevsky J., 1995, 'Modern Astrometry', Astronomy and Astrophysics Library, Springer Verlag
- [7] Meeus J., 1991, 'Astronomical Algorithms', Willmann-Bell Inc.
- [8] Pannekoek A., 1961, 'A History of Astronomy', Dover Publications, Inc.
- [9] Seidelmann P.K., 1992, 'Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac', University Science Books
- [10] Smart W.M., 1977, 'Textbook on Spherical Astronomy', 6ª edição, Cambridge University Press
- [11] Snyder J.P., 1997, 'Flattening the Earth: 2000 years of map projections', The University of Chicago Press
- [12] Taff L.G., 1981, 'Computational Spherical Astronomy', Wiley-Interscience Publication
- [13] Urban S.E., Seidelmann P.K., 2012, 'Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac', 3ª Edição, Univ Science Books

Índice Remissivo

A

Abd al-Rahman, 112
aberração secular, 97
Abu al-Biruni, 112
Abu Ishaq Ibrahim ibn Yahya al-Zarqali, 112
aceleração aparente da Lua, 49
Adams, 49
afastamento da Lua, 50
afélio, 10
Aglaonice, 108
Ahmad al-Fargani, 112
Alexandria, 108, 125
Almagesto, 110, 112
Almucântara, 12
Alpetragius, 112
al-Sufi, 112
altura, 12
al-Zarkali, 112
analema, 37
Anaximandro, 103
Anaxímenes de Mileto, 103
Andrômeda, 2
ângulo da vertical, 68
ângulo de refração, 79
ângulo horário, 15, 16
anno domini, 56
ano, 35, 54
ano anomalístico, 44
ano bissexto, 56
ano draconiano, 44, 123
ano marciano, 134
ano trópico, 43
anomalia, 142
anomalia excêntrica, 143
anomalia média, 39, 143
anomalia verdadeira, 62, 142
anomalias, 77
anos bissextos, 46
Antártico, 14
anular-total, 120
Apolônio, 109

apsides, 142
arcos gravitacionais, 98
áreas iguais, 30
Áries, 14
Aristarco, 107
Aristóteles, 106
Ártico, 14
Arzachel, 112
ascensão reta, 14
aspecto, 30
Assuã, 108, 125
asterismos, 4
astrometria, 2
astronomia de posição, 2
Astronomia nova, 137
atmosfera terrestre, 78
Averróis, 112
azimutais, 31
azimutal, 30
azimute, 12

B

baricentro, 141, 146
BeiDou, 69
bissextos, 56
blue moon, 46
Bureau de Longitudes de Paris, 73

C

calendário, 54
Calendário Republicano, 57
Campano de Novara, 113
catálogo fundamental, 10
centro de massa, 146
Ciclo de indicação, 58
Ciclo de Meton, 57
Ciclo metônico, 46, 58
Ciclo solar, 58
ciclos astronômicos, 35
cilíndrica, 30
círculo
grande, principal, 11

círculo apsidal, 143
círculo polar, 14
circumpolar, 18
Clairaut, 68
Cláudio Ptolomeu, 110
configurações planetárias, 117
conformes, 30
cônica, 142
cônica, 30
cônica equidistante, 31
conjunção inferior, 117
conjunção superior, 118
constante de aberração, 95
Constante Solar, 61
constelações, 3
coordenadas
 aparentes, 96
 médias, 75
 verdadeiras, 75
coordenadas aparentes, 100
crepúsculo, 83
cronologia, 54
culminação, 18
culminação inferior, 20
culminação superior, 20

D

data juliana, 58
De Luce, 113
De revolutionibus orbium cœlestium, 114
declinação, 14
dia, 35, 54
dia estelar, 36
dia juliano, 58
dia sideral, 35
dia solar, 37
direção verdadeira, 31
Dominica, 55

E

eclipse anular, 119
eclipse da Lua, 119
eclipse do Sol, 118
eclipse total, 119
eclíptica, 8
elipse paraláctica, 87
elipsoide de revolução, 77
elongação, 99, 118
elongação máxima, 110
elongação ocidental, 118
elongação oriental, 118
época, 59
equação de Kepler, 144
equação de movimento, 142
Equação do Centro, 39
equação do centro, 144
equação do tempo, 38

equador celeste, 13
Equador Galáctico, 17
equador geográfico, 66
equidistante, 32
equidistantes, 31
equinócio, 43
equinócio vernal, 14
equiretangular, 32
Eratóstenes, 108
esfera celeste, 1
esferas homocêntricas, 105
Estação Espacial Internacional, 71
estações, 14, 43
estações do ano, 9, 133
Estereográfica, 31
esterradiano, 1
Estrela de Barnard, 100
Estrela Polar, 20
Eudoxo, 105
European Space Agency, 2
excentricidade, 67, 142, 145
Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac, 99

F

fases, 6
fases da Lua, 35
fases de Vênus, 115
Fifth Fundamental Catalogue, 100
Filolau, 105
FK5, 100
fórmula de Laplace, 81
fórmula fundamental, 27
frenagem, 49
fuso horário, 52

G

Galileo, 69
Galileu Galilei, 114
Gemini Norte, 27
Gêmeo de Rhodes, 109
geocêntrico, 11
geodésica, 26
Geografia, 29
Geóide, 65
geóide, 66
Georg von Peurbach, 113
Geraldo de Cremona, 113
Global Navigation Satellite System, 69
Global Positioning System, 69
GLONASS, 69
gnômon, 103
Gnomônica, 31
gravitação universal, 138, 141
Greenwich Mean Time, 41
Guilherme de São Clodoaldo, 113

H

Halley, 49
 Hammer-Aifoff, 33
 Harmonice Mundi, 138
 HEALPix, 33
 Hégira, 57
 heliacal, 42
 heliocêntrico, 11
 Heráclides Ponticus, 107
 híbrido, 120
 Hiparco, 108
 Hipátia, 111
 Hipócrates de Quios, 104
 Hipparcos, 2, 86
 hora sideral de Greenwich, 36
 hora sideral local, 35, 36
 hora sideral média, 35
 hora sideral verdadeira, 35
 Horário de Verão, 53
 horizonte, 2
 horizonte astronômico, 12
 horas, 2

I

Ibn al-Haytham, 112
 Ibn Rochd de Córdoba, 112
 IERS Rapid Service/Prediction Center, 48
 indicatriz de Tissot, 34
 indicação, 58
 Insolação, 61
 International Celestial Reference Frame, 10
 International Celestial Reference System, 10
 International Earth Rotation Service, 78
 Isaac Newton, 116
 ISS, 71

J

Jacobiano, 29
 João de Sacrobosco, 113
 Johannes Kepler, 116
 Johannes Müller de Königsberg, 114
 Joseph Justus Scaliger, 58
 Journal de Sçavans, 135
 Júpiter, 135

K

Kitab al-Manazir, 112

L

latitude, 20, 65
 latitude astronômica, 66
 latitude eclíptica, 17
 latitudes, 11
 latitudes geocêntricas, 66
 leap second, 51
 leis de movimento planetário, 137
 lente gravitacional, 98

Leucipo de Mileto, 103
 Libra, 14
 linha de mudança de data, 52
 linha de rumo, 28
 longitude, 65
 longitude eclíptica, 17
 longitudes, 11
 loxodromia, 28
 Lua Azul, 46
 Lua Cheia, 6
 Lua cheia, 35
 luação, 44

M

Marciano Capella, 111
 Marte, 134
 mecânica celeste, 140
 Mercator, 32
 meridiano local, 13, 15
 meridiano principal, 11, 13
 mês, 35, 44, 54
 mês anomalístico, 124
 mês sideral, 46
 mês sinódico, 44, 124
 meteoros, 2
 Meton de Atenas, 46
 Michael Scot, 113
 milênio juliano, 43, 59
 milha náutica, 28
 Mini Lua, 45
 momento angular, 138
 Monte Regio, 114
 movimento anual, 14
 movimento aparente, 4
 movimento diário, 6
 movimento direto, 14
 movimento médio do Sol, 41
 movimento próprio, 3, 6, 91
 movimento próprio total, 93
 mudanças climáticas, 145
 Muhammad al-Battani, 112
 Muhammad al-Khwarizmi, 112
 Mysterium Cosmographicum, 116

N

nadir, 2, 12
 nascer, 81
 nascimento heliacal, 42
 Nasir al-Din al-Tusi, 113
 National Earth Orientation Service, 78
 Netuno, 136
 Newcomb, 49
 Newton, 141
 Nicolas de Oresme, 113
 Nicolau Copérnico, 114
 Nicolau de Cusa, 113
 nodo ascendente, 44

nodos, 7
Nur ad-Din al-Bitruji, 112
nutação, 72
Nuvem de Oort, 94, 95
nuvens de Magalhães, 2

O

obliquidade da eclíptica, 65
Oenopides, 104
oposição, 118
orientação, 3
Ortográfica, 31

P

Pálida, 93
paralaxe, 84
paralaxe anual, 84
paralaxe diária, 88
paralaxe horizontal, 89
paralelo padrão, 31
parâmetros orbitais, 145
parciais, 119
Parmênides, 103
parsec, 85
passagem meridiana, 18, 37
penumbra, 119
penumbral, 122
periélio, 10, 94
período de saros, 124
Período Juliano, 58
período sinódico, 118
perspectivas, 30
Pitágoras, 104
planetas exteriores, 118
planetas interiores, 117
planisfério, 26
plano principal, 11
plate carée, 32
plate carrée, 32
polo celeste, 4
ponto de Áries, 14
ponto de Libra, 14
pôr, 81
precessão, 7, 24
precessão geodésica, 72
precessão luni-solar, 72
precessão planetária, 72
primeiro vertical, 13, 25
Principia, 116
Principia Mathematica, 138
problema de 2 corpos, 140
Proxima Centauri, 85, 94
pseudo-distância, 70
pseudo-range, 70

Q

Qibla, 112

quadratura, 118

R

Radiogaláxia, 10
realização, 10
redução ao dia, 100
Redução ao Equador, 39
refração astronômica, 79
Regiomontanus, 114
Research Consortium on Nearby Stars, 87
retrógrado, 8
Robert Grosseteste, 113
Roemer, 135

S

saros, 124
satélites de Júpiter, 115
Saturno, 135
século juliano, 59
segundo de tempo sideral, 36
segundo intercalar, 51
semana, 35, 55
Shabbat, 55
Siena, 108
sinusoidal, 33
Sistema de navegação por satélite, 69
Sistema de referência, 10
sistema de referências, 2
Sistema Solar, 147
Sol médio, 37
Sol verdadeiro, 37
sólidos platônicos, 116
solstício, 43
stadia, 107, 108
stadium, 108
Super Lua, 45

T

Tábuas de Toledo, 112
Tabule Almanach Planetarium, 113
Tales de Mileto, 102
tectônica de placas, 50
Tempo Atômico Internacional, 48
tempo civil, 41
tempo das efemérides, 47
tempo dinâmico, 46
tempo dinâmico baricêntrico, 47
tempo dinâmico terrestre, 47
tempo sideral, 36, 39
tempo sideral local, 16
Tempo Terrestre, 48
Tempo Universal, 41
tempo universal coordenado, 50
temporada de eclipses, 123
Téon de Alexandria, 111
teoria atomista, 104
termo de Chandler, 77

Theoricae novae planetarum, 113
topocêntrico, 11, 19
trânsito, 15, 83
trânsito superior, 20
Tratado da Esfera, 29, 113
triângulo esférico, 26
Trópico de Câncer, 14
Trópico de Capricórnio, 14
Tycho Brahe, 115

U

Ulugh Beg, 113
umbra, 119
Universal Time, 41
Uraniborg, 115
Urano, 135
uranografia, 29
Uranometria, 4

V

velocidade da luz, 137
vertical astronômica, 66

W

WGS, 65
World Geodetic System, 65

X

Xenofanes de Colophon, 103

Z

zênite, 2, 12
Zij al-Sindh, 112
Zij-i Ilkhani, 113

Almanaque

Domingo de páscoa entre 1970 e 2069 (veja seção 2.5):

29 Março 1970 ;	15 Abril 1990 ;	4 Abril 2010 ;	21 Abril 2030 ;	10 Abril 2050
11 Abril 1971 ;	31 Março 1991 ;	24 Abril 2011 ;	13 Abril 2031 ;	2 Abril 2051
2 Abril 1972 ;	19 Abril 1992 ;	8 Abril 2012 ;	28 Março 2032 ;	21 Abril 2052
22 Abril 1973 ;	11 Abril 1993 ;	31 Março 2013 ;	17 Abril 2033 ;	6 Abril 2053
14 Abril 1974 ;	3 Abril 1994 ;	20 Abril 2014 ;	9 Abril 2034 ;	29 Março 2054
30 Março 1975 ;	16 Abril 1995 ;	5 Abril 2015 ;	25 Março 2035 ;	18 Abril 2055
18 Abril 1976 ;	7 Abril 1996 ;	27 Março 2016 ;	13 Abril 2036 ;	2 Abril 2056
10 Abril 1977 ;	30 Março 1997 ;	16 Abril 2017 ;	5 Abril 2037 ;	22 Abril 2057
26 Março 1978 ;	12 Abril 1998 ;	1 Abril 2018 ;	25 Abril 2038 ;	14 Abril 2058
15 Abril 1979 ;	4 Abril 1999 ;	21 Abril 2019 ;	10 Abril 2039 ;	30 Março 2059
6 Abril 1980 ;	23 Abril 2000 ;	12 Abril 2020 ;	1 Abril 2040 ;	18 Abril 2060
19 Abril 1981 ;	15 Abril 2001 ;	4 Abril 2021 ;	21 Abril 2041 ;	10 Abril 2061
11 Abril 1982 ;	31 Março 2002 ;	17 Abril 2022 ;	6 Abril 2042 ;	26 Março 2062
3 Abril 1983 ;	20 Abril 2003 ;	9 Abril 2023 ;	29 Março 2043 ;	15 Abril 2063
22 Abril 1984 ;	11 Abril 2004 ;	31 Março 2024 ;	17 Abril 2044 ;	6 Abril 2064
7 Abril 1985 ;	27 Março 2005 ;	20 Abril 2025 ;	9 Abril 2045 ;	29 Março 2065
30 Março 1986 ;	16 Abril 2006 ;	5 Abril 2026 ;	25 Março 2046 ;	11 Abril 2066
19 Abril 1987 ;	8 Abril 2007 ;	28 Março 2027 ;	14 Abril 2047 ;	3 Abril 2067
3 Abril 1988 ;	23 Março 2008 ;	16 Abril 2028 ;	5 Abril 2048 ;	22 Abril 2068
26 Março 1989 ;	12 Abril 2009 ;	1 Abril 2029 ;	18 Abril 2049 ;	14 Abril 2069




Figura 5.15: Número de vezes em que ocorre o domingo de Páscoa em um intervalo de 3 mil anos para as datas entre 22 de março e 25 de abril.

Início das estações do ano, definido por $\lambda_{\odot} = 0, 90^{\circ}, 180^{\circ}$ e 270° . Data em Tempo Universal Coordenado (UTC). Para hora legal de Brasília subtraia 3 horas (2 horas durante o horário de Verão). O erro é inferior a 20 segundos. Tabela calculada usando a teoria planetária VSOP87 (Bretagnon et al. 1987).

ano	Outono			Inverno			Primavera			Verão										
	março	dia	hh:mm:ss	duração	#	junho	dia	hh:mm:ss	duração	#	setembro	dia	hh:mm:ss	duração	#	dezembro	dia	hh:mm:ss	duração	#
1990:	20	21:19:17	92.75940	[dias]	#	21	15:32:48	93.64077	[dias]	#	23	06:55:31	89.84132	[dias]	#	22	03:07:00	88.99649	[dias]	#
1991:	21	03:01:57	92.76170	[dias]	#	21	21:18:48	93.64535	[dias]	#	23	12:48:06	89.83720	[dias]	#	22	08:53:39	88.99612	[dias]	#
1992:	20	08:48:04	92.76813	[dias]	#	21	03:14:10	93.64488	[dias]	#	22	18:42:47	89.83365	[dias]	#	21	14:43:14	88.99820	[dias]	#
1993:	20	14:40:39	92.76327	[dias]	#	21	08:59:45	93.64079	[dias]	#	23	00:22:29	89.83565	[dias]	#	21	20:25:49	89.00153	[dias]	#
1994:	20	20:28:01	92.76356	[dias]	#	21	14:47:33	93.64700	[dias]	#	23	06:19:13	89.83577	[dias]	#	22	02:22:43	88.99424	[dias]	#
1995:	21	02:14:26	92.76386	[dias]	#	21	20:34:23	93.65181	[dias]	#	23	12:12:60	89.83598	[dias]	#	22	08:16:48	88.99047	[dias]	#
1996:	20	08:03:05	92.76435	[dias]	#	21	02:23:44	93.65025	[dias]	#	22	18:00:06	89.83735	[dias]	#	21	14:05:53	88.99221	[dias]	#
1997:	20	13:54:40	92.76755	[dias]	#	21	08:19:56	93.64989	[dias]	#	22	23:55:46	89.84116	[dias]	#	21	20:07:02	88.99132	[dias]	#
1998:	20	19:54:32	92.75559	[dias]	#	21	14:02:35	93.64904	[dias]	#	23	05:37:12	89.84672	[dias]	#	22	01:56:28	88.99261	[dias]	#
1999:	21	01:45:49	92.75229	[dias]	#	21	19:49:07	93.65444	[dias]	#	23	11:31:30	89.84188	[dias]	#	22	07:43:48	88.99406	[dias]	#
2000:	20	07:35:15	92.75865	[dias]	#	21	01:47:42	93.65270	[dias]	#	22	17:27:35	89.84017	[dias]	#	21	13:37:26	88.99533	[dias]	#
2001:	20	13:30:43	92.75487	[dias]	#	21	07:37:43	93.64358	[dias]	#	22	23:04:28	89.84515	[dias]	#	21	19:21:29	88.99629	[dias]	#
2002:	20	19:16:08	92.75574	[dias]	#	21	13:24:24	93.64652	[dias]	#	23	04:55:23	89.84651	[dias]	#	22	01:14:22	88.98986	[dias]	#
2003:	21	00:59:46	92.75743	[dias]	#	21	19:10:28	93.65025	[dias]	#	23	10:46:49	89.84513	[dias]	#	22	07:03:48	88.98946	[dias]	#
2004:	20	06:48:38	92.75572	[dias]	#	21	00:56:52	93.64789	[dias]	#	22	16:29:50	89.84151	[dias]	#	21	12:41:36	88.99432	[dias]	#
2005:	20	12:33:25	92.75882	[dias]	#	21	06:46:07	93.65072	[dias]	#	22	22:23:09	89.84151	[dias]	#	21	18:34:56	88.99350	[dias]	#
2006:	20	18:25:34	92.75020	[dias]	#	21	12:25:51	93.65105	[dias]	#	23	04:03:22	89.84633	[dias]	#	22	00:22:05	88.98981	[dias]	#
2007:	21	00:07:25	92.74931	[dias]	#	21	18:06:25	93.65611	[dias]	#	23	09:51:13	89.84485	[dias]	#	22	06:07:48	88.98645	[dias]	#
2008:	20	05:48:17	92.75769	[dias]	#	20	23:59:21	93.65633	[dias]	#	22	15:44:28	89.84672	[dias]	#	21	12:03:44	88.98603	[dias]	#
2009:	20	11:43:37	92.75131	[dias]	#	21	05:45:31	93.64796	[dias]	#	22	21:18:34	89.85292	[dias]	#	21	17:46:47	88.98987	[dias]	#
2010:	20	17:32:11	92.74736	[dias]	#	21	11:28:24	93.65321	[dias]	#	23	03:09:00	89.85377	[dias]	#	21	23:38:26	88.98769	[dias]	#
2011:	20	23:20:42	92.74707	[dias]	#	21	17:16:29	93.65842	[dias]	#	23	09:04:36	89.85098	[dias]	#	22	05:30:01	88.98915	[dias]	#
2012:	20	05:14:24	92.74610	[dias]	#	20	23:08:47	93.65289	[dias]	#	22	14:48:57	89.84906	[dias]	#	21	11:11:35	88.99327	[dias]	#
2013:	20	11:01:53	92.75141	[dias]	#	21	05:03:55	93.65291	[dias]	#	22	20:44:06	89.85199	[dias]	#	21	17:10:58	88.99034	[dias]	#
2014:	20	16:57:04	92.74593	[dias]	#	21	10:51:12	93.65128	[dias]	#	23	02:29:02	89.85691	[dias]	#	21	23:02:59	88.98759	[dias]	#
2015:	20	22:45:07	92.74498	[dias]	#	21	16:37:53	93.65460	[dias]	#	23	08:20:31	89.85236	[dias]	#	22	04:47:55	88.98767	[dias]	#
2016:	20	04:30:09	92.75277	[dias]	#	20	22:34:09	93.65760	[dias]	#	22	14:21:05	89.84935	[dias]	#	21	10:44:08	88.98922	[dias]	#
2017:	20	10:28:36	92.74689	[dias]	#	21	04:24:07	93.65114	[dias]	#	22	20:01:46	89.85149	[dias]	#	21	16:27:54	88.99133	[dias]	#
2018:	20	16:15:25	92.74433	[dias]	#	21	10:07:15	93.65750	[dias]	#	23	01:54:03	89.85322	[dias]	#	21	22:22:41	88.98312	[dias]	#
2019:	20	21:58:23	92.74709	[dias]	#	21	15:54:12	93.66383	[dias]	#	23	07:50:07	89.85366	[dias]	#	22	04:19:23	88.97929	[dias]	#
2020:	20	03:49:34	92.74587	[dias]	#	20	21:43:37	93.65762	[dias]	#	22	13:30:35	89.85534	[dias]	#	21	10:02:16	88.98273	[dias]	#
2021:	20	09:37:24	92.74631	[dias]	#	21	03:32:05	93.65898	[dias]	#	22	19:21:01	89.85988	[dias]	#	21	15:59:14	88.98202	[dias]	#
2022:	20	15:33:20	92.73641	[dias]	#	21	09:13:46	93.65962	[dias]	#	23	01:03:37	89.86425	[dias]	#	21	21:48:08	88.98349	[dias]	#
2023:	20	21:24:21	92.73152	[dias]	#	21	14:57:44	93.66122	[dias]	#	23	06:49:53	89.85929	[dias]	#	22	03:27:16	88.98544	[dias]	#
2024:	20	03:06:18	92.73930	[dias]	#	20	20:50:54	93.66157	[dias]	#	22	12:43:33	89.85897	[dias]	#	21	09:20:28	88.98675	[dias]	#
2025:	20	09:01:22	92.73665	[dias]	#	21	02:42:09	93.65075	[dias]	#	22	18:19:13	89.86371	[dias]	#	21	15:02:58	88.98811	[dias]	#
2026:	20	14:45:50	92.73510	[dias]	#	21	08:24:23	93.65327	[dias]	#	23	00:05:05	89.86460	[dias]	#	21	20:50:06	88.98226	[dias]	#
2027:	20	20:24:33	92.74038	[dias]	#	21	14:10:42	93.66033	[dias]	#	23	06:01:34	89.86142	[dias]	#	22	02:42:01	88.98262	[dias]	#
2028:	20	02:16:60	92.73949	[dias]	#	20	20:01:51	93.65507	[dias]	#	22	11:45:09	89.85720	[dias]	#	21	08:19:31	88.98772	[dias]	#
2029:	20	08:01:49	92.74049	[dias]	#	21	01:48:08	93.65987	[dias]	#	22	17:38:20	89.85806	[dias]	#	21	14:13:56	88.98472	[dias]	#
2030:	20	13:51:56	92.73557	[dias]	#	21	07:31:08	93.66359	[dias]	#	22	23:26:43	89.86302	[dias]	#	21	20:09:27	88.98010	[dias]	#
2031:	20	19:40:48	92.73344	[dias]	#	21	13:16:57	93.66539	[dias]	#	23	05:15:07	89.86129	[dias]	#	22	01:55:22	88.97662	[dias]	#
2032:	20	01:21:42	92.74088	[dias]	#	20	19:08:34	93.66813	[dias]	#	22	11:10:41	89.86463	[dias]	#	21	07:55:45	88.97693	[dias]	#
2033:	20	07:22:31	92.73501	[dias]	#	21	01:00:56	93.66009	[dias]	#	22	16:51:28	89.87106	[dias]	#	21	13:45:47	88.98021	[dias]	#
2034:	20	13:17:17	92.72687	[dias]	#	21	06:43:59	93.66345	[dias]	#	22	22:39:21	89.87114	[dias]	#	21	19:33:47	88.97829	[dias]	#
2035:	20	19:02:31	92.72944	[dias]	#	21	12:32:54	93.67069	[dias]	#	23	04:38:42	89.86941	[dias]	#	22	01:30:39	88.98053	[dias]	#
2036:	20	01:02:36	92.72874	[dias]	#	20	18:31:59	93.66048	[dias]	#	22	10:23:05	89.86775	[dias]	#	21	07:12:38	88.98430	[dias]	#
2037:	20	06:50:01	92.73068	[dias]	#	21	00:22:12	93.66017	[dias]	#	22	16:12:50	89.87129	[dias]	#	21	13:07:30	88.98118	[dias]	#
2038:	20	12:40:23	92.72830	[dias]	#	21	06:09:08	93.66172	[dias]	#	22	22:02:01	89.87504	[dias]	#	21	19:02:04	88.97897	[dias]	#
2039:	20	18:31:47	92.72596	[dias]	#	21	11:57:10	93.66124	[dias]	#	23	03:49:21	89.86874	[dias]	#	22	00:40:20	88.97993	[dias]	#
2040:	20	00:11:26	92.73243	[dias]	#	20	17:46:07	93.66564	[dias]	#	22	09:44:38	89.86662	[dias]	#	21	06:32:34	88.98192	[dias]	#

Datas das passagens da Terra pelo periélio e afélio (Tempo Universal Coordenado, UTC), com as respectivas distâncias em Unidades Astronômicas e a longitude eclíptica do Sol. O erro é inferior a 45 segundos.

periélio				afélio			
	data	dist [AU]	long[graus]		data	dist [AU]	
1990	04/01 17:22:50	0.9833028	284.103390	#	04/07 05:04:19	1.0166521	
1991	03/01 02:59:14	0.9832809	282.221226	#	06/07 15:26:26	1.0167027	
1992	03/01 15:02:55	0.9833240	282.490277	#	03/07 12:07:09	1.0167400	
1993	04/01 03:03:50	0.9832826	283.774826	#	04/07 22:21:01	1.0166663	
1994	02/01 05:54:08	0.9833013	281.608589	#	05/07 19:16:54	1.0167240	
1995	04/01 11:05:21	0.9833023	283.622538	#	04/07 02:16:37	1.0167418	
1996	04/01 07:24:43	0.9832228	283.215705	#	05/07 18:59:53	1.0167173	
1997	01/01 23:16:09	0.9832674	281.601269	#	04/07 19:19:15	1.0167536	
1998	04/01 21:15:03	0.9832998	284.325284	#	03/07 23:50:17	1.0166963	
1999	03/01 13:00:23	0.9832809	282.704005	#	06/07 22:50:47	1.0167180	
2000	03/01 05:17:55	0.9833214	282.132906	#	03/07 23:49:11	1.0167411	
2001	04/01 08:52:18	0.9832860	284.078294	#	04/07 13:37:23	1.0166426	
2002	02/01 14:08:55	0.9832898	282.013644	#	06/07 03:47:08	1.0166882	
2003	04/01 05:01:42	0.9833204	283.419495	#	04/07 05:39:22	1.0167282	
2004	04/01 17:41:48	0.9832648	283.709403	#	05/07 10:52:58	1.0166937	
2005	02/01 00:35:18	0.9832968	281.718147	#	05/07 04:57:35	1.0167416	
2006	04/01 15:30:01	0.9833270	284.144796	#	03/07 23:09:50	1.0166973	
2007	03/01 19:43:04	0.9832602	283.053819	#	06/07 23:52:37	1.0167059	
2008	02/01 23:51:04	0.9832801	281.963061	#	04/07 07:41:17	1.0167535	
2009	04/01 15:29:36	0.9832730	284.418516	#	04/07 01:39:59	1.0166664	
2010	03/01 00:09:39	0.9832897	282.496864	#	06/07 11:30:05	1.0167020	
2011	03/01 18:32:20	0.9833413	283.030716	#	04/07 14:53:51	1.0167404	
2012	05/01 00:31:53	0.9832841	284.058478	#	05/07 03:31:23	1.0166751	
2013	02/01 04:37:21	0.9832905	281.946951	#	05/07 14:44:28	1.0167085	
2014	04/01 11:58:33	0.9833347	284.050127	#	04/07 00:13:04	1.0166816	
2015	04/01 06:36:21	0.9832774	283.572108	#	06/07 19:40:15	1.0166821	
2016	02/01 22:48:27	0.9833039	281.976161	#	04/07 16:24:37	1.0167509	
2017	04/01 14:17:44	0.9833094	284.428590	#	03/07 20:10:57	1.0166756	
2018	03/01 05:34:56	0.9832843	282.791564	#	06/07 16:46:33	1.0166961	
2019	03/01 05:19:50	0.9833012	282.532164	#	04/07 22:10:48	1.0167543	
2020	05/01 07:47:49	0.9832436	284.428475	#	04/07 11:34:40	1.0166943	
2021	02/01 13:50:31	0.9832571	282.396766	#	05/07 22:27:22	1.0167292	
2022	04/01 06:54:19	0.9833365	283.891066	#	04/07 07:10:20	1.0167154	
2023	04/01 16:17:35	0.9832956	284.041274	#	06/07 20:06:11	1.0166806	
2024	03/01 00:38:13	0.9833070	282.111546	#	05/07 05:06:03	1.0167255	
2025	04/01 13:27:50	0.9833274	284.450078	#	03/07 19:54:34	1.0166437	
2026	03/01 17:15:32	0.9833021	283.343193	#	06/07 17:30:15	1.0166440	
2027	03/01 02:32:08	0.9833335	282.469730	#	05/07 05:05:52	1.0167289	
2028	05/01 12:28:02	0.9833074	284.685744	#	03/07 22:17:36	1.0166798	
2029	02/01 18:13:37	0.9832917	282.646003	#	06/07 05:11:40	1.0167127	
2030	03/01 10:13:04	0.9833418	283.076666	#	04/07 12:57:19	1.0167220	
2031	04/01 20:48:06	0.9832664	284.297242	#	06/07 07:09:05	1.0166882	
2032	03/01 05:10:45	0.9832469	282.365399	#	05/07 11:53:30	1.0167509	
2033	04/01 11:51:08	0.9832989	284.439199	#	03/07 20:51:41	1.0166936	
2034	04/01 04:46:53	0.9832893	283.888885	#	06/07 18:48:47	1.0166703	
2035	03/01 00:53:38	0.9833249	282.456792	#	05/07 18:21:39	1.0167406	
2036	05/01 14:16:47	0.9833202	284.819525	#	03/07 21:16:50	1.0166633	
2037	03/01 04:00:38	0.9832889	283.117880	#	06/07 12:05:02	1.0166651	
2038	03/01 05:01:14	0.9833549	282.910532	#	04/07 19:45:49	1.0166909	
2039	05/01 06:41:33	0.9833113	284.773470	#	05/07 13:25:11	1.0166588	
2040	03/01 11:32:07	0.9832937	282.695145	#	05/07 19:01:46	1.0167271	

Data da Lua Cheia (Tempo Universal Coordenado, UTC) e distância Terra–Lua nesta data.
O erro é inferior a 45 segundos.

d/ m/ ano	h: m: s	dist[km]	d/ m/ ano	h: m: s	dist[km]	d/ m/ ano	h: m: s	dist[km]
30/01/2010	6:18:08	; 356607	14/02/2014	23:53:42	; 403469	2/03/2018	0:51:55	; 368039
28/02/2010	16:38:25	; 358433	16/03/2014	17:09:00	; 395641	31/03/2018	12:37:28	; 378491
30/03/2010	2:25:58	; 364689	15/04/2014	7:42:56	; 385100	30/04/2018	0:58:50	; 389462
28/04/2010	12:19:03	; 374087	14/05/2014	19:16:30	; 374224	29/05/2018	14:20:14	; 398835
27/05/2010	23:07:56	; 384884	13/06/2014	4:12:02	; 365040	28/06/2018	4:53:39	; 404792
26/06/2010	11:31:02	; 395113	12/07/2014	11:25:26	; 358975	27/07/2018	20:21:03	; 406099
26/07/2010	1:37:14	; 402798	10/08/2014	18:09:52	; 356896	26/08/2018	11:56:52	; 402419
24/08/2010	17:05:16	; 406294	9/09/2014	1:38:42	; 359181	25/09/2018	2:53:05	; 394465
23/09/2010	9:17:54	; 404703	8/10/2014	10:51:09	; 365664	24/10/2018	16:45:49	; 383846
23/10/2010	1:37:12	; 398190	6/11/2014	22:23:26	; 375445	23/11/2018	5:39:47	; 372719
21/11/2010	17:28:00	; 388057	6/12/2014	12:27:24	; 386777	22/12/2018	17:49:08	; 363367
21/12/2010	8:14:05	; 376526	5/01/2015	4:53:56	; 397241	21/01/2019	5:16:37	; 357714
19/01/2011	21:21:59	; 366157	3/02/2015	23:09:38	; 404342	19/02/2019	15:54:07	; 356843
18/02/2011	8:36:13	; 359101	5/03/2015	18:06:06	; 406323	21/03/2019	1:43:25	; 360769
19/03/2011	18:10:35	; 356577	4/04/2015	12:06:16	; 402833	19/04/2019	11:12:44	; 368586
18/04/2011	2:44:31	; 358796	4/05/2015	3:42:44	; 394984	18/05/2019	21:11:57	; 378795
17/05/2011	11:09:12	; 365166	2/06/2015	16:19:38	; 384742	17/06/2019	8:31:17	; 389565
15/06/2011	20:14:10	; 374512	2/07/2015	2:20:09	; 374184	16/07/2019	21:38:52	; 398909
15/07/2011	6:40:14	; 385226	31/07/2015	10:43:27	; 365116	15/08/2019	12:29:57	; 404935
13/08/2011	18:58:09	; 395404	29/08/2015	18:35:43	; 358991	14/09/2019	4:33:29	; 406247
12/09/2011	9:27:20	; 403045	28/09/2015	2:51:02	; 356879	13/10/2019	21:08:34	; 402365
12/10/2011	2:06:26	; 406381	27/10/2015	12:05:40	; 359329	12/11/2019	13:35:04	; 393971
10/11/2011	20:16:49	; 404372	25/11/2015	22:44:49	; 366155	12/12/2019	5:12:53	; 382862
10/12/2011	14:37:05	; 397257	25/12/2015	11:12:05	; 376268	10/01/2020	19:21:53	; 371541
9/01/2012	7:30:44	; 386721	24/01/2016	1:46:23	; 387702	9/02/2020	7:33:50	; 362476
7/02/2012	21:54:20	; 375309	22/02/2016	18:20:33	; 397951	9/03/2020	17:48:17	; 357399
8/03/2012	9:40:02	; 365502	23/03/2016	12:01:33	; 404625	8/04/2020	2:35:37	; 357030
6/04/2012	19:19:12	; 359080	22/04/2016	5:24:19	; 406249	7/05/2020	10:45:45	; 361183
6/05/2012	3:35:36	; 356955	21/05/2016	21:15:07	; 402698	5/06/2020	19:12:56	; 369007
4/06/2012	11:12:06	; 359259	20/06/2016	11:02:58	; 394999	5/07/2020	4:44:59	; 379151
3/07/2012	18:52:26	; 365490	19/07/2016	22:57:11	; 384827	3/08/2020	15:59:24	; 389879
2/08/2012	3:28:02	; 374646	18/08/2016	9:27:09	; 374105	2/09/2020	5:22:45	; 399204
31/08/2012	13:58:43	; 385281	16/09/2016	19:05:39	; 364752	1/10/2020	21:05:58	; 405150
30/09/2012	3:19:17	; 395532	16/10/2016	4:23:38	; 358473	31/10/2020	14:49:51	; 406166
29/10/2012	19:50:09	; 403228	14/11/2016	13:52:35	; 356520	30/11/2020	9:30:22	; 401725
28/11/2012	14:46:40	; 406349	14/12/2016	0:06:06	; 359448	30/12/2020	3:28:52	; 392771
28/12/2012	10:21:54	; 403873	12/01/2017	11:34:32	; 366881	28/01/2021	19:16:51	; 381519
27/01/2013	4:39:03	; 396392	11/02/2017	0:33:29	; 377421	27/02/2021	8:17:55	; 370593
25/02/2013	20:26:41	; 385862	12/03/2017	14:54:26	; 388860	28/03/2021	18:48:43	; 362173
27/03/2013	9:27:54	; 374760	11/04/2017	6:08:47	; 398717	27/04/2021	3:32:03	; 357616
25/04/2013	19:57:40	; 365316	10/05/2017	21:43:11	; 404918	26/05/2021	11:14:23	; 357461
25/05/2013	4:25:28	; 359110	9/06/2017	13:10:17	; 406272	24/06/2021	18:40:12	; 361562
23/06/2013	11:32:47	; 356991	9/07/2017	4:07:15	; 402623	24/07/2021	2:37:27	; 369213
22/07/2013	18:16:03	; 359172	7/08/2017	18:11:16	; 394793	22/08/2021	12:02:33	; 379234
21/08/2013	1:45:09	; 365343	6/09/2017	7:03:26	; 384376	20/09/2021	23:55:20	; 389990
18/10/2013	23:38:18	; 385705	5/10/2017	18:40:43	; 373411	20/10/2021	14:57:22	; 399421
18/10/2013	23:38:18	; 385705	4/11/2017	5:23:28	; 364000	19/11/2021	8:58:09	; 405300
17/11/2013	15:16:25	; 396284	3/12/2017	15:47:31	; 357982	19/12/2021	4:36:12	; 405934
17/12/2013	9:28:47	; 403902	2/01/2018	2:24:37	; 356602	17/01/2022	23:49:07	; 401022
16/01/2014	4:52:53	; 406527	31/01/2018	13:27:17	; 360199	16/02/2022	16:57:10	; 391886

Continua →

(Continuação) Data da Lua Cheia (Tempo Universal Coordenado, UTC) e distância Terra–Lua nesta data. O erro é inferior a 45 segundos.

d/ m/ ano	h: m: s	dist[km]	d/ m/ ano	h: m: s	dist[km]	d/ m/ ano	h: m: s	dist[km]
18/03/2022	07:18:11	380828	29/06/2026	23:57:18	405253	11/10/2030	10:47:22	394483
16/04/2022	18:55:36	370263	29/07/2026	14:36:19	399616	10/11/2030	03:30:53	402625
16/05/2022	04:14:40	362125	28/08/2026	04:19:05	390395	9/12/2030	22:41:04	406296
14/06/2022	11:52:15	357656	26/09/2026	16:49:33	379433	8/01/2031	18:26:25	404355
13/07/2022	18:38:07	357418	26/10/2026	04:12:17	368870	7/02/2031	12:46:45	397299
12/08/2022	01:36:16	361412	24/11/2026	14:54:01	360763	9/03/2031	04:30:08	387021
10/09/2022	09:59:36	369132	24/12/2026	01:28:41	356737	7/04/2031	17:21:47	375949
9/10/2022	20:55:34	379484	22/01/2027	12:17:51	357644	7/05/2031	03:40:19	366295
8/11/2022	11:02:46	390661	20/02/2027	23:24:07	363307	5/06/2031	11:58:57	359674
8/12/2022	04:08:50	400240	22/03/2027	10:44:16	372529	4/07/2031	19:01:46	357018
6/01/2023	23:08:35	405791	20/04/2027	22:27:39	383431	3/08/2031	01:46:00	358653
5/02/2023	18:29:16	405829	20/05/2027	10:59:34	393903	1/09/2031	09:20:55	364386
7/03/2023	12:41:02	400434	19/06/2027	00:44:57	401953	30/09/2031	18:58:18	373479
6/04/2023	04:35:08	391132	18/07/2027	15:45:32	405979	30/10/2031	07:33:13	384515
5/05/2023	17:34:36	380200	17/08/2027	07:29:17	405079	28/11/2031	23:19:02	395334
4/06/2023	03:42:15	369883	15/09/2027	23:04:05	399351	28/12/2031	17:33:36	403373
3/07/2023	11:39:11	361933	15/10/2027	13:47:32	389936	27/01/2032	12:53:04	406522
1/08/2023	18:32:09	357527	14/11/2027	03:26:26	378763	26/02/2032	07:43:47	404003
31/08/2023	01:36:07	357341	13/12/2027	16:09:17	368140	27/03/2032	00:46:50	396627
29/09/2023	09:58:03	361554	12/01/2028	04:03:33	360266	25/04/2032	15:10:11	386348
28/10/2023	20:24:34	369703	10/02/2028	15:04:12	356720	25/05/2032	02:37:42	375472
27/11/2023	09:16:52	380486	11/03/2028	01:06:30	358071	23/06/2032	11:32:58	366029
27/12/2023	00:33:49	391770	9/04/2028	10:27:03	363867	22/07/2032	18:51:57	359511
25/01/2024	17:54:40	400995	8/05/2028	19:49:24	372914	21/08/2032	01:47:13	356886
24/02/2024	12:31:07	405917	7/06/2028	06:09:20	383576	19/09/2032	09:30:39	358651
25/03/2024	07:00:59	405393	6/07/2028	18:11:22	393956	18/10/2032	18:58:34	364742
23/04/2024	23:49:36	399779	5/08/2028	08:10:24	402068	17/11/2032	06:42:32	374325
23/05/2024	13:53:43	390644	3/09/2028	23:48:10	406158	16/12/2032	20:49:31	385667
22/06/2024	01:08:25	380040	3/10/2028	16:25:33	405156	15/01/2033	13:07:39	396343
21/07/2024	10:17:40	369927	2/11/2028	09:17:55	399074	14/02/2033	07:04:45	403840
19/08/2024	18:26:18	361968	2/12/2028	01:40:47	389145	16/03/2033	01:37:59	406358
18/09/2024	02:34:57	357484	31/12/2028	16:49:02	377601	14/04/2033	19:17:57	403445
17/10/2024	11:26:52	357367	30/01/2029	06:04:05	367046	14/05/2033	10:43:16	396064
15/11/2024	21:29:00	361874	28/02/2029	17:10:40	359658	12/06/2033	23:19:42	386055
15/12/2024	09:02:12	370403	30/03/2029	02:26:48	356681	12/07/2033	09:29:01	375446
13/01/2025	22:27:29	381417	28/04/2029	10:37:13	358382	10/08/2033	18:08:06	366071
12/02/2025	13:54:01	392628	27/05/2029	18:37:57	364265	9/09/2033	02:20:57	359470
14/03/2025	06:55:17	401500	26/06/2029	03:22:49	373273	8/10/2033	10:58:33	356828
13/04/2025	00:22:53	406006	25/07/2029	13:36:15	383899	6/11/2033	20:32:31	358802
12/05/2025	16:56:33	405278	24/08/2029	01:51:44	394277	6/12/2033	07:22:31	365275
11/06/2025	07:44:26	399739	22/09/2029	16:29:51	402365	4/01/2034	19:47:34	375191
10/07/2025	20:37:22	390730	22/10/2029	09:28:09	406276	3/02/2034	10:05:02	386606
9/08/2025	07:55:37	380054	21/11/2029	04:03:34	404819	5/03/2034	02:10:41	397043
7/09/2025	18:09:24	369669	20/12/2029	22:47:06	398118	3/04/2034	19:19:27	404129
7/10/2025	03:48:04	361455	19/01/2030	15:54:54	387808	3/05/2034	12:16:17	406328
5/11/2025	13:19:45	356978	18/02/2030	06:20:17	376424	2/06/2034	03:54:33	403372
4/12/2025	23:14:32	357218	19/03/2030	17:56:55	366444	1/07/2034	17:45:03	396119
3/01/2026	10:03:24	362313	18/04/2030	03:20:26	359658	31/07/2034	05:54:57	386134
1/02/2026	22:09:46	371388	17/05/2030	11:19:33	357029	29/08/2034	16:49:43	375310
3/03/2026	11:38:27	382614	15/06/2030	18:41:26	358782	28/09/2034	02:57:15	365623
2/04/2026	02:12:32	393596	15/07/2030	02:12:25	364537	27/10/2034	12:42:56	358882
1/05/2026	17:23:45	402001	13/08/2030	10:44:50	373400	25/11/2034	22:32:35	356445
31/05/2026	08:45:49	406135	11/09/2030	21:18:24	383999	25/12/2034	08:54:53	358938

Datas (UTC) das oposições de Marte, Júpiter e Saturno entre 1990 e 2060. Próximo destas datas, os planetas em oposição transitam pelo meridiano local aproximadamente à meia-noite. Esta é a época mais propícia para observação destes planetas.

Marte	Júpiter		Saturno	
27-11-1990	29-01-1991	15-06-2031	14-07-1990	30-10-2028
07-01-1993	28-02-1992	19-07-2032	27-07-1991	13-11-2029
12-02-1995	30-03-1993	25-08-2033	07-08-1992	27-11-2030
17-03-1997	30-04-1994	01-10-2034	19-08-1993	11-12-2031
24-04-1999	01-06-1995	08-11-2035	01-09-1994	24-12-2032
13-06-2001	04-07-1996	12-12-2036	14-09-1995	08-01-2034
28-08-2003	09-08-1997	14-01-2038	26-09-1996	22-01-2035
07-11-2005	16-09-1998	15-02-2039	10-10-1997	05-02-2036
24-12-2007	23-10-1999	16-03-2040	23-10-1998	17-02-2037
29-01-2010	28-11-2000	16-04-2041	06-11-1999	03-03-2038
03-03-2012	01-01-2002	17-05-2042	19-11-2000	16-03-2039
08-04-2014	02-02-2003	20-06-2043	03-12-2001	28-03-2040
22-05-2016	04-03-2004	24-07-2044	17-12-2002	10-04-2041
27-07-2018	03-04-2005	30-08-2045	31-12-2003	23-04-2042
13-10-2020	04-05-2006	07-10-2046	13-01-2005	05-05-2043
08-12-2022	06-06-2007	13-11-2047	27-01-2006	17-05-2044
16-01-2025	09-07-2008	17-12-2048	10-02-2007	29-05-2045
19-02-2027	14-08-2009	19-01-2050	24-02-2008	10-06-2046
25-03-2029	21-09-2010	19-02-2051	08-03-2009	22-06-2047
04-05-2031	29-10-2011	21-03-2052	21-03-2010	03-07-2048
27-06-2033	03-12-2012	20-04-2053	03-04-2011	16-07-2049
15-09-2035	05-01-2014	22-05-2054	15-04-2012	28-07-2050
19-11-2037	06-02-2015	24-06-2055	28-04-2013	09-08-2051
02-01-2040	08-03-2016	29-07-2056	10-05-2014	21-08-2052
06-02-2042	07-04-2017	04-09-2057	23-05-2015	03-09-2053
11-03-2044	09-05-2018	12-10-2058	03-06-2016	16-09-2054
17-04-2046	10-06-2019	18-11-2059	15-06-2017	29-09-2055
03-06-2048	14-07-2020	22-12-2060	27-06-2018	11-10-2056
14-08-2050	19-08-2021	23-01-2062	09-07-2019	25-10-2057
28-10-2052	26-09-2022	23-02-2063	20-07-2020	08-11-2058
17-12-2054	03-11-2023	25-03-2064	02-08-2021	22-11-2059
24-01-2057	07-12-2024	25-04-2065	14-08-2022	05-12-2060
27-02-2059	10-01-2026	26-05-2066	27-08-2023	19-12-2061
02-04-2061	11-02-2027	29-06-2067	08-09-2024	02-01-2063
14-05-2063	12-03-2028	03-08-2068	21-09-2025	16-01-2064
13-07-2065	12-04-2029	09-09-2069	04-10-2026	29-01-2065
02-10-2067	13-05-2030	17-10-2070	18-10-2027	12-02-2066

Eclipses do Sol visíveis de São Paulo (23°33'34" S, 46°44'07" W) onde a fração coberta do Sol é de pelo menos 50%. Nos séculos XX, XXI e XXII nenhum eclipse do Sol é total na cidade de São Paulo. A primeira e as duas últimas linhas da tabela abaixo dão os últimos e próximos eclipses totais visíveis em São Paulo (com o tempo de duração da totalidade entre parênteses).

Em destaque os eclipses onde mais de 90% superfície do Sol é coberta. A altura e azimute do Sol são dados em graus. Os horários correspondem à hora legal de Brasília (UTC – 3h; se o horário de verão estiver em vigor, uma hora deve ser acrescentada ao valor da tabela).

Data	Início Parcial	Altura do Sol	Eclipse Máximo	Altura do Sol	Azimute do Sol	Fim do Eclipse	Altura do Sol	Magnitude do Eclipse	Fração do Sol Eclipsada
1590-Fev-04	12:28:04	82	13:56:16	67	284	15:15:53	49	1.049	1.000 (T:2m04s)
1907-Jul-10	10:36:15	39	12:41:19	44	351	14:38:08	32	0.836	0.775
1908-Dez-23	06:10:39	10	07:08:55	23	107	08:14:26	37	0.709	0.634
1912-Out-10	08:56:54	44	10:16:12	61	058	11:41:48	73	0.957	0.952 ***
1918-Dez-03	10:48:49	74	12:44:57	79	275	14:32:02	54	0.599	0.493
1927-Jan-03	18:04:27	10	18:55(s)	0(s)	245	18:55(s)	0(s)	0.849(s)	0.805(s)
1947-Mai-20	08:17:55	20	09:28:31	32	044	10:48:02	43	0.921	0.911 ***
1947-Nov-12	18:16:27	01	18:24(s)	0(s)	251	18:24(s)	0(s)	0.061(s)	0.018(s)
1952-Ago-20	11:11:15	51	12:54:35	53	342	14:30:22	40	0.668	0.573
1966-Nov-12	09:43:06	60	11:03:19	77	064	12:30:40	79	0.696	0.624
1973-Jan-04	11:26:55	80	13:21:50	74	270	14:59:55	52	0.650	0.550
1980-Ago-10	16:56:44	10	17:46(s)	0(s)	287	17:46(s)	0(s)	0.706(s)	0.621(s)
1992-Jun-30	06:52:25	00	07:56:19	13	058	09:09:08	26	0.834	0.802
1994-Nov-03	08:41:18	45	09:57:28	62	078	11:22:27	79	0.851	0.824
2001-Jun-21	06:50(r)	0(r)	07:31:53	08	060	08:36:58	20	0.705	0.637
2027-Fev-06	11:30:55	76	13:21:17	74	297	14:59:07	52	0.844	0.777
2034-Set-12	12:51:38	60	14:30:02	45	303	15:55:41	27	0.747	0.675
2044-Fev-28	17:37:16	13	18:33:52	00	261	18:34(s)	0(s)	0.605	0.504
2057-Jan-05	05:28(r)	0(r)	05:28(r)	0(r)	115	06:05:35	07	0.600(r)	0.507(r)
2059-Mai-11	16:35:26	12	17:32(s)	0(s)	290	17:32(s)	0(s)	0.621(s)	0.531(s)
2061-Out-13	05:38(r)	0(r)	06:15:49	08	095	07:19:03	23	0.622	0.521
2071-Mar-31	09:47:12	45	11:23:01	60	024	13:05:02	59	0.973	0.961 ***
2075-Jan-16	15:52:53	40	17:00:08	25	257	17:59:55	12	0.888	0.863
2081-Mar-10	10:15:00	54	11:58:48	70	013	13:41:51	61	0.774	0.696
2103-Jan-08	15:09:00	50	16:18:03	34	258	17:19:32	20	0.948	0.943 ***
2110-Ago-15	13:43:37	46	15:17:23	31	305	16:36:46	15	0.823	0.766
2111-Fev-08	06:24:25	07	07:23:20	20	098	08:29:47	35	0.743	0.681
2113-Jun-13	13:59:12	36	15:26:02	23	311	16:40:45	09	0.994	0.996 ***
2115-Nov-16	05:16(r)	0(r)	05:30:40	03	109	06:28:32	16	0.671	0.578
2118-Set-15	13:17:30	58	14:34:49	44	300	15:45:54	30	0.672	0.596
2125-Mai-03	07:57:39	18	09:12:02	32	051	10:38:29	45	0.627	0.534
2132-Dez-07	12:19:33	85	14:17:44	58	265	15:56:15	36	0.625	0.519
2158-Jul-25	12:16:05	47	13:45:30	41	331	15:05:17	30	0.826	0.786
2164-Set-16	08:34:23	33	10:11:41	53	050	12:01:16	64	0.892	0.847
2165-Mar-12	08:14:51	28	09:28:37	45	070	10:51:10	61	0.917	0.906**
2167-Jul-16	10:52:37	41	12:17:56	45	358	13:42:03	40	0.588	0.497
2172-Out-17	12:19:07	75	13:47:25	59	292	15:10:29	41	0.777	0.722
2180-Mai-24	09:06:47	28	10:49:05	42	024	12:45:42	44	0.709	0.622
2187-Jan-09	12:07:50	88	14:10:34	63	267	15:51:42	40	0.875	0.808
2906-Nov-07	14:20:44	54	15:39:24	36	266	16:47:59	20	1.039	1.000 (T:2m48s)
2914-Dez-08	05:13(r)	0(r)	05:55:56	09	111	06:51:40	21	1.030	1.000 (T:1m34s)

Na tabela acima, “(r)” significa que o eclipse já está em curso quando o sol nasce. “(s)” significa que o eclipse ainda está em curso quando o Sol de põe. Nestes casos, a hora indicada corresponde ao nascer ou pôr do Sol e não ao final do eclipse. Quando a umbra passa por São Paulo, é dado a duração da fase de totalidade do eclipse (apenas 3 casos nesta tabela).

Os cálculos foram feitos por Fred Espernak e Chris O’Byrne (GSFC/NASA), disponíveis no site eclipse.gsfc.nasa.gov/JSEX/JSEX-SA.html.