Umidade Relativa do Ar

Legenda

- Limite de Estado
- Limite do País
- ★ Capital de Estado
- ★ Capital de País

Região

- Norte
- Nordeste
- Sudeste
- Sul
- Centro-Oeste

Umidade Relativa do Ar

<http://www.leb.esalq.usp.br/posto/>

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"
LEB 0200 - Física do Ambiente Agrícola
Prof. Jarbas H. de Miranda e-mail: jhmirand@usp.br

Umidade Relativa do Ar

Umidade Relativa do Ar

Umidade Relativa do Ar

Presença de vapor d'água na atmosfera

Lei de Dalton

“A pressão exercida por uma mistura de gases ideais em um dado volume V e a uma temperatura absoluta T é igual à soma das pressões P_i , a qual seria exercida respectivamente por cada gás individualmente, se ele sozinho ocupa um mesmo volume V na mesma temperatura T .

$$\sum_{i=1}^n P_i \cdot v_i = \sum_{i=1}^n n_i \cdot R \cdot T_i$$

Densidade do ar: $1,1609 \text{ kg m}^{-3}$

Massa molar do ar: $28,56 \text{ g/mol}$

$$n = \frac{m}{\mu}$$

Umidade Relativa do Ar

Presença de vapor d'água na atmosfera

Lei de Dalton

$$P = P_{ar} + e_a$$

Parte
seca
(P_{ar})

Parte
úmida
(e_a)

→ Pressão
atual
de
vapor
d'água

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"
LEB 0200 - Física do Ambiente Agrícola
Prof. Jarbas H. de Miranda e-mail: jhmirand@usp.br

Umidade Relativa do Ar

1) Definir a Lei de Dalton

2) Definir P , e_a , p e m_a

$$P = P_{ar} + e_a$$

$$P_{ar} = P - e_a$$

3) Definir a relação entre (massa molar água e massa molar do ar seco)

4) Definir relações de umidade relativa do ar

4.1) Umidade Específica (q):

4.2) Razão de Mistura (W):

4.3) Umidade Absoluta ou Atual (UA)

4.4) Umidade de Saturação (US)

4.5) Conceito de Saturação (Lei de Tetens, UR%)

$$q = \frac{\mu_a}{m} = \frac{0,622 \cdot e_a}{(P - 0,378 \cdot e_a)} \quad (\text{kg}_{\text{vapor}} / \text{kg}_{\text{ar úmido}})$$

$$W = \frac{m_a}{m_{ar}} = 0,622 \cdot \frac{e_a}{P_{ar}} \quad (\text{kg}_{\text{vapor}} / \text{kg}_{\text{ar seco}})$$

$$UA = \frac{m_a}{V} = K \cdot \frac{e_a}{T} \quad (\text{g/cm}^3 \text{ ou } \text{g/m}^3)$$

$$K = 2165 \text{ (} P = \text{kPa)}, 2,165 \text{ (} P = \text{Pa)} \text{ ou } 288 \text{ (} P = \text{mmHg)}$$

$$US = \frac{m_a}{V} = K \cdot \frac{e_s}{T} \quad (\text{g/cm}^3 \text{ ou } \text{g/m}^3)$$

$$K = 2165 \text{ (} P = \text{kPa)}, 2,165 \text{ (} P = \text{Pa)} \text{ ou } 288 \text{ (} P = \text{mmHg)}$$

Umidade Relativa do Ar

$\rho = \frac{m_a}{V}$ → 18g/mol → unidade específica

$E = \frac{m_a}{M_{ar}} = \frac{18}{28,9} = 0,622$

$m = m_a \rightarrow m_{ar}$

razão de mistura

$W = \frac{m_a}{m_{ar}}$

Portanto: $W = \frac{e_a \cdot V \cdot M_a \cdot \cancel{R \cdot T}}{\cancel{R \cdot T} \cdot p_{ar} \cdot V \cdot M_{ar}}$

$W = 0,622 \cdot \frac{e_a}{p_{ar}}$

$P \cdot V = \frac{m}{M} \cdot R \cdot T$

$m = \frac{P \cdot V \cdot M}{R \cdot T}$

$m_a = \frac{e_a \cdot V \cdot M_a}{R \cdot T}$

$m_{ar} = \frac{p_{ar} \cdot V \cdot M_{ar}}{R \cdot T}$

Umidade Relativa do Ar (UR)

$UR = \frac{\text{"atual"}}{\text{"máxima"}} = \frac{U_A}{U_S}$

Umidade Relativa do Ar

UA = Umidade atual ou absoluta

$$UA = \frac{m_{H_2O}}{V}$$

$$m_{H_2O} = \frac{e_a \cdot V \cdot M_a}{R \cdot T}$$

$$UA = \frac{e_a \cdot M_a}{R \cdot T}$$

18 g/mol
 $8,3145 \text{ J} = \text{Pa} \cdot \text{m}^3 \text{ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

$$UA = 2,165 \cdot \frac{e_a}{T}$$

$$UA = 2165 \cdot \frac{e_a}{T}$$

$e_a \rightarrow \text{kPa}$
 $T \rightarrow \text{K}$

$$UA = 288 \cdot \frac{e_a}{T}$$

$e_a \rightarrow \text{mmHg}$
 $T \rightarrow \text{K}$

- Pa ✓
- kPa ✓
- mmHg ✓
- T = K

$$UA = K \cdot \frac{e_a}{T}$$

$$U_s = K \cdot \frac{e_s}{T}$$

$e_s =$ pressão de saturação do vapor d'água

Portanto:

$$UR (\%) = \frac{UA}{U_s} \cdot 100 = \frac{K \cdot e_a / T}{K \cdot e_s / T} \Rightarrow UR (\%) = \frac{e_a}{e_s} \cdot 100$$

Umidade Relativa do Ar

"Eq. de Tetens"

ea
 T_1
 es_1
 $UA = K \cdot \frac{ea}{T}$
 $UR = \frac{UA}{US} \cdot 100$ (%)
 $UR = \frac{ea}{es} \cdot 100$ (%)
 $US = K \cdot \frac{es}{T}$

Umidade Relativa do Ar

Conceito de Saturação (Tetens)

$$e_s = A \cdot 10^{\frac{7,5 \cdot T_s}{237,3 + T_s}}$$

$$e_a = e_{su} - \gamma \cdot P \cdot (T_s - T_u)$$

Equação do Psicrômetro

$$e_{su} = A \cdot 10^{\frac{7,5 \cdot T_u}{237,3 + T_u}}$$

$$UR(\%) = \frac{U_A}{U_S} \cdot 100$$

$$UR(\%) = \frac{e_a}{e_s} \cdot 100$$

T_s = Temp. do ar seco ou temp. do termômetro de bulbo seco
 T_u = temp. do termômetro de bulbo úmido
 T_o = temp. do ponto de orvalho

$$\gamma = 6,7 \cdot 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

(para psicrômetros com aspiração forçada)

$$\gamma = 8 \cdot 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

(para psicrômetros sem aspiração forçada)

Ts = temperatura do termômetro de bulbo seco (°C)

Tu = temperatura do termômetro de bulbo úmido (°C)

Umidade Relativa do Ar

$$UR = \frac{UA}{US} \cdot 100$$

$$UR = \frac{e_a}{e_s} \cdot 100$$

$$UA = K \cdot \frac{e_a}{T - d(K)}$$

$$US = K \cdot \frac{e_s}{T - d(K)}$$

$$288 = e_a = \text{mmHg}$$

$$2,165 = e_a = \text{Pa}$$

$$2165 = e_a = \text{kPa}$$

$$288 = e_s = \text{mmHg}$$

$$2,165 = e_s = \text{Pa}$$

$$2165 = e_s = \text{kPa}$$

$$e_s = A \cdot 10$$

$$7,5 = T_s \quad \leftarrow \text{°C}$$

$$\frac{7,5 \cdot T_s}{237,3 + T_s}$$

$$4,50 = e_s \Rightarrow \text{mmHg}$$

$$0,6108 = e_s \Rightarrow \text{kPa}$$

$$610,8 = e_s = \text{Pa}$$

$$e_s = A \cdot 10$$

$$7,5 = T_u \quad \leftarrow \text{°C}$$

$$\frac{7,5 \cdot T_u}{237,3 + T_u}$$

$$\delta = 8 \cdot 10^{-4} \text{°C}^{-1}$$

$$5,2568$$

$$e_a = e_{su} - \delta \cdot P \cdot (T_s - T_u)$$

$$L = 8 \cdot 10^{-4} \text{ g}^{-1}$$

$$P = K \cdot \left(L - \frac{0,0065 \cdot h}{288} \right)$$

$$760 = P \Rightarrow \text{mmHg}$$

$$101325 = P \Rightarrow \text{Pa}$$

$$101,325 P \Rightarrow \text{kPa}$$

Umidade Relativa do Ar

$$e_s = A \cdot 10^{\frac{7,5 \cdot T_s}{237,3 + T_s}}$$

A = 0,6108 (kPa), 610,8 (Pa) ou A = 4,58 (mmHg)

$$e_a = e_{su} - \gamma \cdot P \cdot (T_s - T_u)$$

$\gamma = 6,7 \cdot 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
(para psicrômetros com aspiração forçada)

$$e_{su} = A \cdot 10^{\frac{7,5 \cdot T_u}{237,3 + T_u}}$$

$\gamma = 8 \cdot 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
(para psicrômetros sem aspiração forçada)

$$P = K \cdot \left(1 - \frac{0,0065 \cdot h}{288}\right)^{5,2568}$$

K = 101,325 (P em kPa), 101325 (P em Pa) ou 760 (P em mmHg)

$$T_o = \frac{237,3 \cdot \text{Log}\left(\frac{e_a}{A}\right)}{7,5 - \text{Log}\left(\frac{e_a}{A}\right)}$$

A = 0,6108 (kPa), 610,8 (Pa) ou A = 4,58 (mmHg)

$$\text{UR}(\%) = \frac{e_a}{e_s} \cdot 100$$

$$\text{UR}(\%) = \frac{U_A}{U_S} \cdot 100$$

$$\begin{aligned}
 & T_s = 18^\circ\text{C} \\
 & T_u = 16,1^\circ\text{C} \\
 & \left. \begin{array}{l} T_s = 18^\circ\text{C} \\ T_u = 16,1^\circ\text{C} \end{array} \right\} UR = 81,29\% \\
 & UR = \frac{e_a}{e_s} \times 100 \\
 & e_a = 12,58 \text{ mmHg}
 \end{aligned}$$

FIGURA 18 Gráfico Psicrométrico – Pressão Barométrica = 760 mmHg (1013 mb).

Umidade Relativa do Ar

1) Em determinado momento observa-se, num psicrômetro sem aspiração forçada, uma temperatura do bulbo seco de 28 °C e uma temperatura do bulbo úmido de 22 °C. A altitude do local é de 900 metros. Calcular a pressão atual de vapor (e_a), a umidade relativa do ar e o déficit de vapor (Δe) ($e_s - e_a$).
(Respostas: 2207,17 Pa; 58,40%; 1572,51 Pa)

$$e_s = A \cdot 10^{\frac{7,5 \cdot T_s}{237,3 + T_s}}$$

$$A = 0,6108 \text{ (kPa)}, 610,8 \text{ (Pa)} \text{ ou } A = 4,58 \text{ (mmHg)}$$

$$e_a = e_{su} - \gamma \cdot P \cdot (T_s - T_u)$$

$$\gamma = 8 \cdot 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

(para psicrômetros sem aspiração forçada)

$$e_{su} = A \cdot 10^{\frac{7,5 \cdot T_s}{237,3 + T_s}}$$

$$\Delta e = e_s - e_a$$

$$P = K \cdot \left(1 - \frac{0,0065 \cdot h}{288} \right)^{5,2568}$$

$$K = 101,325 \text{ (P em kPa)}, 101325 \text{ (P em Pa)} \text{ ou } 760 \text{ (P em mmHg)}$$

$$\text{UR}(\%) = \frac{e_a}{e_s} \cdot 100$$