Métodos Computacionais em Física: Mecânica Estatística

Aula: Equações diferenciais estocásticas.

Aula: Eq. Dif. Estocásticas - Objetivos

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

- 1) Associar a evolução temporal do processo de random walk pode ser escrito na forma de uma “equação diferencial” envolvendo variáveis aleatórias (estocásticas).
- 2) Identificar a forma geral de uma equação diferencial estocástica (EDE).
- 3) Implementar a solução numérica de uma EDE pelo método de Euler-Maruyama.

Tarefa: Solucionar uma EDE para um modelo estocástico aplicado para a variação de preços de ações em bolsa e comparar o comportamento das soluções com dados empíricos do índice Ibovespa.

Tempo aproximado: 40 a 50 min (**lembrando que o *debug* é a maior parte disso!**).

Random Walk como uma EDE.

Processo de Wiener $W(t)$:

- Para cada t , $W(t)$ é uma variável aleatória obedecendo a uma distribuição normal com variância $\sigma_w^2 = t$.
- Para todo $t_1 < t_2$, $W(t_2) - W(t_1)$ é independente de $W(t_1)$.
- Como vimos, um random walk difusivo $X(t)$ com coef. de difusão D

$$\boxed{dX(t) = \left(\sqrt{2D}\right) dW(t)} \quad \text{com c.i.} \quad \boxed{X(0) = 0}$$

onde definimos D como $D = \lim_{\Delta X, \Delta t \rightarrow 0} \frac{(\Delta X)^2}{2\Delta t}$

Logo, $W(t)$ tem dimensão de $\sqrt{t}$.

Random Walk como uma EDE.

- No fundo, a relação entre $X(t)$ e $W(t)$ é uma mudança de escala.
- Note que a EDE não é uma equação determinística: cada realização leva a um conjunto $\{X(t)\}$ distinto.
- Nas últimas aulas, o que fizemos foi essencialmente resolver numericamente esta EDE discretizando o tempo e a posição.

Forma geral de uma EDE

- Uma EDE mais geral pode ser escrita na forma:

$$dX(t) = a(t, X)dt + b(t, X)dW(t)$$

- O segundo termo é chamado de *difusivo* (envolve um processo estocástico de Wiener) enquanto que o primeiro termo é chamado de termo de *deriva*.
- Se $a=0$ e $b = \sqrt{2D} = \text{const.}$, retomamos o random walk.
- Voltemos à questão da penúltima aula:

E esse? É um random walk?

Outros exemplos de EDEs

- Um modelo bastante usado em finanças para o comportamento do preço de uma ação $P(t)$ é uma EDE na forma:

$$dP(t) = \mu P(t)dt + \sigma P(t)dW(t)$$

onde os termos de deriva e de difusão são *proporcionais a $P(t)$* .

- EDEs deste tipo caracterizam processos denominados “movimentos Brownianos geométricos”.
- Uma outra forma de escrever este modelo é:

$$\frac{dP(t)}{P(t)} = \mu dt + \sigma dW(t)$$

que indica que o *retorno* (variação sobre o preço) tem uma componente linear e outra tipo “random walk”.

Resolvendo uma EDE numericamente

- EDE contínua:

$$dX(t) = a(t, X)dt + b(t, X)dW(t) \quad X(t=0) = X_0$$

- **Método de Euler-Maruyama** – Discretizando no tempo $t \rightarrow t_n = (n-1)\Delta t$ e $X(t) \rightarrow X_n$, obtemos:

$$\begin{cases} X_{n+1} = X_n + \Delta X_n \\ \Delta X_n = a(n, X_n)\Delta t + b(n, X_n)\Delta W_n \end{cases}$$

- A variação do termo estocástico (processo de Wiener) será dada por:

$$\Delta W_n = W_{n+1} - W_n = r_n \sqrt{\Delta t}$$

onde r_n é um número aleatório com distribuição normal e $\langle r_n \rangle = 0$ e $\langle r_n^2 \rangle = 1$. Note que a variância de W_n será *linear* com t .

Resolvendo uma EDE numericamente

- Tomemos como exemplo a EDE contínua:

$$dP(t) = \mu P(t)dt + \sigma P(t)dW(t) \quad P(t=0) = P_0$$

- **Método de Euler-Maruyama** – Discretizando o tempo, obtemos:

$$P_{n+1} = P_n + \Delta P_n$$

$$\Delta P_n = \mu P_n \Delta t + \sigma P_n \Delta W_n \quad \Delta W_n = r_n \sqrt{\Delta t}$$

a qual podemos resolver iterativamente dados: Δt , P_0 , μ e σ .

- Por simplicidade, podemos calcular ΔW_n como se fosse um “random walk” com passo de tempo Δt :
 - A cada passo, sorteia-se um número $p = \text{rand}$;
 - Se $p \geq 1/2$: $\Delta W_n = +\sqrt{\Delta t}$ e se $p < 1/2$, $\Delta W_n = -\sqrt{\Delta t}$.

Tarefa: “Simulação” do Ibovespa.

Calcular evoluções temporais de $P(t)$ do índice Ibovespa pelo método de Euler-Maruyama para os seguintes parâmetros:

- Use $P_0=10140.05$ (valor nominal do Ibovespa em 01/11/2002).
- Unidade de tempo: use o tempo em dias e $\Delta t=1/360$ dia (=4 min).
- Parâmetros: use $\mu=0.002$ /dia e $\sigma=0.015/\text{dia}^{1/2}$ (faça testes!)
- Faça pelo menos três realizações para $t_{\text{final}}=365$ dias e compare com os dados de fechamento diários do Ibovespa no arquivo **IbovData.mat**
- No passo $n \rightarrow n+1$: Calcule ΔW_n como se fosse um “random walk” com passo de tempo Δt (vide slide anterior).
- Responda (comentário no script):
 - 1) O que ocorre se variarmos os parâmetros μ e σ ?
 - 2) Rode a simulação por mais tempo (2-3 anos). Há poder “preditivo”?

EDEs – Tarefa - Dicas

- *Para ler os dados do arquivo e armazenar em um vetor:*

```
load IbovData.mat  
IbovNum=zeros(size(IbovData,1),size(IbovData,2));  
IbovNum=str2double(IbovData);
```

- *Cada valor corresponde a **um dia** (cuidado ao plotar...).*
- *Exemplo de seis simulações com os mesmos parâmetros:*