PERGAMON

Organic Geochemistry 31 (2000) 697–710

**Organic
Geochemistry**

www.elsevier.nl/locate/orggeochem

Role of the soil matrix and minerals in protecting natural organic materials against biological attack

J.A. Baldock *, J.O. Skjemstad

CSIRO Land and Water, PMB 2, Glen Osmond, SA 5064, Australia

“O papel da matriz e dos minerais do solo na proteção dos materiais orgânicos naturais contra o ação biológica”

PPG em Solos e Nutrição de Plantas – ESALQ/USP
LSN 5897 – Matéria Orgânica Do Solo (2020)

Elves Barreto
Fabiana Ascencio
Julia Rossi

O que é a matéria orgânica do solo?

O Solo é a camada mais superficial e mais fina da crosta terrestre

Materiais inorgânicos

Solo = **+**

Materiais orgânicos

São minerais formados a partir da separação/quebradas das rochas

Formados a partir da decomposição da matéria orgânica ou seja já foram organismos vivos

O que é a matéria orgânica do solo?

Em resumo a fração orgânica do solo abrange todo o material orgânico derivado biologicamente localizado dentro ou sobre a superfície do solo incluindo material orgânico termicamente alterado

Consiste em uma mistura heterogênea de matéria orgânica originária de:

Baldock e Nelson (1999)

Restos Vegetais

Restos de animais

Microorganismos

Material pouco decomposto – possui características do material de origem

Material altamente decomposto – não é possível definir características do material de origem

MO do solo é frequentemente dividida com base em suas propriedades físicas

Tamanho

Densidade

Localização dentro da Matriz do solo

O que é a matéria orgânica do solo?

FRAÇÃO ORGÂNICA DO SOLO

É uma mistura heterogênea de matéria orgânica originada de plantas, microrganismos e resíduos animais

MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO - MOS

Materiais orgânicos de origem biológica encontrados junto a matriz do solo ou depositados diretamente sobre a superfície do solo

COMPONENTES VIVOS

COMPONENTES MORTOS

MATÉRIA ORGÂNICA
DISSOLVIDA
(MOD)

PROCESSOS DE ADIÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E PERDA DE C

- Deposição
- Alteração
- Mineralização
- Assimilação
- Decomposição
- Estabilidade biológica

Fonte: R. Weil & N. Brady, 2017

Como se define a quantidade de MOS?

MO total = Entrada MO – Perdas MO

Entradas (E) = Decomposição dos resíduos vegetais e resíduos microbianos

Perdas = Mineralização do C orgânico

Perdas de MO da fração orgânica total são controladas por sua capacidade de resistir ao ataque biológico pela comunidade de decompositores de solo.

↑ Resistência ao ataque enzimático = ↑ Estabilidade biológica

A estabilidade biológica é controlada:

Estrutura química (influência direta nas taxas de decomposição da MO e interação dos materiais minerais e orgânicos;

Minerais do solo;

Mecanismos da matriz

OBJETIVOS

1. Descrever as características químicas e físicas das diferentes formas da matéria orgânica no solo e como essas características alteram a sua decomposição;
2. Revisar os mecanismos envolvidos na estabilização biológica da matéria orgânica no solo pela matriz mineral e pelos minerais do solo;
3. Examinar o conceito de capacidade máxima de proteção do solo;
4. Discutir como os mecanismos de estabilização biológicos controlam a estrutura química da matéria orgânica no solo.

Características químicas das frações orgânicas e mudanças associadas a degradação oxidativa

Método analítico: ^{13}C NMR (espectroscopia de ressonância magnética nuclear)

Decomposição oxidativa em solos minerais

Mecanismos biológicos de proteção pela matriz do solo e partículas minerais

“The mechanisms of biological protection of OM in soil containing mineral particles operate at size scales ranging from micrometres to centimetres and are dependent on the chemical properties of the mineral constituents and the three dimensional arrangement of mineral particles.”

- 1. Estrutura química dos minerais e cátions em solução*
- 2. Estrutura física e área superficial específica dos minerais*
- 3. Arquitetura da matriz*

1. Estrutura química dos minerais e cations em solução

- Encapsulamento por carbonato (CaCO_3);
- Ligações Ca-sustâncias orgânicas;
- Efeitos do Ca^{2+} na floculação de argila;
- Efeito do Na^{2+} na dispersão de argila;
- Efeito dos óxidos de Fe e Al.

Efeito do carbonato

Fonte: C. Dorrnsoro Fdez, 2020

Efeito dos íons bivalentes

Fig. 2. Influence of adding calcium and sodium salts on the amounts of water soluble and mineralisable soil organic carbon during a 45 day incubation (Sokoloff, 1938).

Fonte: R. Weil & N. Brady, 2017

Efeito dos compostos e íons de Fe e Al

- Alofanos: estruturas minerais amorfas presentes principalmente em solos desenvolvidos sobre cinzas vulcânicas;
- A interação entre alofanos e MOS forma compostos relativamente estáveis, principalmente com frações maiores da MOS e tecidos microbianos;
- Fe-amorfo e íons Fe^{3+} tem mesmo efeito, mas não tão significativo.

Fig. 4. Influence of allophane content on the amount of ^{14}C -labelled glucose, cellulose and microbial polysaccharide carbon that was mineralised in a laboratory incubation (Zunino et al., 1982).

2. Estrutura física e Área Superficial Específica dos minerais

Fig. 7. (a) Correlation between surface area and total organic carbon content of marine sediments collected from the Washington continental margin (data from Keil et al., 1994, figure modified from Ransom et al., 1998). (b) Correlation between surface area and total organic carbon of marine sediments collected from transects off the California continental margin (modified from Ransom et al., 1998). The San Luis Obispo samples had >21% smectite (average ~26%) and the North Mendocino samples had <13% smectite (average ~8%). (c) Relationship between total organic C content of the clay fraction and surface area of the clay fraction of the California and Washington continental margin sediments (modified from Ransom et al., 1998).

Fonte: R. Weil & N. Brady, 2017

3. Arquitetura da matriz

POROSIDADE

- Influencia disponibilidade de oxigênio e água;
- Barreira física ao acesso dos microrganismos a MOS.

Fig. 8. Changes in mineralisation of C with changes in air-filled porosity and for uncompressed and compressed soils with (a) 10% clay and (b) 28% clay (modified from Franzluebbers, 1999).

AGREGAÇÃO

- Efeito do encapsulamento;
- Dependente da estabilidade dos agregados.

Fonte: R. Weil & N. Brady, 2017

Capacidade dos solo minerais em proteger a matéria orgânica

- A quantidade de MOS protegida pelos mecanismos é **limitada**;
- A proporção de MOS protegida/MOS adicionada depende do estado da capacidade de saturação:
 - Solo saturado X não saturado
- Um tipo específico de MOS só será substituído por outro similar na interação com a fração mineral.

Implicações da proteção nas características químicas da MOS

- Os mecanismos de proteção só atuam nos solos minerais;
- Em solos orgânicos, o tempo de residência é regido pela recalcitrância e as características estruturais da MOS dependem dos microrganismos presentes no meio;
- A presença dos mecanismos de proteção altera a composição química da MOS.

Fig. 10. Solid-state ^{13}C NMR spectra acquired for two Australian soils with (a) 11% clay and (b) 54% clay.

CONCLUSÕES

- Os minerais e o arranjo das partículas do solo influenciam no conteúdo de MOS por meio de mecanismos de proteção;
- Mecanismos de proteção tem capacidades limitadas;
- Mecanismos de proteção variam de acordo com as propriedades químicas do solo, tamanho, da mineralogia e do arranjo das partículas e da porosidade do solo;
- Determinação da capacidade de proteção deve considerar o impacto das metodologias sobre os mecanismos;
 - Fracionamento físico interfere na determinação da contribuição dos mecanismos de encapsulamento;
 - Não recomenda-se o uso de fracionamentos químicos para essa avaliação;
- Cada mecanismo pode atuar em mais de um componente da fração orgânica;
- A composição da fração orgânica depende da intensidade de atuação de cada mecanismo de proteção.

REFERÊNCIAS

- BALDOCK, J.a; SKJEMSTAD, J.o. Role of the soil matrix and minerals in protecting natural organic materials against biological attack. **Organic Geochemistry**, [s.l.], v. 31, n. 7-8, p. 697-710, jul. 2000. Elsevier BV. [http://dx.doi.org/10.1016/s0146-6380\(00\)00049-8](http://dx.doi.org/10.1016/s0146-6380(00)00049-8).
- ERNÁNDEZ, E.; DORRONSORO-FDEZ, C.; AGUILAR, J.; DORRONSORO, B.; STOOPS, G.; DÍAZ, C. Dorronsoro. **Carbonatos En Suelos**: Programa sobre el proceso de acumulación y lavado de los carbonatos y de los rasgos resultantes de su actuación en los suelos. Disponível em: <http://edafologia.ugr.es/carbonat/revest.html>. Acesso em: 29 abr. 2020
- SANTOS, H. **Sistema Brasileiro de Classificação de Solos**. 5. ed. Brasília: Embrapa, 2018. 590 p.
- WEIL, Ray R. BRADY, Nyle C.. **The nature and properties of soils**. 15. ed. London: Pearson Education, 2017. 1105 p.

OBRIGADO!