Bioprocessos microbianos 2

Maio/2020

Sumário

Contínuo

Modelos matemáticos - contínuo

Batelada

Modelos matemáticos - batelada

Batelada-
alimentada

Modelos matemáticos - batelada-alim.

Técnicas
ajuste

Técnicas de ajustes de parâmetros

Modelos matemáticos

Crescimento celular – contínuo

Relembrando o exercício de quimiostato

Determinação de parâmetros:

$$\mu^{\text{exp}} = 1.00 \pm 0.05$$

$$Y_{\text{bio/gli}}^{\text{exp}} = 0.10 \pm 0.01$$

$$v_{\text{END}} = v_{\text{BIO}} \frac{1 - Y_{\text{bio/gli}}^{\text{exp}} (7 + \frac{5}{2})}{Y_{\text{bio/gli}}^{\text{exp}}} \approx 0.5 \text{ h}^{-1}$$

Fluxo	gli	bio	CO ₂	ADP	ATP
v_{GLI}	1	0	0	0	0
v_{BIO}	0	-1	0	0	0
v_{CO2}	0	0	-1	0	0
v_{SYN}	-7	1	0	5	-5
v_{ENE}	-1	0	6	-2	2
v_{END}	7	-1	0	-3	3

 Energia de manutenção (muito alta: Y está muito baixo para um μ muito alto)

Modelos matemáticos

Crescimento celular – contínuo

Relembrando o exercício de quimiostato

Fluxo	gli	bio	CO ₂	ADP	ATP
v_{GLI}	1	0	0	0	0
v_{BIO}	0	-1	0	0	0
v_{CO2}	0	0	-1	0	0
v_{SYN}	-7	1	0	5	-5
v_{ENE}	-1	0	6	-2	2
v_{END}	7	-1	0	-3	3

Modelos matemáticos

Crescimento celular – contínuo

Relembrando o BM do quimiostato

bio: $v_{\text{BIO}} = v_{\text{SYN}} - v_{\text{END}}$
gli: $v_{\text{GLI}} + 7v_{\text{END}} = 7v_{\text{SYN}} + v_{\text{ENE}}$
ADP: $2v_{\text{ENE}} + 3v_{\text{END}} = 5v_{\text{SYN}}$
CO₂: $v_{\text{CO}_2} = 6v_{\text{ENE}}$

Fluxo	gli	bio	CO ₂	ADP	ATP
v_{GLI}	1	0	0	0	0
v_{BIO}	0	-1	0	0	0
v_{CO_2}	0	0	-1	0	0
v_{SYN}	-7	1	0	5	-5
v_{ENE}	-1	0	6	-2	2
v_{END}	7	-1	0	-3	3

Modelos matemáticos

Crescimento celular – contínuo

Relembrando o BM do quimiostato

bio: $v_{\text{BIO}} - v_{\text{SYN}} + v_{\text{END}} = 0$
gli: $v_{\text{GLI}} + 7v_{\text{END}} - 7v_{\text{SYN}} - v_{\text{ENE}} = 0$
ADP: $2v_{\text{ENE}} + 3v_{\text{END}} - 5v_{\text{SYN}} = 0$
CO₂: $v_{\text{CO}_2} - 6v_{\text{ENE}} = 0$

Fluxo	gli	bio	CO ₂	ADP	ATP
v_{GLI}	1	0	0	0	0
v_{BIO}	0	-1	0	0	0
v_{CO_2}	0	0	-1	0	0
v_{SYN}	-7	1	0	5	-5
v_{ENE}	-1	0	6	-2	2
v_{END}	7	-1	0	-3	3

Modelos matemáticos

Crescimento celular – contínuo

Relembrando o BM do quimiostato

bio: $-v_{\text{BIO}} + v_{\text{SYN}} - v_{\text{END}} = 0$
gli: $v_{\text{GLI}} + 7v_{\text{END}} - 7v_{\text{SYN}} - v_{\text{ENE}} = 0$
ADP: $-2v_{\text{ENE}} - 3v_{\text{END}} + 5v_{\text{SYN}} = 0$
CO₂: $-v_{\text{CO}_2} + 6v_{\text{ENE}} = 0$

Fluxo	gli	bio	CO ₂	ADP	ATP
v_{GLI}	1	0	0	0	0
v_{BIO}	0	-1	0	0	0
v_{CO_2}	0	0	-1	0	0
v_{SYN}	-7	1	0	5	-5
v_{ENE}	-1	0	6	-2	2
v_{END}	7	-1	0	-3	3

Modelos matemáticos

Crescimento celular – contínuo

Contínuo

Relembrando o BM do quimiostato

$$\text{bio:} \quad -v_{\text{BIO}} + v_{\text{SYN}} - v_{\text{END}} = 0$$

$$\text{gli:} \quad v_{\text{GLI}} + 7v_{\text{END}} - 7v_{\text{SYN}} - v_{\text{ENE}} = 0$$

$$\text{ADP:} \quad -2v_{\text{ENE}} - 3v_{\text{END}} + 5v_{\text{SYN}} = 0$$

$$\text{CO}_2: \quad -v_{\text{CO}_2} + 6v_{\text{ENE}} = 0$$

Batelada-
alimentada

Fluxo	gli	bio	CO ₂	ADP	ATP
v_{GLI}	1	0	0	0	0
v_{BIO}	0	-1	0	0	0
v_{CO_2}	0	0	-1	0	0
v_{SYN}	-7	1	0	5	-5
v_{ENE}	-1	0	6	-2	2
v_{END}	7	-1	0	-3	3

Técnicas
ajuste

Modelos matemáticos

Crecimiento celular – contínuo

Generalizando quimiostato para contínuo:

$$\begin{aligned}
 \text{bio:} \quad & -v_{\text{BIO}} + v_{\text{SYN}} - v_{\text{END}} = \frac{d}{dt} m_{\text{B}}(t) \\
 \text{gli:} \quad & v_{\text{GLI}} + 7v_{\text{END}} - 7v_{\text{SYN}} - v_{\text{ENE}} = \frac{d}{dt} m_{\text{S}}(t) \\
 \text{ADP:} \quad & -2v_{\text{ENE}} - 3v_{\text{END}} + 5v_{\text{SYN}} = \frac{d}{dt} m_{\text{ADP}}(t) \\
 \text{CO}_2: \quad & -v_{\text{CO}_2} + 6v_{\text{ENE}} = \frac{d}{dt} m_{\text{P}}(t)
 \end{aligned}$$

Fluxo	gli	bio	CO ₂	ADP	ATP
v_{GLI}	1	0	0	0	0
v_{BIO}	0	-1	0	0	0
v_{CO_2}	0	0	-1	0	0
v_{SYN}	-7	1	0	5	-5
v_{ENE}	-1	0	6	-2	2
v_{END}	7	-1	0	-3	3

Modelos matemáticos

Crecimiento celular – contínuo

Generalizando quimiostato para contínuo:

$$\begin{aligned}
 \text{bio:} \quad & -v_{\text{BIO}} + v_{\text{SYN}} - v_{\text{END}} &= \frac{d}{dt} m_{\text{B}}(t) \\
 \text{gli:} \quad & v_{\text{GLI}} + 7v_{\text{END}} - 7v_{\text{SYN}} - v_{\text{ENE}} &= \frac{d}{dt} m_{\text{S}}(t) \\
 \text{ADP:} \quad & -2v_{\text{ENE}} - 3v_{\text{END}} + 5v_{\text{SYN}} &= \frac{d}{dt} m_{\text{ADP}}(t) \\
 \text{CO}_2: \quad & -v_{\text{CO}_2} + 6v_{\text{ENE}} &= \frac{d}{dt} m_{\text{P}}(t)
 \end{aligned}$$

Fluxo	gli	bio	CO ₂	ADP	ATP
v_{GLI}	1	0	0	0	0
v_{BIO}	0	-1	0	0	0
v_{CO_2}	0	0	-1	0	0
v_{SYN}	-7	1	0	5	-5
v_{ENE}	-1	0	6	-2	2
v_{END}	7	-1	0	-3	3

Modelos matemáticos

Crecimiento celular – contínuo

Generalizando quimiostato para contínuo:

$$\begin{aligned}
 \text{bio:} \quad & -v_{\text{BIO}} + v_{\text{SYN}} - v_{\text{END}} = \frac{d}{dt} m_{\text{B}}(t) \\
 \text{gli:} \quad & v_{\text{GLI}} + 7v_{\text{END}} - 7v_{\text{SYN}} - v_{\text{ENE}} = \frac{d}{dt} m_{\text{S}}(t) \\
 \text{ADP:} \quad & -2v_{\text{ENE}} - 3v_{\text{END}} + 5v_{\text{SYN}} = \frac{d}{dt} m_{\text{ADP}}(t) \\
 \text{CO}_2: \quad & -v_{\text{CO}_2} + 6v_{\text{ENE}} = \frac{d}{dt} m_{\text{P}}(t)
 \end{aligned}$$

Fluxo	gli	bio	CO ₂	ADP	ATP
v_{GLI}	1	0	0	0	0
v_{BIO}	0	-1	0	0	0
v_{CO_2}	0	0	-1	0	0
v_{SYN}	-7	1	0	5	-5
v_{ENE}	-1	0	6	-2	2
v_{END}	7	-1	0	-3	3

Modelos matemáticos

Crecimiento celular – contínuo

Generalizando quimiostato para contínuo:

$$\begin{aligned}
 \text{bio:} \quad & -v_{\text{BIO}} + v_{\text{SYN}} - v_{\text{END}} = \frac{d}{dt} m_{\text{B}}(t) \\
 \text{gli:} \quad & v_{\text{GLI}} + 7v_{\text{END}} - 7v_{\text{SYN}} - v_{\text{ENE}} = \frac{d}{dt} m_{\text{S}}(t) \\
 \text{ADP:} \quad & -2v_{\text{ENE}} - 3v_{\text{END}} + 5v_{\text{SYN}} = \frac{d}{dt} m_{\text{ADP}}(t) \\
 \text{CO}_2: \quad & -v_{\text{CO}_2} + 6v_{\text{ENE}} = \frac{d}{dt} m_{\text{P}}(t)
 \end{aligned}$$

	Fluxo	gli	bio	CO ₂	ADP	ATP	} Matriz estequiométrica
coeficientes estequiométricos	v_{GLI}	1	0	0	0	0	
	v_{BIO}	0	-1	0	0	0	
	v_{CO_2}	0	0	-1	0	0	
	v_{SYN}	-7	1	0	5	-5	
	v_{ENE}	-1	0	6	-2	2	
	v_{END}	7	-1	0	-3	3	

Modelos matemáticos

Crecimiento celular – contínuo

Generalizando quimiostato para contínuo:

$$\begin{aligned}
 \text{bio:} \quad & -v_{\text{BIO}} + v_{\text{SYN}} - v_{\text{END}} &= \frac{d}{dt} [m_{\text{B}}(t)] \\
 \text{gli:} \quad & v_{\text{GLI}} + 7v_{\text{END}} - 7v_{\text{SYN}} - v_{\text{ENE}} &= \frac{d}{dt} [m_{\text{S}}(t)] \\
 \text{ADP:} \quad & -2v_{\text{ENE}} - 3v_{\text{END}} + 5v_{\text{SYN}} &= \frac{d}{dt} [m_{\text{ADP}}(t)] \\
 \text{CO}_2: \quad & -v_{\text{CO}_2} + 6v_{\text{ENE}} &= \frac{d}{dt} [m_{\text{P}}(t)]
 \end{aligned}$$

	Fluxo	gli	bio	CO ₂	ADP	ATP	} Matriz estequiométrica
coeficientes estequiométricos	v_{GLI}	1	0	0	0	0	
	v_{BIO}	0	-1	0	0	0	
	v_{CO_2}	0	0	-1	0	0	
	v_{SYN}	-7	1	0	5	-5	
	v_{ENE}	-1	0	6	-2	2	
	v_{END}	7	-1	0	-3	3	

Modelos matemáticos

Crecimiento celular – contínuo

Generalizando quimiostato para contínuo:

$$\begin{aligned}
 \text{bio:} \quad & -v_{\text{BIO}} + v_{\text{SYN}} - v_{\text{END}} &= \frac{d}{dt} [\text{[B]}(t)V(t)] \\
 \text{gli:} \quad & v_{\text{GLI}} + 7v_{\text{END}} - 7v_{\text{SYN}} - v_{\text{ENE}} &= \frac{d}{dt} [\text{[S]}(t)V(t)] \\
 \text{ADP:} \quad & -2v_{\text{ENE}} - 3v_{\text{END}} + 5v_{\text{SYN}} &= \frac{d}{dt} [\text{[ADP]}(t)V(t)] \\
 \text{CO}_2: \quad & -v_{\text{CO}_2} + 6v_{\text{ENE}} &= \frac{d}{dt} [\text{[P]}(t)V(t)]
 \end{aligned}$$

	Fluxo	gli	bio	CO ₂	ADP	ATP	} Matriz estequiométrica
coeficientes	v_{GLI}	1	0	0	0	0	
estequiométricos	v_{BIO}	0	-1	0	0	0	
	v_{CO_2}	0	0	-1	0	0	
	v_{SYN}	-7	1	0	5	-5	
	v_{ENE}	-1	0	6	-2	2	
	v_{END}	7	-1	0	-3	3	

Modelos matemáticos

Crecimiento celular – contínuo

Generalizando quimiostato para contínuo:

Contínuo

$$\text{bio:} \quad -v_{\text{BIO}}(t) + v_{\text{SYN}}(t) - v_{\text{END}}(t) = \frac{d}{dt} [[\text{B}](t)V(t)]$$

Batelada

$$\text{gli:} \quad v_{\text{GLI}}(t) + 7v_{\text{END}}(t) - 7v_{\text{SYN}}(t) - v_{\text{ENE}}(t) = \frac{d}{dt} [[\text{S}](t)V(t)]$$

$$\text{ADP:} \quad -2v_{\text{ENE}}(t) - 3v_{\text{END}}(t) + 5v_{\text{SYN}}(t) = \frac{d}{dt} [[\text{ADP}](t)V(t)]$$

$$\text{CO}_2: \quad -v_{\text{CO}_2}(t) + 6v_{\text{ENE}}(t) = \frac{d}{dt} [[\text{P}](t)V(t)]$$

Batelada-
alimentada

Técnicas
ajuste

Modelos matemáticos

Crescimento celular – contínuo

Generalizando quimiostato para contínuo:

Contínuo

Batelada

Batelada-alimentada

Técnicas ajuste

$$\begin{aligned}
 -F_{\text{out}}(t)[\mathbf{B}_{\text{out}}](t) + v_{\text{SYN}}(t) - v_{\text{END}}(t) &= \frac{d}{dt} [\mathbf{B}(t)V(t)] \\
 \boxed{v_{\text{GLI}}(t)} + 7v_{\text{END}}(t) - 7v_{\text{SYN}}(t) - v_{\text{ENE}}(t) &= \frac{d}{dt} [\mathbf{S}(t)V(t)] \\
 -2v_{\text{ENE}}(t) - 3v_{\text{END}}(t) + 5v_{\text{SYN}}(t) &= \frac{d}{dt} [\mathbf{ADP}(t)V(t)] \\
 G_{\text{in}}(t)[\text{CO}_2]_{\text{in}}(t) - G_{\text{out}}(t)[\text{CO}_2]_{\text{out}}(t) + 6v_{\text{ENE}}(t) &= \frac{d}{dt} [\mathbf{P}(t)V(t)]
 \end{aligned}$$

g/h

$$v_{\text{GLI}}(t) = ?$$

Dica:

$$q_S = \underbrace{\frac{\Delta m_S}{\Delta t}}_{\text{Cuidado!}} \cdot \frac{1}{m_{\text{bio}}(t_f)} \quad \text{g/h/g}$$

Modelos matemáticos

Crecimiento celular – contínuo

Generalizando quimiostato para contínuo:

Contínuo

$$-F_{\text{out}}(t)[\mathbf{B}_{\text{out}}](t) + v_{\text{SYN}}(t) - v_{\text{END}}(t) = \frac{d}{dt} [[\mathbf{B}](t)V(t)]$$

Batelada

$$\boxed{v_{\text{GLI}}(t)} + 7v_{\text{END}}(t) - 7v_{\text{SYN}}(t) - v_{\text{ENE}}(t) = \frac{d}{dt} [[\mathbf{S}](t)V(t)]$$

$$-2v_{\text{ENE}}(t) - 3v_{\text{END}}(t) + 5v_{\text{SYN}}(t) = \frac{d}{dt} [[\mathbf{ADP}](t)V(t)]$$

Batelada-
alimentada

$$G_{\text{in}}(t)[\mathbf{CO2}]_{\text{in}}(t) - G_{\text{out}}(t)[\mathbf{CO2}]_{\text{out}}(t) + 6v_{\text{ENE}}(t) = \frac{d}{dt} [[\mathbf{P}](t)V(t)]$$

Técnicas
ajuste

Exemplo:

$$v_{\text{SYN}}(t) = \left[\mu_{\text{max}} \frac{[\mathbf{S}](t)}{K_S + [\mathbf{S}](t)} \right] [\mathbf{B}](t)V(t)$$

Modelos matemáticos

Crescimento celular – contínuo

Generalizando quimiostato para contínuo:

Contínuo

$$-F_{\text{out}}(t)[\mathbf{B}_{\text{out}}](t) + v_{\text{SYN}}(t) - v_{\text{END}}(t) = \frac{d}{dt} [[\mathbf{B}](t)V(t)]$$

Batelada

$$\boxed{v_{\text{GLI}}(t)} + 7v_{\text{END}}(t) - 7v_{\text{SYN}}(t) - v_{\text{ENE}}(t) = \frac{d}{dt} [[\mathbf{S}](t)V(t)]$$

$$-2v_{\text{ENE}}(t) - 3v_{\text{END}}(t) + 5v_{\text{SYN}}(t) = \frac{d}{dt} [[\mathbf{ADP}](t)V(t)]$$

Batelada-alimentada

$$G_{\text{in}}(t)[\mathbf{CO2}]_{\text{in}}(t) - G_{\text{out}}(t)[\mathbf{CO2}]_{\text{out}}(t) + 6v_{\text{ENE}}(t) = \frac{d}{dt} [[\mathbf{P}](t)V(t)]$$

Técnicas ajuste

Exemplo:

$$v_{\text{SYN}}(t) = \left[\mu_{\text{max}} \frac{[\mathbf{S}](t)}{K_S + [\mathbf{S}](t)} \right] [\mathbf{B}](t)V(t)$$

1 lei **cinética** para cada reação

Modelos matemáticos

Crescimento celular – contínuo

Contínuo

O modelo matemático geral é:

Batelada

Balanço de massa $\rightarrow$ matriz esteq.

+

+

Batelada-
alimentada

Leis cinéticas $\rightarrow$ exemplo Monod

Técnicas
ajuste

Ponto de partida da aula da Rosane

Modelos matemáticos

Crecimiento celular – contínuo

Contínuo

Exemplo – Modelo de Herbert/Pirt

$$-\frac{F_{\text{out}}(t)}{[B](t)V(t)} [B_{\text{out}}](t) + \left[\mu_{\text{max}} \frac{[S](t)}{K_S + [S](t)} - a \right] = \mu(t)$$

Batelada

Batelada-
alimentada

Técnicas
ajuste

Modelos matemáticos

Crescimento celular – contínuo

Contínuo

Exemplo – Modelo de Herbert/Pirt

$$-\frac{F_{\text{out}}(t)}{[B](t)V(t)} [B_{\text{out}}](t) + \left[\mu_{\text{max}} \frac{[S](t)}{K_S + [S](t)} - a \right] = \mu(t)$$

Batelada

$$[B_{\text{out}}](t) = [B](t)$$

← Mistura perfeita

Batelada-
alimentada

$$-\frac{F_{\text{out}}(t)}{V(t)} + \underbrace{\left[\mu_{\text{max}} \frac{[S](t)}{K_S + [S](t)} \right]}_{v_{\text{SYN}}(t)} \underbrace{- a}_{v_{\text{END}}(t)} = \mu(t)$$

Técnicas
ajuste

Modelos matemáticos

Crescimento celular – contínuo

Contínuo

Exemplo – Modelo de Herbert/Pirt

$$\left[\mu_{\max} \frac{[S](t)}{K_S + [S](t)} - a \right] - \frac{F_{\text{out}}(t)}{V(t)} = \mu(t)$$

Batelada

$$\left[\mu_{\max} \frac{[S](t)}{K_S + [S](t)} - a \right] - D_{\text{out}}(t) = \mu(t)$$

Batelada-
alimentada

$\mu_{\text{células}}(t)$

Efeito da
diluição
do seu
biorreator

$\mu_{\text{acc}}(t)$

Técnicas
ajuste

Modelos matemáticos

Crecimiento celular – contínuo

Contínuo

Exemplo – quimiostato

$$\mu_{\text{células}}(t) - D_{\text{out}}(t) = 0$$

$$D_{\text{out}}(t) = D_{\text{in}}(t) = \text{cte}$$

Batelada

$$\mu_{\text{células}} = D$$

Batelada-
alimentada

Técnicas
ajuste

Modelos matemáticos

Crescimento celular – contínuo, aplicação

Exemplo – determinar μ_{max}

$$[B](t)V(t) [\mu_{células} - D_{out}(t)] = \frac{d}{dt} [[B](t)V(t)]$$

Controlar o volume, mantendo-o constante:
Sistema da Marilda

Setpoint da bomba 2 >> setpoint da bomba 1
Bomba 2 tira líquido acima da boca do tubinho super rápido, e se o líquido está abaixo ela puxa ar

Contínuo

Batelada

Batelada-
alimentada

Técnicas
ajuste

Modelos matemáticos

Crescimento celular – contínuo, aplicação

Exemplo – determinar μ_{max}

$$[B](t)V(t) [\mu_{células} - D_{out}(t)] = \frac{d}{dt} [[B](t)V(t)]$$

Controlar o volume, mantendo-o constante:
Sistema da Marilda

Setpoint da bomba 2 >> setpoint da bomba 1

D: setpoint da bomba 1 e altura da boca do tubinho da bomba 2

Contínuo

Batelada

Batelada-
alimentada

Técnicas
ajuste

Modelos matemáticos

Crescimento celular – contínuo, aplicação

Contínuo

Exemplo – determinar μ_{max}

$$[B](t)V(t) [\mu_{células} - D_{out}(t)] = \frac{d}{dt} [[B](t)V(t)]$$

Batelada

Controlar o volume, mantendo-o constante. Setar o $D \gg \mu_{max}$

Batelada-
alimentada

$$[B](t) [\mu_{max} - D] = \frac{d}{dt} [[B](t)]$$

Essa equação diferencial tem
solução analítica:

Técnicas
ajuste

$$\ln([B](t)) = (\mu_{max} - D)t + \ln([B](0))$$

Modelos matemáticos

Crescimento celular – contínuo, aplicação

Contínuo

Exemplo – determinar $\mu_{\max}$

$$\ln([B](t)) = (\mu_{\max} - D)t + \ln([B](0))$$

Batelada

Batelada-
alimentada

Técnicas
ajuste

1) Por que a concentração de células no biorreator aumenta antes de cair?

2) Se $\mu_{\max} - D = \mu_{ap}$, como é o gráfico de $[B]$ em função de t para diferentes valores de μ_{ap} ?

Dica: www.geogebra.org

Modelos matemáticos

Crescimento celular – contínuo, aplicação

Contínuo

Exemplo – determinar μ_{max}

$$\ln([B](t)) = (\mu_{max} - D)t + \ln([B](0))$$

Batelada

Batelada-
alimentada

Técnicas
ajuste

Planilha exercício 1

- Determine o μ_{max} para cada ensaio
- Os dois ensaios deveriam ser duplicatas. O que deu errado?

Modelos matemáticos

Crescimento celular – batelada

Voltamos para o equacionamento geral:

Contínuo

Batelada

Batelada-alimentada

Técnicas ajuste

$$\begin{aligned}
 -F_{\text{out}}(t)[\mathbf{B}_{\text{out}}](t) + v_{\text{SYN}}(t) - v_{\text{END}}(t) &= \frac{d}{dt} [\mathbf{B}(t)V(t)] \\
 \boxed{v_{\text{GLI}}(t)} + 7v_{\text{END}}(t) - 7v_{\text{SYN}}(t) - v_{\text{ENE}}(t) &= \frac{d}{dt} [\mathbf{S}(t)V(t)] \\
 -2v_{\text{ENE}}(t) - 3v_{\text{END}}(t) + 5v_{\text{SYN}}(t) &= \frac{d}{dt} [\mathbf{ADP}(t)V(t)] \\
 G_{\text{in}}(t)[\mathbf{CO2}]_{\text{in}}(t) - G_{\text{out}}(t)[\mathbf{CO2}]_{\text{out}}(t) + 6v_{\text{ENE}}(t) &= \frac{d}{dt} [\mathbf{P}(t)V(t)]
 \end{aligned}$$

Exemplo:

$$v_{\text{SYN}}(t) = \left[\mu_{\text{max}} \frac{[\mathbf{S}](t)}{K_S + [\mathbf{S}](t)} \right] [\mathbf{B}](t)V(t)$$

1 lei **cinética** para cada reação

Modelos matemáticos

Crescimento celular – batelada

Contínuo

$$\text{Batelada: } F_{in} = F_{out} = 0$$

Batelada

$$-F_{out}(t)[B_{out}](t) + v_{SYN}(t) - v_{END}(t) = \frac{d}{dt} [[B](t)V(t)]$$

$$\boxed{v_{GLI}(t)} + 7v_{END}(t) - 7v_{SYN}(t) - v_{ENE}(t) = \frac{d}{dt} [[S](t)V(t)]$$

$$-2v_{ENE}(t) - 3v_{END}(t) + 5v_{SYN}(t) = \frac{d}{dt} [[ADP](t)V(t)]$$

$$G_{in}(t)[CO2]_{in}(t) - G_{out}(t)[CO2]_{out}(t) + 6v_{ENE}(t) = \frac{d}{dt} [[P](t)V(t)]$$

Batelada-alimentada

Técnicas ajuste

Exemplo:

$$v_{SYN}(t) = \left[\mu_{max} \frac{[S](t)}{K_S + [S](t)} \right] [B](t)V(t)$$

1 lei **cinética** para cada reação

Modelos matemáticos

Crescimento celular – batelada

Contínuo

$$\text{Batelada: } F_{in} = F_{out} = 0$$

Batelada

$$\begin{aligned}
 v_{\text{SYN}}(t) - v_{\text{END}}(t) &= \frac{d}{dt} [\text{[B]}(t)V(t)] \\
 7v_{\text{END}}(t) - 7v_{\text{SYN}}(t) - v_{\text{ENE}}(t) &= \frac{d}{dt} [\text{[S]}(t)V(t)] \\
 -2v_{\text{ENE}}(t) - 3v_{\text{END}}(t) + 5v_{\text{SYN}}(t) &= \frac{d}{dt} [\text{[ADP]}(t)V(t)] \\
 G_{in}(t)[\text{CO}_2]_{in}(t) - G_{out}(t)[\text{CO}_2]_{out}(t) + 6v_{\text{ENE}}(t) &= \frac{d}{dt} [\text{[P]}(t)V(t)]
 \end{aligned}$$

Batelada-alimentada

Técnicas ajuste

Exemplo:

$$v_{\text{SYN}}(t) = \left[\mu_{\text{max}} \frac{[\text{S}](t)}{K_S + [\text{S}](t)} \right] [\text{B}](t)V(t)$$

1 lei **cinética** para cada reação

Modelos matemáticos

Crescimento celular – batelada alimentada

Contínuo

Batelada-alimentada: $F_{out} = 0 < F_{in}$

Batelada

$$\begin{aligned}
 v_{SYN}(t) - v_{END}(t) &= \frac{d}{dt} [[B](t)V(t)] \\
 \boxed{v_{GLI}(t)} + 7v_{END}(t) - 7v_{SYN}(t) - v_{ENE}(t) &= \frac{d}{dt} [[S](t)V(t)] \\
 -2v_{ENE}(t) - 3v_{END}(t) + 5v_{SYN}(t) &= \frac{d}{dt} [[ADP](t)V(t)] \\
 G_{in}(t)[CO2]_{in}(t) - G_{out}(t)[CO2]_{out}(t) + 6v_{ENE}(t) &= \frac{d}{dt} [[P](t)V(t)]
 \end{aligned}$$

Batelada-alimentada

Técnicas ajuste

Exemplo:

$$v_{SYN}(t) = \left[\mu_{max} \frac{[S](t)}{K_S + [S](t)} \right] [B](t)V(t)$$

1 lei **cinética** para cada reação

Modelos matemáticos

Crescimento celular – leis cinéticas

Contínuo

Leis cinéticas de biomassa mais usuais

Monod:

$$\mu([S](t)) = \mu_{\max} \frac{[S](t)}{K_S + [S](t)}$$

Batelada

Inibição S:

$$\mu([S](t)) = \mu_{\max} \frac{[S](t)}{K_S + [S](t) + \frac{[[S](t)]^2}{K_i}}$$

Batelada-
alimentada

Inibição P:
(Monod P)

$$\mu([S](t)) = \mu_{\max} \frac{[S](t)}{K_S \left(1 + \frac{[P]}{K_P}\right) + [S](t)}$$

Técnicas
ajuste

Inibição P:
(Logístico)

$$\mu([S](t)) = \mu_{\max} \left(1 - \frac{[P]}{[P]_{\max}}\right)^n$$

Modelos matemáticos

Crescimento celular – técnicas de ajuste

- 1) Ajuste linear
- 2) Linearização → ajuste linear

Já fizemos no exemplo de aplicação do modo de operação contínuo. Mais um exercício de linearização:

$$\mu([S]) = \mu_{\max} \frac{[S]}{K_S + [S]} \qquad \Omega(\omega) = A\omega + B$$

Dica: lembre de resistências elétricas associadas em paralelo

Contínuo

Batelada

Batelada-
alimentada

Técnicas
ajuste

Modelos matemáticos

Crescimento celular – técnicas de ajuste

- 1) Ajuste linear
- 2) Linearização → ajuste linear

Já fizemos no exemplo de aplicação do modo de operação contínuo. Mais um exercício de linearização:

$$\frac{1}{\mu([S])} = \frac{K_S + [S]}{[S]\mu_{\max}} = \frac{K_S}{\mu_{\max}} \cdot \frac{1}{[S]} + \frac{1}{K_S} \mu_{\max}$$

$$\omega = \frac{1}{[S]}$$

$$\Omega = \frac{1}{\mu([S])}$$

Dica: lembre de resistências elétricas associadas em paralelo

Contínuo

Batelada

Batelada-
alimentada

Técnicas
ajuste

Modelos matemáticos

Crescimento celular – técnicas de ajuste

- 1) Ajuste linear
- 2) Linearização → ajuste linear
- 3) Solver

O computador chuta um conjunto de valores para os parâmetros do seu modelo, calcula cada ponto com esse conjunto, calcula um erro global que você definiu e repete até não conseguir mais diminuir o erro global

Contínuo

Batelada

Batelada-
alimentada

Técnicas
ajuste

Modelos matemáticos

Crescimento celular – técnicas de ajuste

Contínuo

1) Ajuste linear

2) Linearização → ajuste linear

3) Solver

Batelada

Estimar derivadas (ex: um modelo de μ):

1) Deltas ponto-a-ponto

2) Ajuste → derivação analítica

3) Ajuste → deltas ponto-a-ponto

Batelada-
alimentada

Técnicas
ajuste

Modelos matemáticos

Crescimento celular – técnicas de ajuste

Contínuo

Planilha exercício 2:

Batelada

2.1) Determinar os pontos $(t, z_{\max})$ onde:

a) $z = q_p$ instantâneo, apenas para $t > 1.15$ dias

b) $z = \mu$ instantâneo

c) $z = q_s$ instantâneo, apenas para $t > 1.15$ dias

d) $z = Y_{P/S}$ global

e) $z = Y_{B/S}$ global

f) $z = Y_{P/S}$ instantâneo

g) $z = Y_{B/S}$ instantâneo

Batelada-
alimentada

Técnicas
ajuste

Modelos matemáticos

Crescimento celular – técnicas de ajuste

Planilha exercício 2:

2.2) Com base nas respostas da parte 1, responda:
h) se P é bioproduto de baixo valor agregado a ser produzido num biorreator contínuo de 1 m^3 , qual vazão de meio de cultura seria um bom chute inicial de condição ótima de processo?

i) o mesmo do item anterior, mas agora a própria biomassa é o bioproduto

Contínuo

Batelada

Batelada-
alimentada

Técnicas
ajuste

Modelos matemáticos

Crescimento celular – técnicas de ajuste

Planilha exercício 2:

2.3) Com base nas respostas da parte 1, responda:
j) se P é bioproduto de baixo valor agregado a ser produzido num biorreator batelada de 1 m³, quanto tempo deve durar o cultivo?

k) o mesmo do item anterior, mas agora a própria biomassa é o bioproduto

Contínuo

Batelada

Batelada-
alimentada

Técnicas
ajuste

Modelos matemáticos

Crescimento celular – técnicas de ajuste

Planilha exercício 2:

2.4) Qual das 4 leis cinéticas de biomassa mais usuais melhor explica esses dados experimentais?

Contínuo

Batelada

Batelada-
alimentada

Técnicas
ajuste

Modelos matemáticos

Crescimento celular – técnicas de ajuste

Variação de volume independente do crescimento – exemplo: amostragem

Contínuo

Batelada

Batelada-alimentada

Técnicas ajuste

1) μ vai ser super ou subestimado?

2) q_S vai ser super ou subestimado?

3) $Y_{B/S}$ vai ser super ou subestimado?

4) Qual dos três terá o maior erro?

Modelos matemáticos

Crescimento celular – técnicas de ajuste

Planilha exercício 3

Contínuo

Batelada

Batelada-alimentada

Técnicas ajuste

3.1) Determine μ , q_S e $Y_{B/S}$ para os três casos:

a) via concentrações, sem corrigir a amostragem

b) via massas, sem corrigir a amostragem

c) via massas, corrigindo amostragem

Modelos matemáticos

Crescimento celular – técnicas de ajuste

Planilha exercício 3

Contínuo

Batelada

Batelada-
alimentada

Técnicas
ajuste

3.2) Responda:
d) O crescimento é
exponencial?

Modelos matemáticos

Crescimento celular – técnicas de ajuste

Planilha exercício 3

Contínuo

Batelada

Batelada-
alimentada

Técnicas
ajuste

3.2) Responda:

e) Por que o μ do item a deu igual ao do item c porém diferente do item b?

f) Por que o q_s do item a não deu igual ao do item c?

g) Quanto % de erro você teria ao fazer uma simulação com o método do item b?

Modelos matemáticos

Crescimento celular – técnicas de ajuste

Contínuo

Batelada alimentada – Planilha exercício 4

Batelada

Cultivo batelada com controle de pH usando uma solução de NH_4OH

Batelada-alimentada

4.1) Resposta:

a) o crescimento é exponencial?

Técnicas
ajuste

Modelos matemáticos

Crescimento celular – técnicas de ajuste

Contínuo

Batelada alimentada – Planilha exercício 4

Batelada

Cultivo batelada com controle de pH usando uma solução de NH_4OH

Batelada-alimentada

4.2) Determine os valores máximos de μ , q_s e $Y_{B/S}$ pelos métodos:

Técnicas ajuste

- b) concentrações, 0 a 12h
- c) massas, 0 a 12 h
- d) concentrações, 6 a 12 h