Física 1 (4310145) - Aula 14/05/2020

● Capítulo 2

- Perguntas: Todas!
- Problemas: 2.1, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9, 2.14, 2.17, 2.21, 2.31, 2.37, 2.41, 2.67, 2.69

● Capítulo 3

- Perguntas: 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13
- Problemas: 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.15, 3.32, 3.27, 3.33, 3.37, 3.43

● Capítulo 4

- Perguntas: 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.13, 4.17
- Problemas: 4.1, 4.3, 4.7, 4.9, 4.11, 4.19, 4.25, 4.29, 4.47, 4.57, 4.65, 4.69

● Capítulo 5

- Perguntas: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9
- Problemas: 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.11, 5.13, 5.15, 5.19, 5.21, 5.31, 5.35, 5.45, 5.63

● Capítulo 6

- Perguntas: 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.9, 6.13
- Problemas: 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.13, 6.19, 6.25, 6.33, 6.39, 6.41, 6.43, 6.57, 6.59

● Capítulo 7

- Perguntas: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.9, 7.11
- Problemas: 7.1, 7.3, 7.5, 7.7, 7.15, 7.17, 7.21, 7.23, 7.31, 7.37, 7.41, 7.43, 7.45, 7.49, 7.67

● Capítulo 8

- Perguntas: 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.9, 8.11
- Problemas: 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.7, 8.9, 8.13, 8.15, 8.19, 8.25, 8.37, 8.39, 8.41, 8.45, 8.47, 8.53, 8.57, 8.67

● Capítulo 9

- Perguntas: 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.7, 9.9, 9.11
- Problemas: 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.7, 9.11, 9.13, 9.17, 9.19, 9.25, 9.29, 9.33, 9.37, 9.39, 9.41, 9.45, 9.49, 9.51, 9.55, 9.61, 9.63, 9.73, 9.75

● Capítulo 10

- Perguntas:
- Problemas:

● Capítulo 11

- Perguntas:
- Problemas:

- 1 Centro de Massa e Momento Linear
 - A Segunda Lei de Newton para um sistema de Partículas
 - Momento Linear
 - Momento Linear de um sistema de partículas
 - Colisão e Impulso

- 1 Centro de Massa e Momento Linear
 - A Segunda Lei de Newton para um sistema de Partículas
 - Momento Linear
 - Momento Linear de um sistema de partículas
 - Colisão e Impulso

- 1 Centro de Massa e Momento Linear
 - A Segunda Lei de Newton para um sistema de Partículas
 - Momento Linear
 - Momento Linear de um sistema de partículas
 - Colisão e Impulso

A Segunda Lei de Newton para um sistema de Partículas

- Embora o centro de massa seja apenas um ponto, ele se move como uma partícula cuja massa é igual à massa total do sistema
- Podemos atribuir-lhe uma posição, uma velocidade e uma aceleração.
- A equação que descreve o movimento do CM de um sistema de partículas é

A Segunda Lei de Newton para um sistema de Partículas

- Embora o centro de massa seja apenas um ponto, ele se move como uma partícula cuja massa é igual à massa total do sistema
- Podemos atribuir-lhe uma posição, uma velocidade e uma aceleração.
- A equação que descreve o movimento do CM de um sistema de partículas é

A Segunda Lei de Newton para um sistema de Partículas

- Embora o centro de massa seja apenas um ponto, ele se move como uma partícula cuja massa é igual à massa total do sistema
- Podemos atribuir-lhe uma posição, uma velocidade e uma aceleração.
- A equação que descreve o movimento do CM de um sistema de partículas é

A Segunda Lei de Newton para um sistema de Partículas

- Embora o centro de massa seja apenas um ponto, ele se move como uma partícula cuja massa é igual à massa total do sistema
- Podemos atribuir-lhe uma posição, uma velocidade e uma aceleração.
- A equação que descreve o movimento do CM de um sistema de partículas é

A Segunda Lei de Newton para um sistema de Partículas

- Embora o centro de massa seja apenas um ponto, ele se move como uma partícula cuja massa é igual à massa total do sistema
- Podemos atribuir-lhe uma posição, uma velocidade e uma aceleração.
- A equação que descreve o movimento do CM de um sistema de partículas é

$$\vec{F}_{\text{res}} = M\vec{a}_{\text{cm}}$$

A Segunda Lei de Newton para um sistema de Partículas

- Embora o centro de massa seja apenas um ponto, ele se move como uma partícula cuja massa é igual à massa total do sistema
- Podemos atribuir-lhe uma posição, uma velocidade e uma aceleração.
- A equação que descreve o movimento do CM de um sistema de partículas é

$$\vec{F}_{\text{res}} = M\vec{a}_{\text{cm}}$$

- Na equação acima
 - $\vec{F}_{\text{res}}$: força resultante de todas as **forças externas** que agem sobre o sistema
 - M : massa total do sistema
 - $\vec{a}_{\text{cm}}$: aceleração do CM do sistema.

A Segunda Lei de Newton para um sistema de Partículas

- Corpo maciço: no exemplo, M é a massa do bastão, e $\vec{F}_{\text{ext}}$ é a força gravitacional
- Explosões: O CM dos fragmentos segue a mesma trajetória parabólica que o foguete teria seguido se não tivesse explodido. As forças internas da explosão não mudam a trajetória do CM.

Demonstração da equação: $\vec{F}_{\text{res}} = M\vec{a}_{\text{cm}}$

A Segunda Lei de Newton para um sistema de Partículas

- Para um sistema de n partículas, escrevemos

$$M\vec{r}_{\text{cm}} = m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2 + \cdots + m_n\vec{r}_n$$

- Derivando a eq. anterior, obtemos

$$M\vec{v}_{\text{cm}} = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + \cdots + m_n\vec{v}_n$$

- Derivando a eq. anterior, obtemos

$$M\vec{a}_{\text{cm}} = \underbrace{m_1\vec{a}_1}_{\vec{F}_1} + \underbrace{m_2\vec{a}_2}_{\vec{F}_2} + \cdots + \underbrace{m_n\vec{a}_n}_{\vec{F}_n}$$

$$M\vec{a}_{\text{cm}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n$$

Demonstração da equação: $\vec{F}_{\text{res}} = M\vec{a}_{\text{cm}}$

A Segunda Lei de Newton para um sistema de Partículas

$$M\vec{a}_{\text{cm}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n$$

- $\sum_i \vec{F}_i$ contém as forças internas e externas
- As forças internas formam pares do tipo ação-reação que se cancelam mutuamente

$$\begin{aligned}\vec{F}_3 &= \vec{F}_{34} & \vec{F}_4 &= \vec{F}_{43} \\ \vec{F}_{34} &= -\vec{F}_{43}\end{aligned}$$

- Desta forma

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n = \vec{F}_{\text{ext}}$$

- Finalmente

$$\boxed{\vec{F}_{\text{ext}} = M\vec{a}_{\text{cm}}}$$

- $\vec{F}_{\text{res}}$ é a **força externa resultante!**

Dois patinadores em uma superfície de gelo, sem atrito, seguram as extremidades de uma vara, de massa desprezível. É escolhido um eixo de referência na mesma posição que a vara, com a origem no centro de massa do sistema de dois patinadores. Um patinador, João, pesa duas vezes mais do que o outro patinador, Eduardo. Onde os patinadores se encontram se (a) João puxa a vara para se aproximar de Eduardo, (b) Eduardo puxa a vara para se aproximar de João, e (c) os dois patinadores puxam a vara?

- 1 Centro de Massa e Momento Linear
 - A Segunda Lei de Newton para um sistema de Partículas
 - **Momento Linear**
 - Momento Linear de um sistema de partículas
 - Colisão e Impulso

Momento Linear

- Vamos definir o momento linear

Momento linear de uma partícula (Quantidade de movimento de uma partícula)

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad (\text{unidade SI: kg} \cdot \text{m/s})$$

- Derivando o momento linear, podemos escrever

$$\boxed{\vec{F}_{\text{res}} = \frac{d\vec{p}}{dt}} \quad (1)$$

- Se $\vec{F}_{\text{res}} = 0$ então $\vec{p}$ é constante
- As Eqs. (1) e (2) são equivalentes

$$\vec{F}_{\text{res}} = m\vec{a} \quad (2)$$

A figura mostra o módulo $p = |\vec{p}|$ do momento linear em função do tempo t para uma partícula que se move ao longo de um eixo. Uma força dirigida ao longo do eixo age sobre a partícula. (a) Ordene as quatro regiões indicadas de acordo com o módulo da força, do maior para o menor. (b) Em que região a velocidade da partícula está diminuindo?

Momento Linear de um sistema de partículas

- Podemos estender a definição de momento linear para um sistema de partículas

$$\vec{P} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3 + \cdots + \vec{p}_n$$

$$\vec{P} = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + m_3\vec{v}_3 + \cdots + m_n\vec{v}_n$$

- Já vimos anteriormente que

$$M\vec{r}_{cm} = m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2 + \cdots + m_n\vec{r}_n$$

$$M\vec{v}_{cm} = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + \cdots + m_n\vec{v}_n$$

- Portanto, podemos escrever

Momento linear de um sistema de partículas

$$\vec{P} = M\vec{v}_{cm}$$

Segunda Lei de Newton para um sistema de partículas

- Momento linear de um sistema de partículas

$$\vec{P} = M\vec{v}_{cm}$$

- Derivando a Eq. acima, obtemos

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = M \frac{d\vec{v}_{cm}}{dt}$$
$$\frac{d\vec{p}_1}{dt} + \frac{d\vec{p}_2}{dt} + \dots + \frac{d\vec{p}_n}{dt} = M \frac{d\vec{v}_{cm}}{dt}$$
$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = M \frac{d\vec{v}_{cm}}{dt}$$

$$\boxed{\vec{F}_{res} = \frac{d\vec{P}}{dt}}$$

- $\vec{F}_{res}$ é a **força externa resultante!**

- 1 Centro de Massa e Momento Linear
 - A Segunda Lei de Newton para um sistema de Partículas
 - Momento Linear
 - Momento Linear de um sistema de partículas
 - Colisão e Impulso

Colisão simples

Colisão e Impulso

- Em uma colisão
 - a força é de curta duração
 - a força tem um módulo elevado
 - provoca uma mudança brusca no momento do corpo

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \implies \vec{F} dt = \frac{d\vec{p}}{dt} dt \implies \int_{t_i}^{t_f} \vec{F} dt = \int_{t_i}^{t_f} \frac{d\vec{p}}{dt} dt$$
$$\vec{p}_f - \vec{p}_i = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F} dt \implies \Delta\vec{p} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F} dt$$

Impulso

$$\vec{J} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}(t) dt$$

Teorema Impulso-momento

$$\vec{J} = \Delta\vec{p}$$

Integração da Força

Colisão e Impulso

- Se conhecermos $\vec{F}(t)$, podemos calcular

$$\vec{J} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}(t) dt$$

- Muitas vezes não conhecemos $\vec{F}(t)$, mas conhecemos seu valor médio $\vec{F}_{\text{med}}$

$$\vec{F}_{\text{med}} \Delta t = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}(t) dt$$

- Assim, temos

$$\vec{J} = \vec{F}_{\text{med}} \Delta t$$

Um paraquedista, cujo paraquedas não abriu, cai em um monte de neve e sofre ferimentos leves. Se caísse em um terreno sem neve, o tempo necessário para parar teria sido 10 vezes menor e a colisão seria fatal. A presença da neve aumenta, diminui ou mantém inalterado o valor (a) da variação do momento do paraquedista, (b) do impulso experimentado pelo paraquedista e (c) da força experimentada pelo paraquedista?

Colisões em Série

Colisão e Impulso

- Suponha que n projéteis colidem em um intervalo Δt
- Supondo que cada projétil tem momento inicial $\vec{p}_i$ e sofre uma variação de momento igual $\Delta\vec{p}$ por causa da colisão
- A variação total de momento linear de n projéteis durante o intervalo de tempo Δt é

$$n\Delta\vec{p}$$

- O impulso a que o alvo é submetido em um intervalo de tempo Δt é

$$\vec{J} = -n\Delta\vec{p}$$

- Podemos calcular a força média que age no alvo durante as colisões

$$\vec{F}_{\text{med}}\Delta t = -n\Delta\vec{p}$$

$$\vec{F}_{\text{med}} = -n\frac{\Delta\vec{p}}{\Delta t}$$

A figura mostra uma vista superior de uma bola ricocheteando em uma parede vertical sem que a velocidade escalar da bola seja afetada. Considere a variação $\Delta\vec{p}$ do momento linear da bola. (a) Δp_x é positiva, negativa ou nula? (b) Δp_y é positiva, negativa ou nula? (c) Qual é a orientação de $\Delta\vec{p}$?

- Reproduza as passagens de maneira independente!
- Estude as referências!
 - D. Halliday, R. Resnick, and J. Walker. *Fundamentos de Física - Mecânica*, volume 1. LTC, 10 edition, 2016
 - P.A. Tipler and G. Mosca. *Física para Cientistas e Engenheiros*, volume 1. LTC, 10 edition, 2009
 - H.M. Nussenzveig. *Curso de física básica, 1: mecânica*. E. Blucher, 2013
 - H.D. Young, R.A. Freedman, F.W. Sears, and M.W. Zemansky. *Sears e Zemansky física I: mecânica*
 - M. Alonso and E.J. Finn. *Física: Um curso universitário - Mecânica*. Editora Blucher, 2018
 - R.P. Feynman, R.B. Leighton, and M.L. Sands. *Lições de Física de Feynman*. Bookman, 2008