x_1 e x_2

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$2x^2 - 5x + 0 = 0$$

$$3x - 4x^2 + 2 = 5x + 8$$

$$-4x^2 - 2x - 6 = 0$$

1.1.2 Função do 2º grau

Definição 1.11 Função do 2º grau. A função:

$$f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto y = ax^2 + bx + c \end{cases}$$

com $a, b, c \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$ é denominada função do 2º grau ou quadrática.

$f(x) = \dots$

$f(x) = ax^2 + bx + c$
 → pontos que tocam o eixo x, ou seja, onde $y = 0$

i. As raízes da função podem ser obtidas pela equação de Báskara:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{em que} \quad \Delta = b^2 - 4ac \quad (1.3)$$

ii. As relações de Girard para as raízes dessa função são:

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad \text{e} \quad P = x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

iii. Se na equação (1.3), $\Delta < 0$, então a função não terá raízes reais;

iv. O gráfico de uma função do 2º grau é uma parábola com eixo de simetria paralelo ao eixo Oy ;

v. A concavidade da parábola é determinada pelo sinal da constante a , se $a > 0$ a parábola tem concavidade para cima e se $a < 0$ tem concavidade para baixo;

vi. As coordenadas do vértice da parábola são $(x_V = -\frac{b}{2a}, y_V = -\frac{\Delta}{4a})$;

vii. Se $a > 0$, o conjunto imagem da função quadrática é $I = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq y_V\}$, porém se $a < 0$, o conjunto imagem será $I = \{y \in \mathbb{R} \mid y \leq y_V\}$.

	$a > 0$	$a < 0$
$\Delta = 0$
$\Delta > 0$

$$y = ax^2 + bx + c$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Resumindo temos,

a → concavidade
 Δ → nº de raízes

Figura 1.6: Posições relativas da parábola em função de a e Δ .

$$y = ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f$$

até 5 raízes
 4 vértices

Exemplo 1.13 Dada a função $y = x^2 - 3x - 10$, pede-se: domínio, conjunto imagem, vértice da parábola, eixo de simetria, esboço do gráfico e estudo da monotonicidade em $\mathbb{R}$.

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

interceptos:

$x = 0$
 $\hookrightarrow y = -10$
 $y = 0$
 $\hookrightarrow x = -2$
 $x = 5$

$y = 0$ interceptos $\rightarrow$ eixo x
 $x = 0$ interceptos $\rightarrow$ eixo y

$n = 1$

$$y=0$$

$$x^2 - 3x - 10 = 0$$

$a=1$
 $b=-3$
 $c=-10$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 9 - 4 \cdot 1 \cdot (-10)$$

$$\Delta = 9 + 40$$

$$\Delta = 49$$

$$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{49}}{2}$$

$$x = \frac{3 \pm 7}{2}$$

$\nearrow x_1 = -2$
 $\searrow x_2 = 5$

$$x_v = \frac{-b}{2a} = \frac{+3}{2} = 1,5$$

$$y_v = \frac{-\Delta}{4a} = \frac{-49}{4} \approx -12,3$$

$x = -1$
 $y = -6$

$x = 4$
 $y = -6$

$\text{Im}(f) = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq -49/4\}$

vértice: $(3/2, -49/4)$

eixo de simetria: $x = 3/2$

-monotonicidade: $\forall x < 3/2$ $f(x)$ é decrescente
 $\forall x > 3/2$ $f(x)$ é crescente

1.1.3 Função modular

Definição 1.12 Módulo ou valor absoluto. Seja x um número real, $x \in \mathbb{R}$, o módulo ou valor absoluto de x , denotado por $|x|$, é:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0; \\ -x & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Propriedades do módulo:

a. $|x + y| \leq |x| + |y|, x, y \in \mathbb{R}.$

$x = 3$
 $y = +2$

$|x+y| = |3+2| = 5$
 $|x| = 3$
 $|y| = 2$
 $|x| + |y| = 3 + 2 = 5$

$f(x) = |x|$
 $f(x) = |x-2|$
 $f(x) = |x+3|$

- a. $|x + y| \leq |x| + |y|, x, y \in \mathbb{R}.$
- b. $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|, x, y \in \mathbb{R}.$
- c. $|x| < k \Leftrightarrow -k < x < +k.$
- d. $|x| > k \Leftrightarrow x > k \text{ ou } x < -k.$

Definição 1.13 Função modular. Considerando uma função real qualquer $f(x)$, se $g(x) = |x|$, a função composta $g \circ f(x) = g(f(x)) = |f(x)|$ é uma função modular. Assim, $h(x) = g \circ f(x) = |f(x)|$ é definida por duas sentenças:

$$h(x) = g \circ f(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se } f(x) \geq 0; \\ -f(x) & \text{se } f(x) < 0. \end{cases}$$

Exemplo 1.16 Sejam as funções $f(x) = x - 2$ e $g(x) = |x|$. Construa os gráficos, especifique o domínio e o conjunto imagem de cada uma das funções: $g \circ f(x)$ e $f \circ g(x)$.

$f(x) = x - 2$ $g(x) = |x|$
 $g \circ f(x) = g(f(x)) = |x - 2| \Rightarrow \begin{cases} x - 2, & \text{se } x - 2 \geq 0 \\ -(x - 2), & \text{se } x - 2 < 0 \end{cases}$

$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$
 $\text{Im}(f) = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 0\}$

$x > 2$
 $y = x - 2$
 $x = 2 \Rightarrow y = 0$
 $x = 3 \Rightarrow y = 1$

$x < 2$
 $y = -x + 2$
 $x = 1 \Rightarrow y = 1$
 $x = 2 \Rightarrow y = 0$

$f \circ g(x) = f(g(x)) = |x| - 2 \Rightarrow \begin{cases} x - 2, & \text{se } x \geq 0 \\ -x - 2, & \text{se } x < 0 \end{cases}$

$y = x - 2$
 $\begin{cases} x = 0 \\ y = -2 \end{cases}$
 $\begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \end{cases}$
 $y = -x - 2$
 $\begin{cases} x = 0 \\ y = -2 \end{cases}$
 $\begin{cases} x = -1 \\ y = -1 \end{cases}$

1.1.5 Função exponencial

$$y = 5^x$$

A função exponencial tem aplicações em problemas de crescimento e dinâmica. Apresenta-se a seguir alguns pré-requisitos.

Definição 1.14 Propriedades de potências. Para as potências do tipo a^n ou a^m , com $a > 0$ e $m, n \in \mathbb{N}$, valem as propriedades:

i. $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \dots a}_{n \text{ vezes}}$

ii. $a^0 = 1$

iii. $a^1 = a$

iv. $a^n a^m = a^{m+n}$

v. $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$

vi. $(a^n)^m = a^{nm}$

vii. $a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n}$

Definição 1.15 Equação exponencial. Uma equação em que a variável x figura no expoente é denominada equação exponencial. Com base nas propriedades das potências, podemos reduzir uma equação exponencial em:

i. Potências de mesma base

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x)$$

$$2^x = 2^3 \Rightarrow x = 3$$

ii. Potências de mesmo expoente

$$a^{f(x)} = b^{f(x)} \Leftrightarrow a = b$$

com $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$ e $b \neq 1$.

Exemplo 1.17 Resolver em $\mathbb{R}$ as equações exponenciais:

a. $3^x = 81$

$$\Rightarrow 3^x = 9^2$$
$$3^x = (3^2)^2$$
$$3^x = 3^4$$

$x = 4$

$$3^x = 3$$

$$x = 4$$

b. $5^{2x^2-3x-2} = 1$

$$5^{2x^2-3x-2} = 5^0 \Rightarrow 2x^2 - 3x - 2 = 0$$

$$\Delta = 9 - 4 \cdot 2 \cdot (-2)$$

$$\Delta = 9 + 16$$

$$\Delta = 25$$

$$x = \frac{3 \pm 5}{4} \rightarrow \begin{cases} x_1 = -\frac{1}{2} \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

$$x = -\frac{1}{2} \text{ e } x = 2$$

c. $2^{2x} + 2^{x+1} = 80$

$$(2^x)^2 + 2^x \cdot 2^1 - 80 = 0$$

$$y^2 + 2y - 80 = 0$$

$$\begin{cases} 2^x = 8 \\ 2^x = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x = 3$$

$$\Delta = 4 - 4 \cdot 1 \cdot (-80)$$

$$\Delta = 4 + 320$$

$$\Delta = 324$$

$$y = \frac{-2 \pm 18}{2}$$

$$\begin{cases} y_1 = -10 \\ y_2 = 8 \end{cases}$$

não racionais

porque $2^x > 0$

$$\begin{cases} 2^x = 8 \\ 2^x = 2 \end{cases}$$

Definição 1.16 Função exponencial. Denomina-se função exponencial de base b ($b > 0$ e $b \neq 1$) à função:

$$f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto y = b^x \end{cases}$$

$$b > 1 \Rightarrow f(x) = 2^x$$

Observações:

- A restrição $b > 0$ e $b \neq 1$ se faz necessária para garantir a existência da função;
- Se $b > 1$ a função exponencial (1.16) é estritamente crescente em $\mathbb{R}$, porém, se $0 < b < 1$ a função exponencial (1.16) é estritamente decrescente em $\mathbb{R}$;
- Se $0 < b < 1$, pode-se efetuar uma mudança de base, fazendo o expoente negativo, por exemplo, $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}$. Assim as condições $b > 0$ e $b \neq 1$ de existência da função exponencial (1.16) podem ser simplificadas pela condição única $b > 1$;
- Se considerarmos uma restrição no contradomínio da função (1.16), fazendo-o igual a $\mathbb{R}_+$, a função torna-se bijetora e, portanto, admite inversa.

$$\begin{aligned} 2^{-1} &= \frac{1}{2} \\ 2^{-2} &= \frac{1}{2^2} \\ 2^{-a} &= \frac{1}{2^a} \end{aligned}$$

igual a $\mathbb{R}_+$, a função torna-se bijetora e, portanto, admite inversa.

$0 < b < 1 \Rightarrow f(x) = \left(\frac{1}{a}\right)^x$
 $a \rightarrow \frac{1}{a} \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^x = \left(\frac{2}{1}\right)^{-x}$

Figura 1.7: Gráficos das funções exponenciais $y = 2^x$ e $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.

Exemplo 1.18 Considere as funções: $y = 2^x$, $y = 4^x$ e $y = 2 \cdot 2^x$. Os gráficos dessas funções são apresentados, a seguir.

$y = (2^2)^x = 2^{2x}$

Observa-se pela Figura (1.8) que o efeito da constante 2 no expoente é o de contrair a curva exponencial à metade da distância do eixo Oy .

Figura 1.8: Gráficos das funções exponenciais $y = 2^x$ e $y = 4^x = 2^{2x}$.

Observa-se pela Figura (1.9) que o efeito da constante 2, que pré-multiplica 2^x é o de estender verticalmente a curva exponencial.

Figura 1.9: Gráficos das funções exponenciais $y = 2^x$ e $y = 2.2^x$.