Técnicas para o estudo da neurotransmissão

Técnicas para o estudo da neurotransmissão

- Estratégias:
 - **Detecção direta do neurotransmissor**
 - Neuroquímica
 - Eletroquímica
 - **Detecção indireta do neurotransmissor**
 - Efeito biológico pós-sináptico (o receptor como detector)
 - Efeito sobre um órgão alvo
 - Correntes e potenciais pós-sinápticos
 - **Detecção direta da exocitose**
 - Correntes de membrana
 - Medidas elétricas de capacitância

Medida indireta: contração muscular

- **Músculo liso ou esquelético**
 - Preparação comum: Íleo de cobaia
 - Liberação pelo plexo mientérico
 - **Músculo esquelético**
 - Estimulação do nervo motor
 - Contração muscular ~ liberação de transmissor; calibração com padrões conhecidos de transmissor
 - Uso de antagonistas de receptores pós-sinápticos é essencial para caracterizar a contração como produto da liberação de neurotransmissores
- **Alterações do batimento cardíaco e outras funções autonômicas**
 - Experimentos pioneiros de Otto Loewi

Aparato para estudar a contração do músculo liso (íleo de cobraia)

Aparato para estudar a contração do músculo liso (íleo de cobaia)

https://www.slideshare.net/OsamaAlZahrani5/pharmacology-practical-effect-of-cholinergic-drugs-on-isolated-rabbit-jejunum-drug-amp-drug-response-relationship?from_action=save

Agonist drug (Acetylcholine)

Antagonist drug (Atropine)

https://www.slideshare.net/OsamaAlZahrani5/pharmacology-practical-effect-of-cholinergic-drugs-on-isolated-rabbit-jejunum-drug-amp-drug-response-relationship?from_action=save

Neuroquímica

- **Preparações *in vitro*:**
 - Fatias ou prismas de tecido cerebral
 - *Prática e fácil porém grosseira*
 - Células em cultura
 - *Cara, precisa de um ensaio sensível*
 - Sinaptossomas
 - *Muito usada, isola o elemento pré-sináptico por isso ideal para estudar mecanismos pré-sinápticos. Não leva em consideração o lado pós. Não leva em consideração o resto do neurônio*
- **Preparações *in vivo*:**
 - Perfusão de gânglios periféricos
 - Gânglio cervical superior
 - Microdiálise
 - *Boas por se tratarem de preps in vivo, mas muito trabalhosas*
 - *Em todas essas preparações o neurotransmissor é medido no sobrenadante do meio de incubação*

Neuroquímica – detecção por radioisótopos

Neuroquímica

- HPLC
 - Para aminoácidos
 - Pouco usado. Mais usado para microdiálise *in vivo*.
- Radioimunoensaio
 - Para peptídeos
- Ensaio luminométrico para acetilcolina e ATP.
 - Reações de oxiredução que culminam na transferência de elétrons, gerando luz. Compara-se a resposta gerada pela amostra com padrões
 - ATP: reação da Luciferina/luciferase
 - Faz-se medidas em tempo real em sinaptosomas ou tecido nervoso
 - Acetilcolina: reação do luminol
 - Faz-se em sobrenadantes
 - *Método de alta sensibilidade, mas caro e muito sensível a impurezas*

Ensaio luminométrico

- Ensaio luminométrico para ATP.

Fig. 1. Trace recording of the continuous release of ATP from rat brain cortical synaptosomes depolarized with 33 mM KCl. Results of a typical experiment are shown. (1) 33 mM KCl depolarization in the absence of calcium (EGTA 1 mM); (2) 33 mM KCl depolarization in the presence of calcium (2.5 mM); (3) ATP standard (5 pmol); (4) ATP standard (10 pmol); (5) ATP standard (20 pmol).

Visualização em tempo real de ATP sendo liberado em um gânglio nervoso de molusco

Ensaio luminométrico

- Fluorimetria para glutamato
 - Extremamente sensível, mede em tempo real a liberação de glutamato.
 - Baseia-se medição da fluorescência do NAPH produzido pela oxidação descarboxilativa do glutamato pela glutamato desidrogenase.
 - Após o expto. faz-se uma curva de calibração adicionando L-glutamato

Eletrofisiologia

- Eletrofisiológicas
 - Neurotransmissão na junção neuromuscular
 - Medidas de potenciais miniaturas e potenciais de placa motora

BERNARD KATZ E A NEUROTRANSMISSÃO QUANTAL NA JUNÇÃO NEUROMUSCULAR DA RÃ

Técnicas para o estudo da neurotransmissão

- Eletrofisiológicas
 - Neurotransmissão em fatias de sistema nervoso central

Fatias

O rig ou set-up

O rig ou set-up

Registro eletrofisiológico

Visualização dos neurônios por IR-DIC

Eletrofisiologia

- Registros extracelulares (potenciais de campo)
 - Atividade de diversos *inputs*.
- Técnicas eletrofisiológicas de “single-cell”
 - Registros em neurônios em fatias de sistema nervoso central
 - *Voltage-clamp* (correntes a potencial fixo) double-electrode
 - *Current clamp* (potenciais) - “sharp-electrode” - empalamento
 - *Patch-clamp* (voltage e current-clamp)
 - Registro de eventos evocados (estimulação dos axônios pré-sinápticos) e espontâneos
 - Registros em neurônios em cultura primária
 - *Patch-clamp* (voltage e current-clamp).
 - Registro de eventos sinápticos espontâneos
 - Registro de eventos sinápticos evocados

Registros em fatias do hipocampo

Registros extracelulares

A técnica de *patch clamp*

Neurônios em cultura

Neurônios em “fatias”

Voltage clamp = Mantém o potencial de membrana constante.

Corrente de sódio

Correntes **positivas** = corrente de **saída** = saída de cátions ou entrada de ânions = **hiperpolarização** da membrana
Correntes **negativas** = corrente de **entrada** = entrada de cátions ou saída de ânions = **despolarização** da membrana

Current clamp = o potencial da membrana varia livremente com a passagem de corrente.

Registros intracelulares

Técnicas para o estudo da neurotransmissão

- Eletrofisiológicas

- Técnicas eletrofisiológicas de “single-cell” - **whole-cell patch-clamp**

- Registros em neurônios centrais

- Whole-cell Patch-clamp (voltage-clamp)

- Registro de eventos espontâneos (1) e evocados (2)

Sinapses pouco convencionais

- sinapses muito maiores do que as convencionais são modelos importantes da investigação da fisiologia pré-sináptica.

A junção neuromuscular foi uma das primeiras sinases a serem estudadas

- Cada fibra recebe um terminal. Cada terminal possui diversos sítios de liberação vesicular
- O registro da neurotransmissão é feito na fibra muscular, por impalamento, um método fácil levando-se em conta a robustez da fibra muscular

Potenciais miniatura da placa motora ajudaram a entender os mecanismos de liberação de neurotransmissores

Sinapse gigante da lula (gânglio estelado)

Registros simultâneos pré e pós sinápticos revelaram a dependência de cálcio na neurotransmissão

Sinapse gigante da lula (gânglio estelado)

O Terminal gigante dos neurônios bipolares da retina do peixe permitiram os primeiros registros diretos de exo e endocitose por medidas de capacitância

O Cálice de Held é uma sinapse gigante central que tem ajudado a entender os mecanismos de excitação central

Nature Reviews | Neuroscience

The calyx of Held

Held, H. (1893). Die zentrale Gehörleitung. Arch. Anat. u. Physiol. 17, 201-248.

A “redescoberta” do cálice de Held

The binaural auditory pathway: excitatory amino acid receptors mediate dual timecourse excitatory postsynaptic currents in the rat medial nucleus of the trapezoid body

IAN D. FORSYTHE AND MARGARET BARNES-DAVIES

Ion Channel Group, Department of Physiology, University of Leicester, P.O. Box 138, Leicester LE1 9HN, U.K.

Proc. R. Soc. Lond. B (1993) **251**, 151–157

Printed in Great Britain

MS 3419, pp. 381–387

Journal of Physiology (1994), **479.3**

Direct patch recording from identified presynaptic terminals mediating glutamatergic EPSCs in the rat CNS, *in vitro*

Ian D. Forsythe

*Ion Channel Group, Department of Cell Physiology and Pharmacology,
University of Leicester, PO Box 138, Leicester LE1 9HN, UK*

The calyx of Held

vonGersdorff & Borst, 2002

The Calyx of Held

- a) IR-DIC image
- b) Lucifer yellow filling
- c) Anti-SV2 staining

The calycel terminal is big enough to allow electrophysiological recording

O Número de publicações sobre o cálice de Held tem aumentado vertiginosamente desde sua “redescoberta”

OPTOGENÉTICA

Karl Deisseroth

Opsinas provenientes de algas ou bactérias controladas por luz

Illumination evokes photocurrents in ChR2-positive cortical neurons.

H. Wang et al. PNAS 2007;104:8143-8148

Optogenetic dissection of neuronal circuits in zebrafish using viral gene transfer and the Tet system

Peixin Zhu¹, Yuichi Narita¹, Sebastian T. Bundschuh¹, Otto Fajardo¹, Yan-Ping Zhang Schärer¹, Bidisha Chattopadhyaya^{1*}, Estelle Arm Bouldoires¹, Anna Ewa Stepien^{1,2}, Karl Deisseroth³, Silvia Arber^{1,2}, Rolf Sprengel⁴, Filippo M. Rijli¹ and Rainer W. Friedrich^{1*}

¹ Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research, Novartis Research Foundation, Basel, Switzerland

² Biozentrum, Department of Cell Biology, University of Basel, Basel, Switzerland

³ Department of Bioengineering, Stanford University, Stanford, CA, USA

⁴ Max Planck Institute for Medical Research, Heidelberg, Germany

Estimulação com luz azul resulta em correntes sinápticas evocadas em fatias de hipocampo de animais transfectados com Chr2

Projeções de células do *hilus* do giro dentado transfectadas com o hSyn-ChR2-GFP. A e B Nossos resultados preliminares mostram a expressão da GFP em corpos celulares e dendritos. C. Corrente sináptica excitatória evocada por um pulso de luz azul com duração de 10 ms, registrada em neurônio piramidal da região da CA1, em fatias hipocâmpais, usando-se *whole-cell patch-clamp*. Neste experimento foi utilizada uma fonte de LED, 488nm, com 20-30% da potência total.

A micoinjeção em áreas específicas de virus (AAV ou lentivirus) contendo plasmídeos que expressam Chr2 ligadas a promotores específicos, permite a estimulação de vias específicas neurais

Experimentos de optogenética *in vivo*

Halorodopsina (canal de Cl^-) e archrodopsina (bomba extrudora de H^+) produzem hiperpolarização da membrana e consequente inibição neuronal

GCamp6 é uma proteína engenheirada para ser sensora de cálcio

ARTICLE

doi:10.1038/nature12354

Ultrasensitive fluorescent proteins for imaging neuronal activity

Tsai-Wen Chen¹, Trevor J. Wardill^{1†}, Yi Sun¹, Stefan R. Pulver¹, Sabine L. Renninger², Amy Baohan^{1,3}, Eric R. Schreiter¹, Rex A. Kerr¹, Michael B. Orger², Vivek Jayaraman¹, Loren L. Looger¹, Karel Svoboda¹ & Douglas S. Kim¹

Detecção da exocitose por corantes FM₁

Bill Betz

- FM1-43. We have developed and characterized fluorescent dyes that stain the membranes of recycled synaptic vesicles. The best dye is **FM1-43**, which was synthesized by Dr. Fei Mao of Molecular Probes, Inc. Three properties make FM dyes useful for studying exocytosis, endocytosis, and endosomal trafficking:
 - The dyes partition reversibly in membranes
 - The dyes do not 'flip flop' and so are never free in the cytoplasm
 - The dyes are far more fluorescent in membranes than in water (From Bill Betz Web page))

FM1-43

D

Dye name	Hydrophobic tail	Double bonds
FM 1-84		1
FM 2-10		1
FM 4-64		3

FM1-43

Junção neuromuscular

FM1-43

A fotoconversão do FM1-43 promove a sua fixação

SYNAPTO-PHLUORIN

Proteína derivada da GFP que fluoresce em meio alcalino.

Mede excitose já que só fluoresce quando o interior da vesícula entra em contato com o meio extracelular, já que o interior da vesícula é ácido

Rest $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ Stim $\rightarrow$ 2,3 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ Recovery

synaptopHluorina expressa no bulbo olfatório de camundongo

DETECÇÃO DA EXOCITOSE POR MEDIDAS DE CAPACITÂNCIA DA MEMBRANA-REFLETE UM AUMENTO DA ÁREA (EXOCITOSE)

Medidas de capacitância da membrana refletem um aumento da área (exocitose)
Usa-se terminais gigantes ou células neuroendócrinas

Terminais gigantes do neurônio bipolar da retina de peixe

Medidas de exocitose no terminal gigante cálice de Held

Medidas pré e pós-sinápticas simultâneas

Correlação direta da exocitose com correntes pós-sinápticas

Sun JY, Wu LG. Fast kinetics of exocytosis revealed by simultaneous measurements of presynaptic capacitance and postsynaptic currents at a central synapse. *Neuron* 2001; 30: 171-182.

Medidas de exocitose no terminal gigante cálice de Held

Brazilian Journal of Medical and Biological Research (2009) 42: 94-104
ISSN 0100-879X

Synaptic vesicle pool size, release probability and synaptic depression are sensitive to Ca^{2+} buffering capacity in the developing rat calyx of Held

R.M. Leão^{1,2} and H. von Gersdorff²

Detecção de catecolaminas por amperometria

Detecção de catecolaminas por amperometria e capacitância simultaneamente

Albillos et al., Nature 389 (1997)