

ANALGÉSICOS



ANTIPIRÉTICOS



No pós-operatório a dor mais severa ocorre nas primeiras 12h.



O edema em geral atinge o seu pico decorridas 36h da intervenção.



A terapêutica analgésica deve ser mantida por um período máximo de 48h pós-operatória.

ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

→ Não narcóticos ou não entorpecentes

Principais grupos:

SALICILATOS

PARAMINOFENOL

PIRAZOLÔNICOS

SALICILATOS

- Grupo mais utilizado mundialmente.
- Toxicidade relativamente baixa.
- Ação rápida (30 minutos).
- Absorção facilitada por substâncias alcalinas.



CONTRA INDICAÇÕES

- **Úlcera gástrica ou duodenal**
- **Pacientes com dificuldade de coagulação**
- **Reação alérgica**
- **História pregressa de asma**



PARACETAMOL

- Baixa toxicidade.
- Grupo mais seguro para gestante e criança.
- Ação analgésica mais eficaz que os salicilatos.
- Praticamente não apresenta contra indicações.





Tylenol®

Adulto: 1 compr. de 500 mg de 6/6 h

Criança: 10 a 15 mg/Kg de 6/6 h



Prof. Dr. Antonio Miranda da Cruz Filho
CROSP: 34.512
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto



P/

Via Oral

Paracetamol (500 mg) ————— 08 compr.

Tomar 1 compr. de 6/6h durante 2 dias.



Ribeirão Preto, 15 de agosto de 2017

Av. do Café, s/n – Monte Alegre – Ribeirão Preto – SP
Fone (16) 3315-4023 – email: cruz@usp.br

PIRAZOLÔNICOS

DIPIRONA

São os mais ativos analgésicos e antipiréticos conhecidos

Novalgina®



Adulto: 1 ampola de 2 mL de 8/8h (IM)

1 compr. de 500 mg de 6/6h

30-40 gotas de 6/6h

Criança: 10mg/Kg de 6/6h



***Qual analgésico
usar para dores de
baixa e média
intensidade?***



1º ESCOLHA

Analgésico mais eficiente do grupo dos não narcóticos não entorpecentes

ANALGÉSICO



DIPIRONA SÓDICA



Prof. Dr. Antonio Miranda da Cruz Filho
CROSP: 34.512
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto



P/

Via Oral

Dipirona sódica (500 mg/ml) ——— 1 frasco

Tomar 35 gotas de 6/6h durante 2 dias.



Ribeirão Preto, 14 de setembro de 2020

Av. do Café, s/n – Monte Alegre – Ribeirão Preto – SP
Fone (16) 3315-4023 – email: cruz@usp.br

E quando a dor não cessar com Dipirona?



Utilizar um analgésico da classe
anti-inflamatórios não hormonais

ANTI-INFLAMATÓRIOS



CETOROLACO 10 mg



Toragesic®

Compr. sub lingual (8/8 h)



NIMESULIDA 100 mg



Compr. (12/12 h)

Anti-inflamatórios disponíveis no SUS

DICLOFENACO SÓDICO

Compr. (50 mg) de 8/8h por 3 dias

Compr. (100 mg) 1 ao dia por 3 dias

2 ampolas (75 mg), aplicar 1 ao dia (24/24h)



DICLOFENACO POTÁSSICO

Compr. (50 mg) de 8/8h por 3 dias



Prof. Dr. Antonio Miranda da Cruz Filho
CROSP: 34.512
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto



P/

Via Oral

Diclofenaco potássico (50 mg) — 9 comp.

Tomar 1 compr. de 8/8h durante 3 dias.



Ribeirão Preto, 14 de setembro de 2020

Av. do Café, s/n – Monte Alegre – Ribeirão Preto – SP
Fone (16) 3315-4023 – email: cruz@usp.br

Prof. Dr. Antonio Miranda da Cruz Filho
CROSP: 34.512
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto



P/

Uso externo

Diclofenaco sódico (75 mg) —^{IM}— 2 amp.

Aplicar 1 ampola a cada 24 horas.



Ribeirão Preto, 14 de setembro de 2020

Av. do Café, s/n – Monte Alegre – Ribeirão Preto – SP
Fone (16) 3315-4023 – email: cruz@usp.br

CONTRA INDICAÇÕES

- **Úlcera gástrica ou duodenal**
- **Pacientes com dificuldade de coagulação**
- **Hipertenso**
- **Hipersens**
- **Gestante**



CONTRA INDICAÇÕES

- Úlcera gástrica ou duodenal
- Pacientes com dificuldade de coagulação



Atravessa a barreira placentária

Fechamento do ducto arterioso do feto

Diminui agregação plaquetária

Efeito teratogênico

• Hip

• Hip
• Ges

• Ges



HIPERTENSÃO



**BMJ. 2011; 342: c7086. Published online 2011 January 11. Trelle et al 2011
Cardiovascular safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs: network meta-analysis**

- ***Avaliação de 31 estudos diferentes num total de 116.429 pacientes***
- ***Todos os AINES são capazes de elevar a PA em 10-17% dos casos.***

Justificativa:

Prostaglandinas promovem a vasodilatação

Vasodilatação ocorre também nos vasos sanguíneos renais facilitando o processo de filtração glomerular.

- ***O Naproxeno apresentou o menor efeito hipertensor.***

HIPERTENSÃO



Naproxeno

Flanax (compr. 275 mg)



Adulto: 2 compr. iniciais de 275 mg seguido 1 compr. a cada 8 horas.

Naprosyn (compr. 500 mg)



Adultos: 1 compr. (500 mg) de 12 em 12 horas

Prof. Dr. Antonio Miranda da Cruz Filho
CROSP: 34.512
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto



P/

Via Oral

Naproxeno (500 mg) ————— 6 comp.

Tomar 1 compr. de 12/12h durante 3 dias.



Ribeirão Preto, 14 de setembro de 2020

Av. do Café, s/n – Monte Alegre – Ribeirão Preto – SP
Fone (16) 3315-4023 – email: cruz@usp.br

PACIENTES COM PROBLEMAS GÁSTRICOS



Coxibs Etoricoxib

Arcoxia®

Comprimidos:

60 e 90 mg, 1 X ao dia

Máximo de 3 dias



Coxibs Celecoxib



Celebra[®]

(cáps. de 100 e 200mg)

Administrar: 1 cápsula de 100 mg de 12/12h ou 200 mg de 24/24h.

Prof. Dr. Antonio Miranda da Cruz Filho
CROSP: 34.512
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto



P/

Via Oral

Celecoxib (200 mg) ————— 3 cápsulas

Tomar 1 cáps. uma vez ao dia por 3 dias.



Ribeirão Preto, 14 de setembro de 2020

Av. do Café, s/n – Monte Alegre – Ribeirão Preto – SP
Fone (16) 3315-4023 – email: cruz@usp.br