Observação: Todos os itens da prova devem apresentar solução. Os que apresentarem apenas as respostas NÃO serão corrigidos.

DURAÇÃO: 10:30h as 13:30h

1) Um gás ideal com N moléculas idênticas e independentes está confinado em um recipiente com dois lados de comprimento L e altura de comprimento desprezível. Assim, as moléculas só apresentam movimento translacional nas direções x e y , e movimento rotacional em torno do eixo z , ou seja, no plano xy . A energia cinética de cada molécula é descrita por $E_i = (1/2) m (v_x^2 + v_y^2) + (1/2) I w^2$, onde m é a massa, I é o momento de inércia, v_x e v_y são as componentes da velocidade linear que variam de $-\infty$ a $+\infty$ e w é a componente z da velocidade angular que também varia de $-\infty$ a $+\infty$; e as componentes x e y da posição variam de 0 a L . Este sistema tem uma distribuição de probabilidades escrita por $dp(v,w) = f(v)dv f(w)dw$. Determine:

(a) (0,5) as duas funções de densidade de probabilidade $f(v)$ e $f(w)$, apresente de forma qualitativa os dois gráficos destas funções e compare o $f(v)dv$ com a distribuição de velocidades de Maxwell do gás ideal num recipiente 3D e discuta as semelhanças e diferenças;

(b) (0,5) os valores médios, $\langle v \rangle$ e $\langle w \rangle$, e os valores quadrático médios (rapidez), v_{qm} e w_{qm} ; e

(c) (0,5) a função de partição por molécula, z , e de todo o sistema Z , em função de β .

Sabendo que várias propriedades podem ser obtidas através da função de partição: a energia total média $\langle E \rangle = -\partial (\ln Z) / \partial \beta$, a energia livre de Helmholtz $F = -(1/\beta) \ln Z$, a pressão $P = -(\partial F / \partial A)_{T,N}$ onde A é a área do recipiente, etc. Determine:

(d) (0,5) a energia total média $\langle E \rangle$; Compare com a energia esperada pelo Teorema de Equipartição de Energia e justifique as semelhanças e diferenças;

(e) (0,5) a expressão para pressão P ; Compare com a equação de estado do gás ideal num recipiente 3D: $PV = NkT$ e discuta as semelhanças e diferenças.

Formulário:

$$G_n = \int_0^\infty x^n e^{-\alpha x^2} dx \Rightarrow G_{2i} = \frac{1 \cdot 3 \cdots (2i-1)}{2^{i+1}} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha^{2i+1}}} \quad e \quad G_{2i+1} = \frac{i!}{2\alpha^{i+1}}; \quad P(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\langle x \rangle)^2}{2\sigma^2}};$$

$$\sigma^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2; \quad x_{qm} = \sqrt{\langle x^2 \rangle}; \quad dx dy dz = 4\pi r^2 dr; \quad dx dy = 2\pi r dr;$$

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/2kT}; \quad \beta = (1/kT); \quad dp(\Gamma) = (1/Z) e^{-\beta E} d\Gamma; \quad Z = z^N;$$

$$z = \int \dots \int e^{-\beta E_i} d\Gamma_i; \quad \langle E \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} (\ln Z); \quad F = -\left(\frac{1}{\beta}\right) \ln Z; \quad P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N}; \quad S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N}.$$