

# MAT0134 - Introdução à Álgebra Linear

## Lista 3

2020

1. Determine uma base para cada subespaço  $W$  do espaço vetorial  $V$ . Determine  $\dim W$ .

(a)  $V = \mathbb{R}^3$  e  $W = \{(x, y, z) \in V \mid x + 2y + z = 0 \text{ e } x - y + 2z = 0\}$ .

(b)  $V = \mathbb{R}^4$  e  $W = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in V \mid AX = \mathbf{0}\}$ , onde  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$ ,  $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$  e  $\mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ .

(c)  $V = P_3(\mathbb{R})$  e  $W = \{p \in V \mid p(1) = 0\}$ .

(d)  $V = M_3(\mathbb{R})$  e  $W = \{A = (a_{ij}) \in V \mid a_{11} + a_{22} + a_{33} = 0\}$ .

(e)  $V = M_2(\mathbb{R})$ ,  $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$  e  $W = \{M \in V \mid AM = MA\}$ .

(f)  $V = M_2(\mathbb{R})$ , e  $S = \{M \in V \mid M^t = -M\}$ .

(g)  $V = \mathbb{R}^4$  e  $S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \mid x_4 = x_1 + x_2 \text{ e } x_3 = x_1 - x_2\}$ .

(h)  $V = \mathbb{R}^6$  e  $W = \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) \in \mathbb{R}^6 \mid x_2 = x_4 = x_6\}$ .

(i)  $V = M_3(\mathbb{R})$  e  $W$  é o subespaço das matrizes tais que a primeira linha é igual à terceira.

2. Determine uma base do subespaço do espaço vetorial  $V$  gerado pelo conjunto  $S$ .

(a)  $V = \mathbb{R}^4$ ;  $S = \{(1, 2, 1, 0), (1, 3, 1, 4), (2, 1, 0, 0), (2, 8, 4, 4)\}$ ;

(b)  $V = P_3(\mathbb{R})$ ;  $S = \{t^2 - 2t^3, 1 + t^2 + t^3, 2 + 3t^2, 3 + 4t^2 + t^3\}$ .

3. Verifique que os conjuntos dados são bases para os espaços  $V$ :

(a)  $\{(1, 1), (1, 3)\}$ ,  $V = \mathbb{R}^2$ .

(b)  $\{(1, 0, 1), (2, 1, -1), (3, 1, 5)\}$ ,  $V = \mathbb{R}^3$ .

(c)  $\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\}$ ,  $V = M_2(\mathbb{R})$ .

4. Encontre uma base e a dimensão do espaço solução do sistema linear.

$$(a) \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 + 3x_3 - 3x_4 = 0 \end{cases} \quad (b) \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 0 \\ 2x_1 + 6x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} x_1 + x_3 + x_5 = 0 \\ x_2 + x_3 + 2x_5 + x_6 = 0 \\ x_4 + 3x_5 = 0 \end{cases} \quad (d) \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 0 \\ 4x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$$

5. Ache uma base do espaço vetorial  $V$  contendo o conjunto  $S$ .

(a)  $V = M_2(\mathbb{R}); S = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \right\};$

(b)  $V = \mathbb{R}^5; S = \{(1, 1, 0, 2, 2), (2, 3, -1, 0, 1), (0, 2, 0, 1, 0)\}.$

6. Seja  $V$  um espaço vetorial sobre  $\mathbb{R}$ . **Verdadeiro** ou **Falso** ?

(a) Se  $A \subset B \subset V$  e  $B$  é LI então  $A$  é LI.

(b) Se  $A \subset B \subset V$  e  $A$  é LI então  $B$  é LI.

(c) Se  $\dim V = n$ , então  $V$  pode ter um conjunto gerador com  $n - 1$  vetores.

(d) Se  $\dim V = n$ , então  $V$  pode ter um conjunto LI com  $n + 1$  vetores.

(e) Se  $\dim V = n$ , então  $V$  pode ter um conjunto gerador com  $n + 1$  vetores.

7. Determine se as afirmações a seguir são **verdadeiras** ou **falsas**. **Justifique**. Prove a afirmação que for verdadeira e quando for falsa, explique a razão de ser falsa, através de um exemplo, se for esse o caso.

(a) Seja  $V$  um espaço vetorial sobre  $\mathbb{R}$ . Seja  $A = \{v_1, v_2, v_3, v_4\} \subset V$  tal que  $\{v_2, v_3, v_4\}$  é LI e  $A$  é LD. Então o vetor  $v_1$  pode ser escrito como combinação linear de  $v_2, v_3$  e  $v_4$ .

(b) Seja  $V$  um espaço vetorial sobre  $\mathbb{R}$ . Seja  $A = \{v_1, v_2, v_3\} \subset V$  tal que todos os subconjuntos de  $A$  com 2 elementos são LI. Então  $A$  é LI.

(c) Sejam  $V = \mathbb{R}^3$ ,  $S_1 = [(0, 1, 2), (1, 2, 3)]$  e  $S_2 = [(2, 3, 4), (0, 1, 2), (1, 1, 1)]$ . Então  $S_1 = S_2$ .

(d) O conjunto de polinômios  $A = \{1 + t, 1 + t^3, 1 + t^2 + t^3, 1 - t^2\}$  é uma base de  $P_3(\mathbb{R})$ .

8. Assinale **Verdadeiro** ou **Falso** quanto a validade da afirmação:

“Se  $A$  e  $B$  são subconjuntos LI de um espaço vetorial  $V$  então  $A \cup B$  é LI.”

(a) Sempre.

(b) Nunca.

(c) Se  $A$  e  $B$  são disjuntos.

(d) Se um deles está contido no outro.

(e) Se  $[A] \cap [B] = \{0\}$ .

(f) Se  $\dim[A] + \dim[B] = \dim V$ .

9. Seja  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ . Considere as linhas de  $A$  como vetores de  $\mathbb{R}^n$  e as colunas de  $A$  como vetores de  $\mathbb{R}^m$ . Mostre que a dimensão do subespaço de  $\mathbb{R}^n$  gerado pelas linhas de  $A$  é igual à dimensão do subespaço de  $\mathbb{R}^m$  gerado pelas colunas de  $A$ .