



Pitiríase Liquenóide

Bruna Prates Garcia
9820193
Farmacoterapia

Caso clínico



M.C.

Sexo masculino, 6 anos;

- × Sem antecedentes relevantes;
- Referenciada à Consulta de Dermatologia Pediátrica pelo aparecimento de uma erupção cutânea generalizada recorrente.
- Realizada Biópsia Cutânea

→ Diagnóstico de Pitiríase Liquenóide Crônica

Características gerais

Grupo de doenças inflamatórias de pele raras.

- ✕ Inclui Pitiríase Liquenóide Crônica, pitiríase liquenóide e varioliforme aguda (PLEVA) e a variante da doença febril ulceronecrótica Mucha-Habermann (FUMHD) de PLEVA.
- ✕ Afeta mais jovens adultos e crianças.
- Há indicativos de uma maior prevalência no sexo masculino.



Subtipos de Pitiríase Liquenóide

x Pitiríase Liquenóide Crônica

É caracterizado pelo desenvolvimento de múltiplas pápulas escamosas, eritematosas e marrons no tronco e nas extremidades.


x Pitiríase liquenóide e varioliforme aguda (PLEVA)

Se apresenta como erupção aguda de pápulas inflamatórias e papulovesículas que rapidamente desenvolvem crostas hemorrágicas ou necróticas.

Subtipos de Pitiríase Liquenóide

A doença ulceronecrótica febril de Mucha-Habermann (FUMHD)

É uma manifestação grave de PLEVA com potencial risco de vida. É acompanhada de febre alta persistente e pode se manifestar com cardiomiopatia, vasculite do sistema nervoso central, artrite, pneumonite intersticial, anormalidades hematológicas, dor abdominal, diarreia, sepse ou outros distúrbios.



Fisiopatologia


Teorias:

- x Respostas de hipersensibilidade a infecções

Se deu pelos relatos de ocorrência da doença durante infecções como *Toxoplasma gondii*, vírus Epstein-Barr, parvovírus B16, HIV, estafilococos e alguns tipos de estreptococcus.

- x Resposta a doença linfoproliferativa primária

Baseada em estudos que acharam células clonais TCD4+ em tecidos de pacientes.



Tratamento

1ª
linha

Corticóides tópicos

Antibióticos orais

Fototerapia

2ª
linha

Tacrolimo tópico

Metrotexato

1ª linha de tratamento



Corticóides tópicos

Melhora da inflamação e da formação de prurido associado.

Utiliza-se um corticóide de média intensidade.



Antibióticos orais

Utiliza-se antibióticos com propriedades anti-inflamatórias.

Pode-se utilizar tetraciclina, mas em crianças é utilizado apenas a eritromicina.

Fototerapia



- x Indicada para o tratamento de dermatoses inflamatórias;
- x Utiliza-se as radiações Ultravioleta B de banda estreita (NBUVB), UVB de banda larga e psoraleno mais ultravioleta A (PUVA).

Mecanismo de ação

- Diminui a produção de citocinas
- Induz a produção de Prostaglandina E pelos queratinócitos
- Altera a liberação de moléculas de adesão.

2ª linha de tratamento



Metrotexato

Imunossupressor
Antimetabólito de folato

Utiliza-se no tratamento de
PLEVA e doença
ulceronecrótica febril de
Mucha-Habermann (FUMHD)




Tacrolimo

Imunosupressor

Usado em casos
irresponsivos a terapia com
Corticóide, antibiótico oral e
fototerapia.

Caso clínico



Referências

Caso Clínico: http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0872-07542013000300011
https://www.uptodate.com/contents/pityriasis-lichenoides-chronica?search=pityriasis%20lichenoides&source=search_result&selectedTitle=2~15&usage_type=default&display_rank=2
https://www.uptodate.com/contents/pityriasis-lichenoides-et-varioliformis-acuta-pleva?search=pityriasis%20lichenoides&source=search_result&selectedTitle=1~15&usage_type=default&display_rank=1
https://www.uptodate.com/contents/uva1-phototherapy?search=pityriasis%20lichenoides&source=search_result&selectedTitle=8~15&usage_type=default&display_rank=8
https://www.uptodate.com/contents/erythromycin-systemic-drug-information?search=eritromicina&source=search_result&selectedTitle=1~4&usage_type=default&display_rank=1
https://www.uptodate.com/contents/methotrexate-drug-information?search=methotrexate&source=search_result&selectedTitle=1~148&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1#F194514
https://www.uptodate.com/contents/tacrolimus-topical-drug-information?search=tacrolimus&source=search_result&selectedTitle=1~145&usage_type=panel&display_rank=1#F9564194
https://www.uptodate.com/contents/topical-corticosteroids-use-and-adverse-effects?search=corticoide&source=search_result&selectedTitle=8~150&usage_type=default&display_rank=8
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/pdfs/DERMATITE_ATOPICA_ATUALIZACAO_EM.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-05962006000100010#:~:text=Fototerapia%20%C3%A9%20utilizada%20para%20tratar,com%20irradia%C3%A7%C3%A3o%20UVA%20ou%20UVB.