Conceitos Fundamentais da Física do Sistema Solar (MPA5004)

Enos Picazzio (IAGUSP)

<http://www.nasa.gov/vision/universe/stargalaxies/betapic.html>

FORMAÇÃO E ESTRUTURA DO SISTEMA SOLAR

NÃO HÁ PERMISSÃO DE USO PARCIAL OU TOTAL DESTE MATERIAL PARA OUTRAS FINALIDADES.

Kepler-62 System

Kepler-90 System Planet Sizes

(Artist's Concepts)

Kepler-47 System

Jupiter & Major Moons

TRAPPIST-1 System

O objetivo de uma teoria de origem do Sistema Solar

Como o Sistema Solar foi formado?

Uma teoria aceitável deve:

- basear-se em princípios físicos (conservação de energia, momentum, lei gravitacional, leis de movimentos...),
- explicar pelo menos a maioria dos fatos observáveis com precisão razoável,
- ser aplicável a outros sistemas planetários.

Como descobrir as respostas?

- **Observando:** buscar evidências
- **Conjeturando:** obter explicações
- **Testando:** verificar o sucesso das explicações
- **Aperfeiçoando:** repetir passos 2 e 3 até obter bons resultados.

Propriedades Dinâmicas e Físicas

Nota-se uma certa regularidade entre elas:

Os sentidos de revolução e de rotação dos planetas (exceto Vênus) coincidem com o sentido de rotação do Sol; “rotação direta”

As órbitas dos planetas (exceto Mercúrio) são quase circulares e coplanares à eclíptica;

As órbitas da maioria dos satélites também são quase circulares e coplanares com o plano do equador dos seus planetas;

As distâncias heliocêntricas dos planetas, assim como as distâncias orbitais dos satélites, seguem uma lei de espaçamento regular;

Juntos, os planetas apresentam momento angular muito maior que o do Sol; (quantidade de movimento angular = mvr ; massa, velocidade orbital, raio);

Há planetas com anéis no plano equatorial e rotação direta;

Os planetas apresentam composição química diferenciada;

Os cometas de períodos longos têm distribuição espacial quase isotrópica, ao contrário dos cometas de períodos curtos (próximos ao plano da eclíptica);

Adiante de Plutão (*planeta-anão*) há uma população de corpos pequenos com órbitas quase circulares (algumas são altamente excêntricas) e coplanares à eclíptica;

O Sistema Solar visto de fora

- Uma estrela (Sol) no centro
- Planetas rochosos (Mercúrio, Vênus, Terra, Marte) até 1,5 UA
- Cinturão de asteróides ~ 3 UA
- Planetas gasosos (Júpiter, Saturno, Netuno, Urano), ~ 5-40 UA
- Cinturão Kuiper e Região transnetuniana > 30 UA
- Nuvem de Oort > 1.000 UA

Dimensão “parcial” do Sistema Solar

Dimensão “parcial” do Sistema Solar

Dimensão “parcial” do Sistema Solar

Dimensão física do Sistema Solar

Nuvem de Oort
30.000 a 100.000 UA

Cinturão Edgeworht-Kuiper

Plutão

Comparativo

TABLE 6.1 Planetary Data*

Photo	Planet	Relative Size	Average Distance from Sun (AU)	Average Equatorial Radius (km)	Mass (Earth = 1)	Average Density (g/cm ³)	Orbital Period	Rotation Period	Axis Tilt	Average Surface (or Cloud Tops) Temperature [†]	Composition	Known Moons (2004)	Rings?
Mercury	•	0.387	2,440	0.055	5.43	87.9 days	58.6 days	0.0°	700 K (day) 100 K (night)	Rocks, metals	0	No
Venus	•	0.723	6,051	0.82	5.24	225 days	243 days	177.3°	740 K	Rocks, metals	0	No
Earth	•	1.00	6,378	1.00	5.52	1.00 year	23.93 hours	23.5°	290 K	Rocks, metals	1	No
Mars	•	1.52	3,397	0.11	3.93	1.88 years	24.6 hours	25.2°	240 K	Rocks, metals	2	No
Jupiter	●	5.20	71,492	318	1.33	11.9 years	9.93 hours	3.1°	125 K	H, He, hydrogen compounds [§]	61	Yes
Saturn	●	9.54	60,268	95.2	0.70	29.4 years	10.6 hours	26.7°	95 K	H, He, hydrogen compounds [§]	31	Yes
Uranus	●	19.2	25,559	14.5	1.32	83.8 years	17.2 hours	97.9°	60 K	H, He, hydrogen compounds [§]	24	Yes
Neptune	●	30.1	24,764	17.1	1.64	165 years	16.1 hours	29.6°	60 K	H, He, hydrogen compounds [§]	13	Yes
Pluto	•	39.5	1,160	0.0022	2.0	248 years	6.39 days	112.5°	40 K	Ices, rock	1	No

Comparativo

TABLE 6.1 Planetary Data*

Photo	Planet	Relative Size	Average Distance from Sun (AU)	Average Equatorial Radius (km)	Mass (Earth = 1)	Average Density (g/cm ³)	Orbital Period
Mercury	•	0.387	2,440	0.055	5.43	87.9 days
Venus	•	0.723	6,051	0.82	5.24	225 days
Earth	•	1.00	6,378	1.00	5.52	1.00 year
Mars	•	1.52	3,397	0.11	3.93	1.88 years
Jupiter	●	5.20	71,492	318	1.33	11.9 years 9.93 hours
Saturn	●	9.54	60,268	95.2	0.70	29.4 years 10.6 hours
Uranus	●	19.2	25,559	14.5	1.32	83.8 years 17.2 hours
Neptune	●	30.1	24,764	17.1	1.64	165 years 16.1 hours
Pluto	•	39.5	1,160	0.0022	2.0	248 years 6.39 days

Model of the Earth

Comparativo

TABLE 6.1 Planetary Data*

Photo	Planet	Relative Size	Average Distance from Sun (AU)	Average Equatorial Radius (km)	Mass (Earth = 1)	Average Density (g/cm ³)	Orbital Period	Rotation Period	Axis Tilt	Average Surface (or Cloud Tops) Temperature [†]	Composition	Known Moons (2004)	Rings?
Mercury	•	0.387	2,440	0.055	5.43	87.9 days	58.6 days	0.0°	700 K (day) 100 K (night)	Rocks, metals	0	No
Venus	•	0.723	6,051	0.82	5.24	225 days	243 days	177.3°	740 K	Rocks, metals	0	No
Earth	•	1.00	6,378	1.00	5.52	1.00 year	23.93 hours	23.5°	290 K	Rocks, metals	1	No
Mars	•	1.52	3,397	0.11	3.93	1.88 years	24.6 hours	25.2°	240 K	Rocks, metals	2	No
Jupiter	●	5.20	71,492	318	1.33	11.9 years	9.93 hours	3.1°	125 K	H, He, hydrogen compounds [§]	61	Yes
Saturn	●	9.54	60,268	95.2	0.70	29.4 years	10.6 hours	26.7°	95 K	H, He, hydrogen compounds [§]	31	Yes
Uranus	●	19.2	25,559	14.5	1.32	83.8 years	17.2 hours	97.9°	60 K	H, He, hydrogen compounds [§]	24	Yes
Neptune	●	30.1	24,764	17.1	1.64	165 years	16.1 hours	29.6°	60 K	H, He, hydrogen compounds [§]	13	Yes

O que explica estas diferenças?

Formação do Sistema Solar

Historicamente, há 5 hipóteses básicas:

Turbulência

Teoria Nebular (Antiga e Moderna)

Forças de Maré

Acreção

Fundamentos de Astronomia e Astrofísica

Formação do Sistema Solar COSMOGONIA

Prof. Tibério B. Vale

Várias teorias

Ao longo dos séculos foram desenvolvidos vários modelos para descrever o Sistema Solar. Os principais são:

- 1- Modelos baseados em turbulência;
- 2- Teoria Nebular (antiga);
- 3- Teoria de Forças de Maré;
- 4- Teorias de Acreção;
- 5- Teoria Nebular (moderna).

Modelos baseados em turbulência

René Descartes

- Proposto por Decartes (1596-1650)
 - Primeira pessoa a propor um modelo científico para a existência do sistema solar;
- Em 1644, Decartes propôs uma teoria onde o universo ~~é~~ então cheio de éter e matéria, era cheio de vórtices de todos os tamanhos.
- Apenas qualitativo;
- Não explica o plano da eclíptica;
- Abandonado após a descoberta das leis de Newton.

Teoria Nebular - Antiga

- Proposto por Kant & Laplace em 1755;
- O conceito primitivo de nebulosa, de onde o Sol e o sistema solar nasceram;
- De acordo com Laplace a nebulosa contrai-se sob a influência da gravidade e sua velocidade rotacional aumenta até que ela colapse em um disco.
- Subseqüentemente anéis de gás são ejetados e condensam em planetas e satélites.
- Este modelo explica todos os fenômenos observados durante o século XVIII.

Teoria Nebular - Antiga

- Vários problemas no Século XIX;
- É difícil explicar a acreção de um planeta a partir de um anel de planetóides;
- O momento angular do sistema solar deveria estar em sua maioria no Sol, mas não é isso que se observa.
- A maior parte do momento angular está nos planetas (Júpiter – 60% e Saturno – 25%);
- Como a maior parte da massa do sistema solar está no Sol (99.8%) o Sol deveria ter retido a maior parte do momento angular do Sistema Solar;

Teorias de Força de Maré

- O primeiro a propor uma teoria **catastrófica** foi Buffon (1707-1788);
- **Sugeriu que o sistema solar surgiu de uma ejeção de material do Sol, causado por uma colisão com um cometa;**
- Esta teoria que não tem base científica foi abandonada (na época não se conhecia o material dos cometas);
- **Como haviam muitos problemas nas teorias de nebulosas (século XIX);**

Teorias de Força de Maré - Revisitada

- Como haviam muitos problemas nas teorias de nebulosas (século XIX);
- Colisão entre o Sol e outra estrela e os planeta^s se formaram de material condensado perdido pelo Sol (evento raro);
- Segundo esta hipótese, no momento do encontro (ponto + próximo) um filamento do Sol foi arrancado e passou a circundar o Sol com momento angular alto;
- A condensação destes filamentos em grandes planetas é difícil de explicar.

Teorias de Força de Maré - Revisitada

- Na década de 30 surgiram modelos que sugerem que o Sol inicialmente fazia parte de um sistema binário e que os planetas se originaram da companheira;
- Na década de 60 Wolfson sugeriu que o encontro entre o Sol e uma proto-estrela e um filamento da proto-estrela condensou em planetas;
- Este tem a vantagem de levar em conta a composição química e isotrópica dos planetas vem de um meio frio e não de um filamento quente.

Mas não explica a semelhança na composição química do Sol e dos planetas (IAG)

Teorias de Acreção

- São divididas basicamente em dois grupos que consideram a possibilidade do Sol acretar material interestelar;

Necessidade de ter outra estrela próxima;

Este arranjo permite que o material interestelar condense em planetas (Ponto de Lagrange)

Segundo Arrhenius & Alfén.

- O Sol passou por duas nebulosas:
- Uma formada por grãos não voláteis (sólidos) – Planetas terrestres;
 - Outra formada por H – Planetas Gigantes

Teoria nebular moderna

Baseada na Teoria Original de Laplace – Sol e Planetas foram formados quase simultaneamente.

Gas pressure attempting to expand the cloud

Gravitational force attempting to collapse the cloud

Massa da nuvem primordial =
Massa de Jeans $> 10^5 M_{\text{sol}}$
A nuvem colapsa gravitacionalmente.

Força gravitacional x pressão

Teoria nebular moderna

A questão do momento angular é explicada pela perda de massa do Sol;

Uma estrela em rotação perde massa através do fluxo de partículas ao longo das linhas de força associadas ao centro de atividade magnética;

As partículas são transportadas a uma distância **a** muito maior que o raio **R** da estrela;

Uma pequena perda de massa é suficiente para levar o momento angular do Sol ao valor observado hoje ($a/R=10$ e $dM/dt = 0.003$)

$$L \sim \left(\frac{a}{R}\right)^2$$

Momento angular

Momento angular - quantidade de movimento associado a um objeto que executa um movimento de rotação em torno de um ponto fixo:

$$L = Q \cdot d \cdot \text{sen}\theta$$

L – momento angular;

Q – quantidade de movimento linear do corpo

$$(Q = m \cdot v)$$

v – velocidade

d – distância do corpo à origem do referencial (ponto fixo).

θ – ângulo entre a força e o braço de alavanca **d**.

Quando $\theta = 90^\circ$, $\text{sen } \theta = 1$, a equação se reduz a:

$$L = Q \cdot d = m \cdot v \cdot d \quad \Rightarrow \quad L = m \cdot v \cdot r$$

Mas $v = \omega \cdot r$ (ω - velocidade angular):

$$\text{Então } L = m \cdot \omega \cdot r^2 \text{ ou } L = I \cdot \omega$$

sendo **I** - momento de inércia

Momento angular total é a soma do momento angular do corpo em torno de seu próprio eixo e do corpo em torno de um eixo imaginário, situado no centro de massa do sistema.

Processo cíclico e a evolução química

Estrelas: do nascimento à morte

O tempo que uma estrela leva do nascimento à fase de geração de energia por fusão nuclear (Seqüência Principal) depende da massa.

Massa	Tipo espectral	Tempo para chegar à SP
30 M_{SOL}	O6	30.000 anos
10	B3	300.000
4	B8	1.000.000
2	A4	8.000.000
1 Sol	G2	30.000.000
0.5	K8	100.000.000
0.2	M5	1.000.000.000

Massa **Tempo de vida na SP** ($\approx 10^{10} / M^2$ anos)

60 M_{SOL}	2 milhões anos
30	5 milhões
10	25 milhões
3	350 milhões
1,5	1,6 bilhão
1 Sol	9 bilhões
0,1	Trilhões

Contração Nebular e a Formação dos Planetas

Sequência de formação do Sistema Solar, a partir do colapso da Nebulosa Solar Primordial.

O colapso induz rotação e provoca o achatamento.

No centro vai sendo formado o *Proto-Sol* (ainda não é uma estrela).

No seu plano equatorial forma-se um disco de matéria, dele surgirão planetas e demais corpos.

É nesse plano básico que se localiza a eclíptica. A quase totalidade dos corpos do Sistema Solar têm órbitas próximas a esse plano.

A rotação da nuvem primitiva é condição para formação de disco

Colapso Nebular

Colapso
Gravitacional

Região mais densa da nuvem pode ser comprimida por ondas de choque de supernovas vizinhas, desestabilizando a nuvem e provocando seu colapso

1. **Aquecimento** $\Rightarrow$ Proto-Sol $\Rightarrow$ Sol

Material em queda perde energia potencial gravitacional, que é convertida em energia cinética. Material de região mais densa sofre colisão e provoca aumento da temperatura do gás. Valores adequados de temperatura e pressão (densidade) detonam fusão nuclear – Sol torna-se uma estrela.

2. **Rotação** $\Rightarrow$ uniformiza movimentos aleatórios

Conservação do momento angular faz material em queda aumentar gradativamente a rotação quanto mais se aproxima do centro da nuvem.

3. **Achatamento** $\Rightarrow$ cria disco protoplanetário. A nebulosa solar é achatada na forma de um disco. Colisão entre blocos de matéria transforma movimento caótico (ao acaso) em ordenado do disco em rotação.

Colapso Nebular

Colapso

- 1. Aquecimento**
Material e energia com aumento de pressão (o)
- 2. Rotação**
Conservação gradativa
- 3. Achatamento**
forma de caótico (a)

Copyright © Addison Wesley

Colapso Nebular

ilustração

imagem

Sistemas planetários em formação

Formação de disco protoplanetário durante a contração nebular também é observada em estrelas em formação. A posição do disco é indicada nas imagens.

<http://2.bp.blogspot.com/-xAZLQ4Y1-AK/ToHtwLGBHal/AAAAAAAAACM/il-nSSbqiU/s1600/protostar-440x339.jpg>

HST • WFC2

Disks around Young Stars
PRC99-05b • STScI OPO
C. Burrows and J. Krist (STScI), K. Stapelfeldt (JPL) and NASA

Young Stellar Disks in Infrared

HST • NICMOS

PRC99-05a • STScI OPO
D. Padgett (IPAC/Caltech), W. Brandner (IPAC), K. Stapelfeldt (JPL) and NASA

Formação dos planetas

A acreção de massa começa com contínua aglutinação de grãos em blocos, formando os **planetésimos** (de cm a km).

Planetésimos colidem e formam **planetas**

Formação dos planetas

A colisão é fundamental para o processo de acreção (aglutinação de matéria por atração gravitacional).

Collision of Planetesimals In A Protoplanetary Disk

Órbitas Caóticas e Colisões

Colisões foram fundamentais na fase de acreção por interação gravitacional. A força atrativa do corpo aumenta com o acúmulo da massa.

Figure 11-8d
Earth System History, Second Edition
© 2005 W. H. Freeman and Company

Formação dos planetas: o acúmulo de massa

Planetas formaram-se do mesmo material que formou o Sol.

Material rochoso formou-se por acúmulo de grãos da nuvem protoestelar.

Massa $< \sim 15 M_{\text{Terra}}$

Planetas não podem crescer mais por colapso gravitacional

Planetas terrestres

Massa $> \sim 15 M_{\text{Terra}}$

Planetas podem crescer por acúmulo gravitacional de material de nuvem

Planetas gasosos

Formação dos planetas: o acúmulo de massa

Modelo de Acreção

Os grãos de poeira do disco acumulam-se em **planetésimos**. Acumulando massa continuamente, eles crescem formando corpos maiores: **embriões planetários**.

Os planetas gasosos acumulam envelopes de gás antes deste desaparecer do disco.

Planetésimos e embriões remanescentes são acrescidos a estes planetas, ou espalhados por eles.

Modelo de Colapso Gasoso

Instabilidades gravitacionais no disco formam **glóbulos de gás**, que se tornam planetas por auto-gravitação.

Grãos de poeira coagulam e sedimentam no centro do **protoplaneta**, formando um núcleo.

O planeta abre uma lacuna no disco enquanto acumula massa.

Teoria Nebular ou Protoplanetária

Formação dos planetas: o acúmulo de massa pelos gasosos

O disco protoplanetário tende a evaporar-se rapidamente pela ação da radiação de estrelas massivas vizinhas.

Escala de tempo típica: ~ 100.000 anos).

Esse tempo é muito curto para formar um planeta joviano através de acréscimo de planetésimos!

Alternativa:

Simulações teóricas mostram a possibilidade de crescimento através de acúmulo rápido e direto de gás (processo semelhante ao de formação estelar).

Formação dos planetas: o acúmulo de massa pelos gasosos

Um planeta se forma acumulando matéria de um anel circular, abrindo uma clareira anular no disco. Assim, ele pode atingir o tamanho de Júpiter.

O processo não se interrompe após o esvaziamento do anel. O planeta continua acumulando matéria do disco no bordo do anel, através de duas pontes que se formam unindo o planeta ao disco.

Os vértices da oval que confina a matéria do planeta são os pontos L1 e L2, descobertos por Euler no problema dos três corpos.

Este furo no disco retarda o processo da formação do planeta. Essas ondulações, tal como em torno de um barco, retardam o movimento do planeta, lenta e continuamente, deslocando-o para o centro do disco, num movimento espiral em direção à estrela.

Sequência de condensação

Um cenário possível para a formação do Sistema Solar.

(Adaptado de R.R.Robbins *et al.* 1995, pág.113)

No início a matéria nebular estava distribuída uniformemente na nuvem. Gradativamente, a matéria era comprimida para o centro e aquecida: assim nasceu o **proto-Sol**.

Os elementos mais voláteis foram “soprados” da região central aquecida, para as regiões afastadas mais frias: aqui formaram-se os planetas jovianos e os cometas.

Sequência de condensação

Hidrocarbonetos
Aromáticos
Policíclicos

Benzo(a)pireno - $C_{20}H_{12}$

Teoria nebular moderna

A distribuição de temperatura da nuvem primordial explica as diferentes composições químicas dos planetas.

Elementos voláteis (H; He e gelo) estão ~ ausentes nos planetas interiores

Estes planetas são compostos basicamente por rochas, material que condensa a ~500K.

Sequência de Condensação

Condensação de sólidos

Só matéria condensada pode aglutinar-se para formar planetas

Temperatura na nuvem decresce com a distância do centro.

Quanto mais longe do centro, mais fria é a região, e maior é a concentração de material mais volátil. Logo, a composição química do disco não era homogênea.

Table 19-3 The Condensation Sequence

Temperature (K)	Condensate	Planet (Estimated Temperature of Formation; K)
1500	Metal oxides	Mercury (1400)
1300	Metallic iron and nickel	
1200	Silicates	Venus (900)
1000	Feldspars	
680	Troilite (FeS)	
175	H ₂ O ice	Earth (600)
150	Ammonia-water ice	
120	Methane-water ice	Mars (450)
65	Argon-neon ice	
		Jovian (175)
		Pluto (65)

Substâncias menos densas condensam a baixas temperaturas.

Composição química do Sistema Solar

A composição química relativa entre os elementos químicos mais pesados é preservada entre s diferentes objetos do Sistema Solar.

Meteorito Carbonáceo

Todos os objetos se formaram de uma mesma nuvem primordial.

Composição química do Sistema Solar

Evidência de processo de mistura

Enos Picazzio
IAGUSP
Agosto 2006

Poeira aprisionada no aparato de gel

poeira do Wild 2

Côndrulos:

esferóides
milimétricos
de olivina
[(Mg,Fe)SiO₄],
e piroxênio
[(Mg,Fe)SiO₃]

GEMS ?

(Glass with Embedded Metal and Sulfides)

SEM-EDS X-ray Maps: overlay maps

"Easter" C054.4.25.0
potted butt in acrylic

BSE image, 4.0 kV, high contrast

EDS X-ray maps, 10 kV

Acreção e reprocessamento da matéria

Enos Picazzio
IAGUSP
Agosto 2006

Acreção de sólidos e a formação de planetésimos

**Início:
disco protoplanetário
formando blocos
sólidos**

**Fase posterior:
planetas se formando
por acreção**

Acreção de sólidos e a formação de planetésimos

Acréção de sólidos e a formação de planetésimos

Assim que rochas derretem, o material mais denso precipita em direção ao centro → **diferenciação**

Os planetas terrestres têm metais pesados concentrados nos núcleos, e substâncias menos densas no manto.

Diferenciação dos planetas terrestres

Fontes de calor:

1. Energia cinética de acreção
2. Energia gravitacional
3. Decaimento radioativo
4. Diferenciação

Onde foram para os resquícios?

- Caindo nos corpos de maior massa, sobretudo os planetas
- Ejetados por decorrência de encontros próximos com planetas
- Vento solar
- Pressão de radiação solar

Superfícies da Lua e de Marte evidenciam forte bombardeamento por asteróides.

Date: 2005/04/07

- IEA
- Aten
- Apollo
- Amor
- Mars-Crosser
- Hungaria
- Pre-Main-belt
- MB Zone I
- MB Zone II
- MB Zone III
- Cybele
- Hilda
- Thule
- Int. Jup.-crosser
- Trojan
- Ext. Jup.-crosser
- Comets
- Jup. fam. comets
- Hal. fam. comets
- $e \geq 1$ comets

Cometas e Objetos do Cinturão de Edgeworth-Kuiper

Enos Picazzio
IAGUSP
Agosto 2006

© www.harmsy.freeuk.com

Consequências da migração de um planeta massivo

Image credit: Dr. Avi M. Mandell, NASA / Goddard Space Flight Center.

Cometas e Objetos do Cinturão de Edgeworth-Kuiper

Enos Picazzio
IAGUSP
Agosto 2006

Cometas: regiões de acúmulo

Períodos longos: formados na região dos gasosos e expelidos para cá por interação gravitacional.

Cinturão Edgeworht-Kuiper

Plutão

Nuvem de Oort
30.000 a 100.000 UA

Períodos curtos e médios:
formados nesta região

Sedna: formado adiante de Plutão?

Enos Picazzio
IAGUSP
Agosto 2006

Diâmetro ~1.600 km (2/3 de Plutão)
Período orbital: ~12.500 anos.
Órbita excêntrica: 70 UA a 900 UA

Simulações sugerem que ele foi formado bem distante de Plutão e não, como se supunha, que ele teria se formado nas proximidades dele e ejetado por perturbação gravitacional dos planetas gigantes.

Implicações:

- a zona de formação planetária estende-se bem além do limite até agora admitido,
- pode existir objetos semelhantes nas extremidades do Sistema Solar; e
- o limite de 50 UA não é o externo do cinturão de Edgeworth-Kuiper, mas o interno de uma depressão anular, ou lacuna, entalhada numa estrutura bem mais larga que o cinturão.

Idade do Sistema Solar

Mardene Boettcher - Ohio University

Sol e planetas têm aproximadamente a mesma idade

Idades das rochas são obtidas através do decaimento radioativo

Medidas de abundância relativa entre elemento instável e estável revela data de formação da rocha.

Rochas terrestres, lunares e meteoritos mais antigos revelam idades de ~ 4,6 bilhões de anos.

Radioisótopo	Meia-vida
Carbono-15	2,4 s
Xenônio-135	9h
Fósforo-32	32 dias
Enxofre-35	87 dias
Cobalto-60	5,26 anos
Estrôncio-90	28,1 anos
Césio-137	30,17 anos
Rádio-226	$1,6 \cdot 10^3$ anos
Plutônio-239	$2,44 \cdot 10^4$ anos
Urânio-235	$4,5 \cdot 10^9$ anos

A presença da água

SOL

Regiões mais frias da atmosfera solar, cerca de 4.500 K

Espectro no IV marcado por linhas de absorção da água

Tempestade de nuvem d'água em Júpiter

CERES (planeta-anão):
25% do manto pode
ser água doce (200
milhões de km³)

TERRA:
total 1,4 bilhão de
km³, água doce: 41
milhões de km³

Bolha

Água salgada

Meteorito Monahans (condrito ordinário)

Zona Habitável

Região em torno de uma estrela em que um planeta com atmosfera pode sustentar água líquida em sua superfície.

Vênus está próximo do limite interno e Marte, do limite externo.

Atualmente o Sol brilha 30% que no passado. Portanto, sua zona habitável já esteve mais próxima dele e estará mais distante no futuro.

O limite externo da zona habitável pode se estender devido à presença de CO_2 na atmosfera pois ele favorece o efeito estufa e mantém a temperatura em níveis elevados mesmo a grandes distâncias da estrela.

Água líquida pode ainda existir fora da zona habitável, desde que haja mecanismo de aquecimento. Decaimento radioativo no núcleo e dissipação de energia por maré em Europa (satélite de Júpiter) liquefazem a água da superfície e sua capa congelada dificulta a perda de calor.

Zona Habitável: exoplanetas candidatos

Known exoplanets near the habitable zone (darker green shade is the conservative habitable zone and the lighter green shade is the optimistic habitable zone). Only exoplanets less than 10 Earth masses or 2.5 Earth radii are labeled. Some are still unconfirmed (* = unconfirmed). Size of the circles corresponds to the radius of the planets (estimated from a mass-radius relationship when not available). Credit: PHL @ UPR Arcibo

HABITABLE EXOPLANETS CATALOG

<http://phl.upr.edu/projects/habitable-exoplanets-catalog>

Amostragem de 3.700 exoplanetas confirmados

Over 3,700 Confirmed Exoplanets

Terrans

Giants

Credit: PHL @ UPR Arcibo (phl.upr.edu) Nov 2017

Terrans Group

Giants Group

Miniterrans
(Mercury Size)

Subterrans
(Mars Size)

Terrans
(Earth Size)

Superterrans
(Super-Earths & Mini-Neptunes)

Neptunians
(Neptune Size)

Jovians
(Jupiter Size)

$10^{-5} - 0.1 M_E$ or $0.03 - 0.4 R_E$

$0.1 - 0.5 M_E$ or $0.4 - 0.8 R_E$

$0.5 - 5 M_E$ or $0.8 - 1.5 R_E$

$5 - 10 M_E$ or $1.5 - 2.5 R_E$

$10 - 50 M_E$ or $2.5 - 6.0 R_E$

$> 50 M_E$ or $> 6 R_E$

De onde veio a água da Terra?

Atualmente

Hoje a Terra é recoberta por água, mas houve época em que a temperatura era elevada demais para que isso ocorresse. De onde veio a água? A taxa de D/H mostra que esta pergunta ainda carece de resposta conclusiva.

No final da era de bombardeamento

Inigma isotópico: distribuição da composição isotópica do hidrogênio.

François Robert, *Science* 10 August 2001, Vol. 293, no. 5532, pp. 1056 – 1058.

2004 - Fred Sulahria

De onde veio a água da Terra?

103P/Hartley 2

Nature 478, 218–220 (13 October 2011) doi:10.1038/nature10519

Habitabilidade e vida

Condições para desenvolvimento e sustentabilidade de vida em um planeta:

- Sua composição química deve ser favorável.
- Ele deve ter fonte interna de calor.
- Deve possuir atmosfera, que propicie efeito estufa controlado e o proteja de radiação maléfica à vida (UV, raios X).
- Deve possuir magnetosfera intensa para protegê-lo do vento estelar (radiação corpuscular da estrela).
- Sua órbita não pode ter excentricidade elevada, senão sofrerá variação acentuada de temperatura e climática.
- A rotação e a translação não podem ser sincronizadas senão ele terá sempre a mesma face voltada para sua estrela.
- A orientação do eixo de rotação deve ser estável para evitar glaciações severas.
- Precisa manter estas condições por muito tempo.

Por ora, o nosso é o único planeta que apresenta estas características.