

Micoses sistêmicas oportunistas

Candida spp. e Cryptococcus spp.

Profa. Kelly Ishida

E-mail: ishidakelly@usp.br

Classificação das micoses

Micose	Tecido	Espécies
Superficial	Extrato córneo do tecido epitelial, pelo e cabelo	<i>Malassezia</i> spp. <i>Hortaea werneckii</i> <i>Piedraia hortae</i> <i>Trichosporon</i> spp.
Cutânea	Porções queratinizadas da pele, pelo e cabelo	<i>Trichophyton</i> spp. <i>Microsporum</i> spp. <i>Epidermophyton floccosum</i>
Subcutânea	Derme, músculos e tecido conjuntivo	<i>Sporothrix</i> spp. <i>Fonsecaea pedrosoi</i> <i>Lacazia loboi</i> e outras espécies
Sistêmica	Inicia-se com uma infecção pulmonar podendo atingir qualquer órgão	<i>Paracoccidioides</i> spp. <i>Histoplasma capsulatum</i> <i>Coccidioides</i> spp.
Sistêmica Oportunista	Qualquer tecido	<i>Candida</i> spp. <i>Cryptococcus</i> spp. <i>Pneumocystis jirovecii</i> <i>Aspergillus</i> spp. <i>Fusarium</i> spp. <i>Rhizopus</i> spp., <i>Mucor</i> spp.

- 1,7 bilhões de pessoas – Infecções fúngicas
- 1-2 milhões de pessoas - Infecções fúngicas invasivas
- Altas taxas de mortalidade
- Dados subestimados

Table 1. Statistics of the 10 most significant invasive fungal infections.

Disease (most common species)	Location	Estimated life-threatening infections/ year at that location*	Mortality rates (% in infected populations)*
Opportunistic invasive mycoses			
Aspergillosis (<i>Aspergillus fumigatus</i>)	Worldwide	>200,000	30–95
Candidiasis (<i>Candida albicans</i>)	Worldwide	>400,000	46–75
Cryptococcosis (<i>Cryptococcus neoformans</i>)	Worldwide	>1,000,000	20–70
Mucormycosis (<i>Rhizopus oryzae</i>)	Worldwide	>10,000	30–90
Pneumocystis (<i>Pneumocystis jirovecii</i>)	Worldwide	>400,000	20–80
Endemic dimorphic mycoses*†			
Blastomycosis (<i>Blastomyces dermatitidis</i>)	Midwestern and Atlantic United States	~3,000	<2–68
Coccidioidomycosis (<i>Coccidioides immitis</i>)	Southwestern United States	~25,000	<1–70
Histoplasmosis (<i>Histoplasma capsulatum</i>)	Midwestern United States	~25,000	28–50
Paracoccidioidomycosis (<i>Paracoccidioides brasiliensis</i>)	Brazil	~4,000	5–27
Penicilliosis (<i>Penicillium marneffeii</i>)	Southeast Asia	>8,000	2–75

*Most of these figures are estimates based on available data, and the logic behind these estimates can be found in the text and in the Supplementary Materials. †Endemic dimorphic mycoses can occur at many locations throughout the world. However, data for most of those locations are severely limited. For these mycoses, we have estimated the infections per year and the mortality at a specific location, where the most data are available.

Micoses Oportunistas

São causadas por fungos que, normalmente, não são infectantes e se aproveitam de alterações nas condições imunológicas e/ou fisiológicas do hospedeiro para causarem as doenças.

***Candida* spp.**
***Cryptococcus* spp.** } Fungos leveduriformes

***Aspergillus* spp.**
***Fusarium* spp.**
Zigomycetes } Fungos filamentosos


Micose

Infecção x doença

Infecção – colonização de um agente infeccioso.

Doença (do latim *dolentia*, padecimento) - distúrbio das funções de um órgão, da psique ou do organismo como um todo que está associado a sintomas específicos.


A doença ocorre quando o organismo não conseguir mais manter a homeostase.



Sistema imunológico
X

Fatores de virulência


Fatores predisponentes – relacionadas ao hospedeiro



Cenário Atual dos Pacientes:

- ↑ pacientes HIV+
- Transplantados de MO e órgãos sólidos
- Uso de substâncias imunossupressoras
- Neoplasias → Quimioterapia
- Uso de instrumentos médicos invasivos
 - UTI (cateter, sondas, respirador, próteses...)
- Aumento da prematuridade e longevidade
- Uso de antibióticos de amplo espectro


Infecções na corrente sanguínea



Martin et al., 2003. NEJM 348: 1546-1554, 2003.

FIGURE 1

Mean incidence density of all nosocomial primary laboratory-confirmed bloodstream infections (n=6,666) and associated microorganisms (n=7,453) in 682 intensive care units, Germany, 2006–2011



NLCBIs: nosocomial laboratory-confirmed bloodstream infections.

Gram-positive bacteria: *Staphylococcus aureus*, coagulase-negative staphylococci, *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus pneumoniae*, *Enterococcus* spp., *Corynebacterium* spp.


Gram-negative bacteria: *Haemophilus* spp., *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., *Enterobacter* spp., *Citrobacter* spp., *Proteus* spp., *Serratia* spp., other *Enterobacteriaceae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Burkholderia cepacia*, *Stenotrophomonas maltophilia*, *Acinetobacter* spp., *Bacteroides* spp., *Legionella* spp.

Fungi: *Candida albicans*, non-*albicans* *Candida* spp., *Aspergillus* spp., other fungi.


Candidíasis

Candida spp.

- Levedura comensal
- Temperatura: 20-38 °C
- pH: 2,5 – 7,5




- Candida albicans*
- Candida tropicalis*
- Candida parapsilosis*
- Candida glabrata*
- Candida krusei*
- Candida dubliniensis*
- Candida guilliermondii*
- Candida lusitaneae*
- E outras...*



Transmissão

Endógena
faz parte da microbiota
humana

Exógena
ambiente
(ar, água, alimentos,
contato inter-humano)



Epidemiologia

- 85 – 95% dos indivíduos – colonização do tecido epitelial do sistema gastrointestinal, genitourinário e respiratório
- 75% das mulheres - pelo menos 1 episódio de Candidíase vulvovaginal, 5% desenvolvem a forma grave da doença
- ~75% HIV/AIDS - Candídiase orofaríngea
- 4ª Causa de infecções hospitalares
 - 1: Estafilococos coagulase negativa
 - 2: *Staphylococcus aureus*
 - 3: *Klebsiella pneumoniae*
- Mortalidade em 40-70% dos casos de Candidemia

Espécie mais freqüente: *Candida albicans*

Candidíase invasiva - > 50%


Candidíase vulvovaginal – 85 a 95 %

Perfil epidemiológico de infecções por
Candida spp. está mudando...

C. krusei - resistência intrínseca FCZ

C. glabrata - menos sensível FCZ

C. auris e *C. haemulonii* - MDR



DEADLY GERMS, LOST CURES

A Mysterious Infection, Spanning the Globe in a Climate of Secrecy

The rise of *Candida auris* embodies a serious and growing public health threat: drug-resistant germs.



**DRUG-RESISTANT
CANDIDA AURIS**

THREAT LEVEL **URGENT**

323 Clinical cases in 2018

90% Isolates resistant to at least **one** antifungal

30% Isolates resistant to at least **two** antifungals

Candida auris (*C. auris*) is an emerging multidrug-resistant yeast (a type of fungus). It can cause severe infections and spreads easily between hospitalized patients and nursing home residents.



<https://www.nytimes.com/2019/04/06/health/drug-resistant-candida-auris.html>
www.cdc.gov

Virulência fúngica e Patogênese


Morfogênese

Um dos principais fatores de virulência de *Candida albicans*


Levedura




Tubo germinal




Hifa/pseudohifas




Mecanismos de Invasão tecidual




Adhesion and colonization



Hyphal penetration and invasion



Vascular dissemination




Endothelial colonization and penetration

Adesinas

Secreção enzimas hidrolíticas

(proteases, fosfolipases, esterases, hemolisinas e outras)




Toxinas (ex. candidalísina)



Invasão tecidual

Capacidade de formar biofilme em superfícies abióticas e bióticas

Comunidade microbiana de células aderidas à um substrato e embebidas em uma matriz extracelular polimérica, com um fenótipo alterado em relação às células planctônicas.




FINKEL JS, Nature Review Microbiology, v.9, n.2, 2011

Porque o biofilme é tão importante?

Fonte de infecção e disseminação


- Infecção primária nas superfícies bióticas (mucosa) e abióticas (ex. cateter)
- Infecção secundária: disseminação para outros órgãos



<http://bacteriality.com/2008/05/26/biofilm/>

RESISTÊNCIA! Azóis e anfotericina B

- Matriz extracelular
- Bombas de efluxo (CDR / MDR)
- Redução de ergosterol na membrana



MASAKAZU N et al., *Odontology*, 2010

Manifestações clínicas – cutânea/mucocutânea

- **Vulvovaginite/balanite**
 - **Candidíase oral**
- **Candidíase intertriginosa**
 - **Onicomicose**


- **Candidíase vulvovaginal / Balanite**
- lesões pruriginosas com leucorréia e sensação de queimadura.
- Comum em mulheres grávidas e diabéticas



CVV



Candida albicans
nas paredes vaginais



Uma infecção
fúngica causada pelo
organismo fúngico
Candida albicans



Balanite



<https://quesaude.com.br/balanite/>

- **Candidíase oral:** formação de placas brancas na mucosa oral e cantos dos lábios (sapinho). Comum em recém-natos, diabetes, HIV+, uso de próteses dentárias, etc



Pseudomembranosa -
hálito fétido e placas
brancas destacáveis,
sensação de ardência e
queimação



Eritematosa – língua
avermelhada e queimação



**Multifocal crônica
Hiperplásica** -
características das duas
citadas



Quelite angular

- **Candidíase intertriginosa**

- Lesões eritematosas localizadas nas dobras da pele: axilas, região submamária, interglútea, perianal, espaços interdigitais, etc.
- Comum em obesos e crianças que usam fraldas




- **Onicomiose**

- Lesões na unha e região periungueal, que se apresenta inflamada (edemaciada e ruborizada)



• **Candidíase disseminada**

- Ocorre em mais de 80% dos pacientes HIV+, como primeira infecção oportunista.
- Estão relacionadas com a deficiência imunológica (neutropenias) – acometendo os pacientes das unidades de cancerologia, hematologia e UTIs.
- Formas clínicas mais freqüentes são candidíase esofágica e pulmonar
- ↓ prognóstico




Esofagite com múltiplas placas esbranquiçadas e discreto edema ao redor de toda a circunferência do órgão.




Fig. 1. Radiografía de tórax mostrando un patrón intersticial.

- **Candidemia** – sinal de candidíase disseminada
 - Fontes de fungo: infecção muco/cutânea e contaminação de dispositivos hospitalar, ex. cateter e sondas




Cateter



Prótese dentária

Diagnóstico Laboratorial


- **Material:** Pele e unha, Urina, Escarro e lavado broncoalveolar, líquido, fluido pleural e sangue, Biópsia de diferentes órgãos, Cateteres,
- **Exame direto:** KOH 10-20%, coloração de Gram
 - Em caso de invasão tecidual, *Candida albicans* pode formar tubos germinativos que vão gerar formas filamentosas (hifas verdadeiras e pseudohifas).
- **Histopatologia** – colorações de biópsia (HE e PAS)



Direto




Histopatologia




Exame direto

Exame direto: mucosa oral




Exame direto: pele




Exame direto: vagina



Histopatológico material de biópsia



Coloração: H&E



Coloração: PAS

- **Cultura**

- Ágar Sabouraud dextrose

Aspecto cremoso e opaco

Coloração creme



Courtesy of
The Geraldine Kaminski Medical Mycology Library
Produced by: David Ellis and Roland Hermanis
Copyright © 2003 Doctorfungus Corporation

CHROMagar *Candida*

YEAST

C. tropicalis *C. albicans*

C. parapsilosis


C. glabrata
(*C. krusei*)

Cultura


- Meios de cultura seletivo e diferencial

Ex. **Chromagar *Candida***

- Permite isolamento de mais de uma espécie
- Identificação presuntiva




- **Testes para identificação das espécies:**
 - **Teste do tubo germinativo** – leveduras em SFB por 3 h a 37 °C



Candida albicans


- **Micromorfologia – microcultivo em Lâmina – ágar fubá**



Candida albicans


- **Testes para identificação das espécies:**
Provas bioquímicas

Zimograma - Fermentação
de carboidratos



Açúcar = etanol + CO_2

Auxanograma - Assimilação
de fontes de C e N



Identificação das principais leveduras de interesse médico

Levedura	Tg	Cultivo em lâmina		Ur	Assimilação									Fermentação					
		Hifa	Ar		Sa	Ma	La	Ce	Tr	Ra	X	I	NO ₃	Gl	Sa	Ma	La	Ra	Tr
<i>C. albicans</i>	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	+	-	-	+	-	+	-	-	V
<i>C. tropicalis</i>	-	+	-	-	+	+	-	V	+	+	+	-	-	+	V	+	-	-	+
<i>C. parapsilosis</i>	-	+	-	-	+	+	-	V	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	V
<i>C. krusei</i>	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
<i>C. guilliermondii</i>	-	+	-	-	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-	-	+	V
<i>C. glabrata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+
<i>C. neoformans</i>	-	-	-	+	+	+	-	V	+	V	+	+	-	-	-	-	-	-	-
<i>Geotrichum</i>	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	V	-	-	-	-	-
<i>Trichosporon</i>	-	+	+	V	+	+	+	+	V	V	+	V	-	-	-	-	-	-	-
<i>Rhodotorula sp</i>	-	-	-	+	+	V	-	V	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Saccharomyces</i>	-	-	-	-	+	+	-	-	V	+	-	-	-	+	+	+	-	+	V

Tg = tubo germinativo, Ar = artrósporo, Ur= urease, Sa = sacarose, Ma=maltose,La = lactose, Ce = celubiose, Tr = trealose, Ra = rafinose, X = xilose, I = inositol,NO₃ = nitrato, Gl = glicose, + = pos, - = neg, V= variável

Fonte: <http://portal.anvisa.gov.br>


- **Métodos automatizados de identificação de leveduras**

Exs. Vitek 2 (Biomérieux)

API2HOC AUX System (Biomérieux)



Vitek 2



- Métodos moleculares
 - PCR espécie-específico
 - Sequenciamento


MycoReal Candida

Real time - PCR



T2Candida


Amostras de sangue



https://stm.sciencemag.org/content/5/182/182ra54?ijkey=e4e9cda1ba1726519dbd4ea94488518ccaed6e07&keytype=tf_ipsecsha
<https://www.t2biosystems.com/>

MycoReal Candida is a real-time PCR detection assay for rapid and sensitive detection as well as differentiation of 7 medically important species of *Candida* (*C. albicans*, *C. dubliniensis*, *C. glabrata*, *C. krusei*, *C. lusitanae*, *C. parapsilosis* and *C. tropicalis*). Species can be differentiated by specific melting curves. By using species-specific probes the test is highly specific for *Candida*. The identification of the species allows a first conclusion on a possible antimycotica resistance behaviour.


Tratamento das candidíases- Antifúngicos





The Brazilian Journal of
INFECTIOUS DISEASES

www.elsevier.com/locate/bjid



Original article

Brazilian guidelines for the management of candidiasis – a joint meeting report of three medical societies: Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Paulista de Infectologia and Sociedade Brasileira de Medicina Tropical[☆]

Arnaldo Lopes Colombo^{a,*}, Thaís Guimarães^b, Luis Fernando Aranha Camargo^a,
Rosana Richtmann^c, Flavio de Queiroz-Telles^d, Mauro José Costa Salles^e,
Clóvis Arns da Cunha^f, Maria Aparecida Shikanai Yasuda^g, Maria Luiza Moretti^h,
Marcio Nucciⁱ



Clinical Practice Guideline for the Management of Candidiasis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America

Peter G. Pappas,¹ Carol A. Kauffman,² David R. Andes,³ Cornelius J. Clancy,⁴ Kieren A. Marr,⁵ Luis Ostrosky-Zeichner,⁶ Annette C. Reboli,⁷ Mindy G. Schuster,⁸ Jose A. Vazquez,⁹ Thomas J. Walsh,¹⁰ Theoklis E. Zaoutis,¹¹ and Jack D. Sobel¹²

¹University of Alabama at Birmingham; ²Veterans Affairs Ann Arbor Healthcare System and University of Michigan Medical School, Ann Arbor; ³University of Wisconsin, Madison; ⁴University of Pittsburgh, Pennsylvania; ⁵Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, Maryland; ⁶University of Texas Health Science Center, Houston; ⁷Cooper Medical School of Rowan University, Camden, New Jersey; ⁸University of Pennsylvania, Philadelphia; ⁹Georgia Regents University, Augusta; ¹⁰Weill Cornell Medical Center and Cornell University, New York, New York; ¹¹Children's Hospital of Pennsylvania, Philadelphia; and ¹²Harper University Hospital and Wayne State University, Detroit, Michigan

It is important to realize that guidelines cannot always account for individual variation among patients. They are not intended to supplant physician judgment with respect to particular patients or special clinical situations. IDSA considers adherence to these guidelines to be voluntary, with the ultimate determination regarding their application to be made by the physician in the light of each patient's individual circumstances.

Keywords. candidemia; invasive candidiasis; fungal diagnostics; azoles; echinocandins.

Criptococose

Cryptococcus spp.

Fungo na forma de levedura pertencente ao grupo dos Basidiomicetos;

Principais espécies: *C. neoformans* e *C. gattii*


Presença de cápsula mucopolissacarídica



Leveduras (infecção)
Reprodução **Assexuada**



Filamento (ambiente)
Reprodução **Sexuada**







Figure 3

Evolution of the *C. neoformans* species complex. The *Cryptococcus* species complex contains at least two subspecies, *C. neoformans* and *C. gattii*, which diverged from a common ancestor ~37 and ~18.5 mya, respectively. They are further divided into four serotypes consisting of at least nine molecular types. Solid, thin, and dashed lines indicate the prevalence of the respective serotype in each molecular type.

VGII

Norte/Nordeste imunocompetentes



Sul/Sudeste: Pacientes imunocomprometidos (HIV+)

Criptococose

- Micose sistêmica de evolução subaguda ou crônica que atinge vários órgãos, principalmente, pulmões e sistema nervoso central.
- Ocorre em animais e nos homens, mas a transmissão animal-homem ou homem-homem não foi documentada.
- Fontes ambiental: solo contendo excrementos de pombos ou eucaliptos e outras árvores e madeiras em decomposição.
- Transmissão: inalação de fungo encontrado no ambiente.



Fezes de pombo




Eucalipto e madeira em decomposição

Problemática - AIDS

- ***Cryptococcus* spp. é o principal fungo causador de meningoencefalite em pacientes imunocomprometidos.**
 - Com o aumento do número de pacientes portadores do vírus HIV na década de 80, passou a ocupar o 3º lugar das doenças oportunistas;
 - A taxa de mortalidade é de 10% em países desenvolvidos e 43% em países em desenvolvimento podendo chegar até 70%;
 - Na década de 90 iniciou-se a utilização do coquetel antiretroviral (HAART) nos países desenvolvidos...
 - Diminuição dos casos de criptococoses.


Meningite criptocócica relacionada ao HIV



Rajasingham et al., Lancet Infectious Diseases 2017.
www.cdc.gov



- Dados do Ministério da Saúde – Brasil (2012)
- Dentre as micoses sistêmicas a criptococose tem sido relatada como a mais prevalente em termos de internação (SUS)
- Norte e nordeste
 - elevada taxa de mortalidade por meningite criptocócica (37 – 49%) em indivíduos **sem sinais de imunossupressão**
 - causada pela espécie *C. gatti*, comportando-se esta doença como uma endemia regional

Patogenia




Fatores de virulência do fungo


Morfotipos de Leveduras




Cápsula mucopolissacarídica



- Leveduras possuem uma estrutura redonda típica envolvendo
- Formada por polissacarídeos: glucuronoxilomanana (GXM) e galactoxilomanana (GalXM)
- Esta característica é importante para a patogenicidade e para o diagnóstico laboratorial.




Cápsula



Current Opinion in Microbiology

Taylor-Smith ; May. Current Opinion in Microbiology 2016, 34:67–74



Barreira anti-fagocítica Interação fungo-macrófago

FEMS Immunol Med Microbiol 64 (2012) 147–161

MINIREVIEW

Catch me if you can: phagocytosis and killing avoidance by *Cryptococcus neoformans*



Rocío García-Rodas & Oscar Zaragoza

Mycology Reference Laboratory, National Centre for Microbiology, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain

- **Vídeo S1.** Intracellular replication.
- **Vídeo S2.** Macrophage division and fusion.
- **Vídeo S3.** Yeast extrusion from infected macrophages.


- Inibe produção de citocinas pró-inflamatórias
- Depleta complemento
- Reduz a migração de leucócitos para os sítios de inflamação
- Citotóxica – induz apoptose

Melanina



- Outros fatores de virulência
 - Ácido siálico na cápsula – a superfície do fungo fica carregada negativamente
 - Produção de enzimas hidrolíticas (proteínase, fosfolipase, esterase e urease), metabolismo de inositol purinas e piridinas

Entrada do fungo no SNC




• Hipótese para o neurotropismo

- 1. Presença de substratos para a síntese de melanina: dopamina e epinefrina
- 2. SNC pode servir de refúgio do fungo contra a resposta imune
 - Sistema imunológico atua com menos rigor no cérebro
- 3. Presença de receptores específicos em células neuronais poderiam atrair *Cryptococcus*
 - Adere células endotélias dos vasos capilares do cérebro (*in vivo*)
 - Adere células da glia e do pulmão de ratos (*in vitro*)

Manifestações clínicas

1- Forma disseminada Comprometimento do Sistema Nervoso Central:

- A meningoencefalite ocorre em **90%** dos casos;
- Manifestações cutâneas, ósseas, pulmonares e SNC
- O sinal mais frequente é a Cefaléia occipital.
- Febre é rara.
- O paciente pode, também, apresentar demência, confusão mental e diminuição da acuidade visual.



<http://anatpat.unicamp.br>




<http://criptococose.webnode.com/>

10-15% dos casos
Marcador de infecção disseminada.

2- Comprometimento pulmonar:




- É o segundo mais freqüente;
- Pode ser assintomático em 1/3 dos casos;
- Apresentação clínica pode variar entre manifestações localizadas até falência respiratória.




Jasinowodolinski *et al*, 2007

Diagnóstico Laboratorial

- **O material biológico:** escarro, líquido, material ganglionar, lesões mucocutâneas.
- **Exame direto:** Observação de levedura capsulada, utiliza-se tinta nanquin para aumentar o contraste.
 - Interpretação: A presença de leveduras encapsuladas no material clínico deve ser considerado significativo, mesmo na ausência de sintomas clínicos.



- **Histopatologia:** PAS, GMS, HE,
 - mucicarmim (cora a cápsula polissacarídica)



• Cultura

- Ágar Sabouraud dextrose (SDA) + cloranfenicol
- Meio semente de niger + cloranfenicol
 - Compostos fenólicos



SDA: colônias translúcidas, lisas, gelatinosas. Culturas mais antigas tornam-se mucóide com coloração creme.

Identificação das principais leveduras de interesse médico

Levedura	Tg	Cultivo em lâmina		Ur	Assimilação									Fermentação					
		Hifa	Ar		Sa	Ma	La	Ce	Tr	Ra	X	I	NO ₃	Gl	Sa	Ma	La	Ra	Tr
<i>C. albicans</i>	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	+	-	-	+	-	+	-	-	V
<i>C. tropicalis</i>	-	+	-	-	+	+	-	V	+	+	+	-	-	+	V	+	-	-	+
<i>C. parapsilosis</i>	-	+	-	-	+	+	-	V	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	V
<i>C. krusei</i>	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
<i>C. guilliermondii</i>	-	+	-	-	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-	-	+	V
<i>C. glabrata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+
<i>C. neoformans</i>	-	-	-	+	+	+	-	V	+	V	+	+	-	-	-	-	-	-	-
<i>Geotrichum</i>	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	V	-	-	-	-	-
<i>Trichosporon</i>	-	+	+	V	+	+	+	+	V	V	+	V	-	-	-	-	-	-	-
<i>Rhodotorula sp</i>	-	-	-	+	+	V	-	V	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Saccharomyces</i>	-	-	-	-	+	+	-	-	V	+	-	-	-	+	+	+	-	+	V

Tg = tubo germinativo, Ar = artrósporo, Ur= urease, Sa = sacarose, Ma=maltose,La = lactose, Ce = celubiose, Tr = trealose, Ra = rafinose, X = xilose, I = inositol,NO₃ = nitrato, Gl = glicose, + = pos, - = neg, V= variável

Provas Bioquímicas

Meio CGB

L-Canavanina – Glicina – Azul de Bromotimol

(+) Azul – *C. gattii*

O meio passa de pH 5 para 7

(-) Amarelo – *C. neoformans*

Cryptococcus gattii : é naturalmente resistente a L-canavanina, metabolizando-a em produtos não tóxicos, sendo capaz de crescer no meio de CGB, onde a glicina é utilizada como única fonte de carbono e nitrogênio, produzindo amônia, elevando o pH e mudando a cor.




- **Teste sorológico:**


Aglutinação em látex



Pesquisa de antígeno capsular - (GXM)

- líquor: é o método de escolha para o diagnóstico de pacientes com meningite por *Cryptococcus* spp.



CrAg[®] LFA Pesquisa de antígeno capsular GXM Soro e Líquor





Tratamento

- Forma pulmonar

Tabela 2 - Roteiro para tratamento das formas pulmonares de criptococose: HIV positivo ou cultura positiva de espécime respiratório, sem envolvimento do SNC.*

Forma leve/moderada		
Antifúngico	Dose e duração	Evidência
Fluconazol	200 a 400mg/dia VO por 6 a 12 meses	AIII
Ou	(vide observação)	
Itraconazol	200 a 400mg/dia VO por 6 a 12 meses	BIII
	(vide observação)	
Manutenção	fluconazol 200 a 400mg/dia ou itraconazol 200 a 400mg/dia	CIII
Forma grave	tratar como meningoencefalite	

* Em todos os casos determinar *Cryptococcus* no LCR: se cultura ou pesquisa direta e/ou látex positivos: tratar como infecção em SNC.

Em pacientes com aids e linfócitos T CD4+ > 100 a 200 células/mm³ por mais de 6 meses e aderentes a TARV, pode ser considerada a suspensão da terapêutica antifúngica de manutenção (CIII).

• Forma disseminada (SNC)

Tabela 5 - Pacientes HIV positivo e outras formas de imunodepressão Tratamento da criptococose em sistema nervoso central ou doença disseminada

Indução	Consolidação	Evidência
Anfotericina B: 0,7 a 1mg/kg/dia + 5-Fluocitosina: 100mg/kg/dia ÷ 4 doses VO por 2 semanas	fluconazol: 400mg/dia VO por 10 semanas	AI ^{9,10,113}
Esquemas alternativos		
anfotericina B: 0,7 a 1mg/kg/dia por 6 a 10 semanas		BII ⁹⁷
anfotericina B lipossomal 4 a 6mg/kg/dia por 6 a 10 semanas		BII ⁵⁵
anfotericina B complexo lipídico 4 a 5 mg/Kg/dia por 6 a 10 semanas		BII ^{18,101}
Em casos de intolerância ou impossibilidade de uso de anfotericina B e suas formulações lipídicas		
fluconazol: 800 a 1600mg /dia associado 5 FC 100mg/Kg/dia ÷ 4 doses VO, ou fluconazol: 1600 a 2000mg/dia por dia por 6 a 10 semanas		BII ⁶⁸
ou fluconazol: 400 a 800mg/dia por 10 a 12 semanas		CII ⁶⁶
*Manutenção 12 a 24 meses		
fluconazol: 200 a 400mg/dia, 1x dia, VO		AI ⁹⁵
itraconazol: 200mg/dia 1X, VO		CI ⁹⁵

Fluconazol deverá ser iniciado na fase de consolidação, quando paciente apresentar melhora clínica definida por: melhora do status mental, febre, cefaléia, sinais meníngeos e/ou negatificação da cultura do LCR na 2ª semana.

*pacientes com CD4+ > 100 a 200 células/mm³ por mais de 6 meses e aderentes a TARV, recomenda-se a suspensão da terapêutica antifúngica de manutenção (BII/BIII); reiniciar a terapêutica de manutenção se CD4 cair para < 100 cels/mm³ (CII)^{7 76 116}.

BONS ESTUDOS