Efeito Aharonov-Bohm

Aluno: **Yuri Asnis**

Seminário Eletrodinâmica Clássica I

11 de maio de 2021

Visão geral

- 1 **Eletrodinâmica**
  - Transformações de calibre
- 2 **Hamiltoniano**
  - Formalismo Hamiltoniano da Interação Eletromagnética
- 3 **Mecânica quântica**
  - Transformações de calibre
- 4 **Juntando tudo**
  - O efeito Aharonov-Bohm

Transformações de calibre - eletrodinâmica

- Pela equação: $\nabla \cdot \mathcal{B} = 0$, podemos escrever $\mathcal{B}$ como:

$$\boxed{\mathcal{B}(\mathbf{r}, t) = \nabla \times \mathcal{A}(\mathbf{r}, t)} \quad (1)$$

- E pela Lei de Faraday: $\nabla \times \mathcal{E} = -\partial_t \mathcal{B}$, temos que:

$$\nabla \times \mathcal{E} = -\partial_t \nabla \times \mathcal{A} \Rightarrow \nabla \times (\mathcal{E} + \partial_t \mathcal{A}) = 0$$

tal que, podemos escrever $\mathbf{E}$ como:

$$\boxed{\mathcal{E}(\mathbf{r}, t) = -\nabla\Phi(\mathbf{r}, t) - \partial_t \mathcal{A}(\mathbf{r}, t)} \quad (2)$$

- Os campos $\mathcal{B}$ e $\mathcal{E}$ são invariantes sobre tais transformações:

$$\Phi(\mathbf{r}, t) \rightarrow \Phi'(\mathbf{r}, t) \equiv \Phi(\mathbf{r}, t) - \partial_t \chi(\mathbf{r}, t) \quad (3)$$

$$\mathcal{A}(\mathbf{r}, t) \rightarrow \mathcal{A}'(\mathbf{r}, t) \equiv \mathcal{A}(\mathbf{r}, t) + \nabla \chi(\mathbf{r}, t) \quad (4)$$

- Onde $\chi(\mathbf{r}, t)$ é uma função qualquer do espaço e do tempo, chamada de *campo de calibre*

Formalismo Hamiltoniano da Interação Eletromagnética

- Vamos demonstrar rapidamente o Hamiltoniano de uma partícula de massa m e carga q sob ação de campos $\mathcal{E}$ e $\mathcal{B}$.
- Começamos pela equação de movimento não-relativística

$$\mathcal{F} = q(\mathcal{E} + \mathbf{v} \times \mathcal{B}) \quad (5)$$

- Utilizando os potenciais dados por 1 e 3, ficamos com:

$$\mathcal{F} = q[-\nabla\Phi - \partial_t\mathcal{A} + \mathbf{v} \times (\nabla \times \mathcal{A})] \quad (6)$$

- Usando as seguintes propriedades:
  - Derivada convectiva: $\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)$
  - Propriedade vetorial: $\mathbf{v} \times (\nabla \times \mathcal{A}) = \nabla(\mathbf{v} \cdot \mathcal{A}) - (\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathcal{A}$
- Então, ficamos com:

$$\mathcal{F} = -\nabla[q(\Phi - \mathbf{v} \cdot \mathcal{A})] - q\frac{d\mathcal{A}}{dt} \quad (7)$$

Formalismo Hamiltoniano da Interação Eletromagnética

- Definindo a energia potencial como sendo $U = q(\Phi - \mathbf{v} \cdot \mathcal{A})$, a força de Lorentz fica:

$$\mathcal{F} = -\nabla U - q \frac{d\mathcal{A}}{dt} \quad (8)$$

- A Lagrangiana que descreve o movimento da partícula sob a ação da força $\mathcal{F}$ é dada por:

$$\mathcal{L} = \mathcal{T} - q\Phi + q\mathbf{v} \cdot \mathcal{A} \quad (9)$$

- Tal qual, o momento conjugado é definido como

$$p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}$$

- Após uma transformação de Legendre, conseguimos expressar o Hamiltoniano desse sistema:

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2m} (\mathbf{p} - q\mathcal{A})^2 + q\Phi \quad (10)$$

Transformações de calibre - mecânica quântica

- Sabemos que os observáveis não se alteram quando fazemos uma mudança de **fase global** em nossa função de onda,

$$\psi(\mathbf{r}, t) \rightarrow \psi'(\mathbf{r}, t) \equiv e^{-i\lambda} \psi(\mathbf{r}, t) \quad (11)$$

- Quais são as consequências de uma mudança de **fase local** em nossa função de onda?

$$\psi(\mathbf{r}, t) \rightarrow \psi'(\mathbf{r}, t) \equiv e^{-i\lambda(\mathbf{r}, t)} \psi(\mathbf{r}, t) \quad (12)$$

- Claro que $|\psi'|^2 = |\psi|^2$, mas e a equação de Schrodinger? Utilizando a hamiltoniana obtida em 10,

$$\frac{1}{2m} (-i\hbar\nabla - q\mathcal{A})^2 \psi + q\Phi\psi = i\hbar\partial_t\psi \quad (13)$$

$$\boxed{\frac{1}{2m} (-i\hbar\nabla - q\mathcal{A}')^2 \psi' = (i\hbar\partial_t - q\Phi') \psi'} \quad (14)$$

Transformações de calibre - mecânica quântica

- Queremos encontrar quais as transformações $\mathcal{A}'$ e Φ' da equação 14 que deixem a equação de Schrodinger invariante.
  - Sejam: $\mathcal{A}' = \mathcal{A} + \xi_{\mathcal{A}}$ e $\Phi' = \Phi + \xi_{\Phi}$ tais que, para os campos $\mathcal{E}$ e $\mathcal{B}$ sejam invariantes, devemos ter

$$\nabla \times \xi_{\mathcal{A}} = 0 \quad (15)$$

$$\nabla \xi_{\Phi} + \frac{\partial \xi_{\mathcal{A}}}{\partial t} = 0 \quad (16)$$

- Substituindo $\mathcal{A}'$, Φ' e ψ' na equação 14, ficamos com:

$$\frac{1}{2m} (-i\hbar \nabla - q\mathcal{A} - q\xi_{\mathcal{A}})^2 \psi e^{-i\lambda} = (i\hbar \partial_t - q\Phi - q\xi_{\Phi}) \psi e^{-i\lambda} \quad (17)$$

Transformações de calibre - mecânica quântica

- Manipulando um pouco a equação 17, obtemos

$$\frac{1}{2m} (-i\hbar\nabla - q\mathcal{A} - q\xi_{\mathcal{A}} - \hbar\nabla\lambda)^2 \psi = (i\hbar\partial_t - q\Phi - q\xi_{\Phi} + \hbar\partial_t\lambda) \psi \quad (18)$$

- Logo, comparando as equações 18 e 13, para a equação de Schrodinger ser invariante devemos ter que:

$$\xi_{\mathcal{A}} = -\frac{\hbar}{q} \nabla\lambda \quad (19)$$

$$\xi_{\Phi} = \frac{\hbar}{q} \frac{\partial\lambda}{\partial t} \quad (20)$$

- Onde $\xi_{\mathcal{A}}$ e ξ_{Φ} satisfazem as condições 15 e 16.

Transformações de calibre - mecânica quântica

- Obtidas as transformações que deixam a equação de Schrodinger invariantes, $\xi_{\mathcal{A}}$ e ξ_{ϕ} , para encontrar a relação deles com o campo de calibre $\chi(\mathbf{r}, t)$, basta comparar as transformações $\mathcal{A}'$ e Φ' com as equações 4 e 3.
- Assim, obtemos que:

$$\boxed{\mathcal{A}' = \mathcal{A} + \nabla\chi}, \quad \boxed{\Phi' = \Phi - \partial_t\chi}, \quad \boxed{\lambda(\mathbf{r}, t) = -\frac{q}{\hbar}\chi(\mathbf{r}, t)} \quad (21)$$

- Portanto, a transformação de calibre é uma simetria da equação de Schrodinger - todos os observáveis permanecem os mesmos, independentemente da escolha dos potenciais EM e função de onda. Ou seja, as equações 13 e 14 são equivalentes.

Observáveis

- O único observável na teoria clássica do Eletromagnetismo é a força de Lorentz, que é descrita pelos campos elétricos e magnéticos.
- Podemos introduzir potenciais eletromagnéticos para simplificar os cálculos, porém eles não são observáveis com realidade física.
- Em contraste, na Mecânica Quântica, tais potenciais eletromagnéticos aparentam ser mais fundamentais que os campos. Mostraremos isso através do efeito Aharonov-Bohm.

Aharonov e Bohm

- O efeito dos potenciais EM em fenômenos quânticos foi proposto em 1959 por Yakir Aharonov e David Bohm.
- Entender o que acontece com a função de onda quando imersa em uma região livre de campos eletromagnéticos, porém com a presença dos potenciais.

Potencial $\mathcal{A}$ de um solenóide

- Vamos calcular o potencial vetor de um solenóide infinito, com n voltas por unidade de comprimento, raio R e que transporta uma corrente I .

- Se tentarmos calcular $\mathcal{A}$ por:

$$\mathcal{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\ell}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad (22)$$

chegaremos em uma divergência, pois o solenóide é infinito.

- Vamos usar o teorema de Stokes, dado que $\mathbf{B} = \nabla \times \mathcal{A}$

Potencial $\mathcal{A}$ de um solenóide

- Integrando em uma superfície S , temos que:

$$\iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \Phi_B = \iint_S (\nabla \times \mathcal{A}) \cdot d\mathbf{s}$$

- Usando o teorema de Stokes,

$$\oint_{\Gamma(S)} \mathcal{A} \cdot d\mathbf{l} = \Phi_B^S \quad (23)$$

Potencial $\mathcal{A}$ de um solenóide

- Superfície interna $\mathcal{S}_1$ ($\rho < R$)
  - $\Phi_B = \mu_0 n l \pi \rho^2$
  - $\mathcal{A} = \mathcal{A} \hat{e}_\phi$ e $d\ell = dl \hat{e}_\phi$
  - Então a equação 23 fica:

$$A 2\pi\rho = \mu_0 n l \pi \rho^2$$

$$\mathcal{A}_{in}(\rho) = \frac{\mu_0 n l}{2} \rho \hat{e}_\phi \quad (24)$$

- Superfície externa $\mathcal{S}_2$ ($\rho > R$)
  - $\Phi_B = \mu_0 n l \pi R^2$
  - $\mathcal{A} = \mathcal{A} \hat{e}_\phi$ e $d\ell = dl \hat{e}_\phi$
  - Então a equação 23 fica:

$$A 2\pi\rho = \mu_0 n l \pi R^2$$

$$\mathcal{A}_{out}(\rho) = \frac{\mu_0 n l}{2} \frac{R^2}{\rho} \hat{e}_\phi \quad (25)$$

Vemos que, mesmo não havendo campo magnético fora do solenóide, há potencial vetor!

O efeito Aharonov-Bohm

- Vamos considerar a dinâmica de uma partícula não-relativística que tem carga q na presença apenas de um campo magnético estático $\mathcal{B}(\mathbf{r})$
- Como $\mathcal{E} = 0$ e $\partial_t \mathcal{A} = 0$ então $\Phi = cte = 0$. Logo, a equação 13 fica somente

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \left(\nabla - \frac{iq}{\hbar} \mathcal{A} \right)^2 \psi = i\hbar \partial_t \psi \quad (26)$$

Aparato experimental - dupla fenda

- Região S e R são desconexas
- Região S: solenóide infinito ($\mathcal{B} \neq 0$)
- Região R: livre de campos ($\mathcal{B} = 0$)

O efeito Aharonov-Bohm

- Vamos supor que sabemos a solução $\psi_0(\mathbf{r}, t)$ da equação de Schrodinger para uma partícula livre ($\mathcal{A} = 0$)
- O que podemos falar sobre a solução $\psi(\mathbf{r}, t)$ da equação 26?
  - Se a partícula estiver confinada na região R, então a solução será dada por

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \exp\left[i\frac{q}{\hbar}\chi(\mathbf{r}, t)\right] \psi_0(\mathbf{r}, t) \quad (27)$$

- Como $\mathcal{B} = 0$ em R $\rightarrow \nabla \times \mathcal{A} = 0 \rightarrow \mathcal{A} = -\nabla\chi$
- Integrando de uma origem $\mathcal{O}$ até uma posição $\mathbf{r}$, e definindo $\chi(\mathcal{O}) = 0$

$$\chi(\mathbf{r}) = - \int_{\mathcal{O}, \mathcal{C}}^{\mathbf{r}} \mathcal{A}(\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{r}' \quad (28)$$

- Onde $d\mathbf{r}'$ é elemento de linha infinitesimal tangente a curva $\mathcal{C}$ que está na região R.

O efeito Aharonov-Bohm

- Sendo a partícula em questão o elétron ($q = -e$) e substituindo o resultado 28 em 27, ficamos com

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \exp \left[\frac{ie}{\hbar} \int_{\mathcal{O},c}^{\mathbf{r}} \mathcal{A}(\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{r}' \right] \psi_0(\mathbf{r}, t) \quad (29)$$

- A função de onda 29 satisfaz a equação 26

O efeito Aharonov-Bohm: finalmente

- Suporemos no nosso aparato experimental que um feixe coerente de elétrons com um comprimento de onda de De Broglie λ_e definido chegue à fenda dupla.
- Suporemos também que λ_e é muito maior que o diâmetro do solenóide, assim, os elétrons não o "enxergarão" e poderemos utilizar 27.
- Após passarem pelas fendas f_1 e f_2 (localizadas em $\mathbf{r}_1$ e $\mathbf{r}_2$, respectivamente), os elétrons atingirão a tela fotográfica em $\mathbf{r}_t$.
- A função de onda $\psi(\mathbf{r}_t, t)$ é dada pela superposição das ambas funções de ondas correspondentes a propagação pelas duas fendas.

$$\psi(\mathbf{r}_t, t) = e^{\frac{ie}{\hbar} \int_{\mathcal{O}, c_1}^{\mathbf{r}_t} \mathcal{A}(\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{r}'} \psi_1(\mathbf{r}_t, t) + e^{\frac{ie}{\hbar} \int_{\mathcal{O}, c_2}^{\mathbf{r}_t} \mathcal{A}(\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{r}'} \psi_2(\mathbf{r}_t, t) \quad (30)$$

O efeito Aharonov-Bohm: finalmente

- Podemos colocar um dos fatores de fase em evidência:

$$\psi = e^{\frac{ie}{\hbar} \int_{\mathcal{O}, c_2}^{\mathbf{r}_t} \mathbf{A}(\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{r}'} \left[\psi_2 + e^{\frac{ie}{\hbar} \left(\int_{\mathcal{O}, c_1}^{\mathbf{r}_t} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}' - \int_{\mathcal{O}, c_2}^{\mathbf{r}_t} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}' \right)} \psi_1 \right] \quad (31)$$

$$\psi = e^{\frac{ie}{\hbar} \int_{\mathcal{O}, c_2}^{\mathbf{r}_t} \mathbf{A}(\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{r}'} \left[\psi_2 + e^{\frac{ie}{\hbar} \left(\int_{\mathcal{O}, c_1}^{\mathbf{r}_t} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}' + \int_{\mathbf{r}_t, c_2}^{\mathcal{O}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}' \right)} \psi_1 \right] \quad (32)$$

$$\psi = e^{\frac{ie}{\hbar} \int_{\mathcal{O}, c_2}^{\mathbf{r}_t} \mathbf{A}(\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{r}'} \left[\psi_2 + e^{\frac{ie}{\hbar} \oint_{\mathcal{C}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}'} \psi_1 \right] \quad (33)$$

- Onde, $\mathcal{C}$ é um contorno fechado que liga $\mathcal{O} - \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_t - \mathbf{r}_2 - \mathcal{O}$ e se encontra puramente na região R.
- Aqui se encontra a surpresa, utilizando o teorema de Stokes,

$$\oint_{\mathcal{C}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}' = \iint_{S(\mathcal{C})} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \Phi_{\mathbf{B}}^S \equiv \Phi \quad (34)$$

O efeito Aharonov-Bohm: finalmente

- S é a superfície cujo contorno é dado por $\mathcal{C}$ e ds é um elemento infinitesimal de área de S .
- Por mais que $\mathcal{C}$ se encontra na região livre de campos (região R), a superfície S é "perfurada" pelo campo magnético do solenóide.
- Portanto, a função de onda na tela é dado por

$$\psi(\mathbf{r}_t, t) = e^{\frac{ie}{\hbar} \int_{\mathcal{C}, c_2}^{\mathbf{r}_t} \mathcal{A} \cdot d\mathbf{r}'} \left[\psi_2(\mathbf{r}_t, t) + e^{\frac{ie}{\hbar} \Phi} \psi_1(\mathbf{r}_t, t) \right] \quad (35)$$

- A probabilidade de achar um elétron em um volume infinitesimal na posição da tela é dada por:

$$P(\mathbf{r}_t, t) = |\psi(\mathbf{r}_t, t)|^2 dV = |\psi_2(\mathbf{r}_t, t) + e^{\frac{ie}{\hbar} \Phi} \psi_1(\mathbf{r}_t, t)|^2 dV \quad (36)$$

- Observa-se da equação 36 que, caso não haja corrente no solenóide, então o padrão de interferência será dado por $|\psi_1 + \psi_2|^2$. Quando liga-se uma corrente, haverá um deslocamento das franjas de interferência.

Conclusão

- Vimos que existem propriedades interessantes para o potencial vetor magnético no regime quântico .
- Ao contrário da mecânica clássica, existem efeitos dos potenciais em partículas carregadas, mesmo em regiões onde os campos (e portanto as forças na partícula) são nulos .
- A simetria de calibre articula como os potenciais EM devem se acoplar com as funções de ondas que descrevem partículas.

Referências

- <https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.115.485>
- <https://arxiv.org/pdf/2010.12010.pdf>
- *Quantum Mechanics applied to Atoms and Light*, Ph. W. Courteille, IFSC/USP