



AVALIAÇÃO DO ÚBERE DAS VACAS LEITEIRAS



Prof. Titto, 2021







Figura 2-10. Principais regiões e tecidos que compõem o úbere.










































Úbere Posterior

Altura

- Distância entre a ponta da vulva e inserção posterior



9 - Extremamente alto
5 - Intermediário (27cm)



1 - Extremamente baixo (36cm)

Largura

- Largura do úbere na sua inserção posterior



9 - Extremamente largo (20cm)
5 - Intermediário (15cm)



1 - Extremamente estreito (8cm)

Colocação das Tetas

- Qualidade do Tecido Mamário

9 - Extremamente Macio
5 - Intermediário
1 - Extremamente Fraco

Ligamento Suspensório Mediano

- Profundidade da Clivagem



9 - Extremamente forte
5 - Intermediário



1 - Extremamente fraco

Defeitos opcionais:

- Descompensado; Curto; Fora de prumo; Recuados; Palmípede; Cego

Colocação das Tetas

- Implantação da base das tetas nos quartos




9 - Base das tetas junto ao ligamento central
5 - Base das tetas no centro dos quartos



1 - Base das tetas na periferia externa

Profundidade

- Altura do piso do úbere em relação à ponta do jarrete



9 - Extremamente raso
5 - Intermediário (10cm)



1 - Extremamente Profundo

Úbere Anterior

Inserção

- Força do ligamento na parede do abdômen




9 - Extremamente forte
5 - Intermediário



1 - Extremamente fraco

Comprimento das Tetas



9 - Extremamente longa
5 - Intermediária



1 - Extremamente curta

Defeitos opcionais:

- Bojudo; Pesado; Descompensado; Curto; Fora do Prumo; Palmípede; Cego

Glândula Mamária – Úbere


Úbere: alto, largo, comprido, simétrico, com piso nivelado e bem irrigado.

Tetos: centralizados, médios e simétricos.

Ligamentos: fortes.

*Forma, volume, textura, ligamentos, irrigação

Vaca Holandesa - HPB



Vaca Holandesa - HVB



Vaca Jersey

