Estrutura de líquidos

espalhamento de radiação - física estatística da
organização molecular

Vera Bohomoletz Henriques

BioLat group

Instituto de Física USP

3 de maio de 2022

Experimento e interpretação

$$I(\theta, R, t; \omega) = \varepsilon_0 c \frac{\overline{A^2}(\theta, \omega)}{R^2} [F(q)F^*(q)][P(q)P^*(q)],$$

FORMA ESTRUTURA

Fator de **ESTRUTURA**

$$S(q) \equiv \frac{1}{N} \left\langle \sum_{i=1}^{i=N} \sum_{j=1}^{j=N} e^{i\vec{q} \cdot (\vec{R}_i - \vec{R}_j)} \right\rangle,$$

N partículas (átomos, moléculas, agregados moleculares)

Algumas definições e alguns "truques"

Fator de **ESTRUTURA**

$$S(q) \equiv \frac{1}{N} \left\langle \sum_{i=1}^{i=N} \sum_{j=1}^{j=N} e^{i\vec{q} \cdot (\vec{R}_i - \vec{R}_j)} \right\rangle,$$

N partículas (átomos, moléculas, agregados moleculares)

$$S(q) \equiv \frac{1}{N} \left\langle \sum_{i=1}^{i=N} \sum_{\substack{j=1 \\ j=i}}^{j=N} 1 + \sum_{i=1}^{i=N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{j=N} e^{i\vec{q} \cdot (\vec{R}_i - \vec{R}_j)} \right\rangle$$

$$= 1 + \frac{1}{N} \sum_{i \neq j} \int_V d\vec{r} \langle \delta(\vec{r} - \vec{R}_i - \vec{R}_j) \rangle e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}},$$

Função $g(r)$ descreve a probabilidade de encontrarmos duas partículas i e j a uma distância r

$$g(r) = \frac{V}{N(N-1)} \left\langle \sum_{i \neq j} \delta(\vec{r}_i - \vec{r}_j - \vec{r}) \right\rangle$$

média sobre
configurações

modelo!

Experimento mede interferência de ondas espalhadas, com dados de $S(q)$ por partículas que possuem posições médias descritas por $g(r)$

$$g(r) = \frac{V}{N(N-1)} \left\langle \sum_{i \neq j} \delta(\vec{R}_i - \vec{R}_j - \vec{r}) \right\rangle$$

$$S(q) = 1 + \frac{1}{N} \sum_{i \neq j} \int_V d\vec{r} \langle \delta(\vec{r} - \vec{R}_i - \vec{R}_j) \rangle e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}}$$

$$S(q) = 1 + \frac{N-1}{V} \sum_{i \neq j} \int_V d\vec{r} g(r) e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}} = 1 + \frac{N}{V} \int_V d\vec{r} g(r) e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}}$$

experimento

teoria

Exercício

$$g(\mathbf{r}) = \frac{V}{N(N-1)} \left\langle \sum_{i \neq j} \delta(\vec{R}_i - \vec{R}_j - \vec{r}) \right\rangle$$

- Considere o modelo de gás de rede, com 4 células e 2 partículas. Obtenha $g(1)$ e $g(\sqrt{2})$
- Represente em um gráfico $g(r)$ para $T \rightarrow 0$, $T \rightarrow \infty$ e para alguma temperatura intermediária.

Mais definições e "truques"

$$g(r) = \frac{V}{N(N-1)} \left\langle \sum_{i \neq j} \delta(\vec{r}_i - \vec{r}_j - \vec{r}) \right\rangle$$

Médias sobre configurações

definição $\langle X \rangle = \int_V d\vec{r}_1 \int_V d\vec{r}_2 \dots \int_V d\vec{r}_N X \frac{e^{-\beta \sum_{i < j} u(r_{ij})}}{Z(T, V, N)}$

truque

$$\langle X \rangle = \int_V d\vec{r}_1 \int_V d\vec{r}_{21} X e^{-\beta u(r_{12})} \int_V d\vec{r}_{31} \dots \int_V d\vec{r}_{N1} X \frac{e^{-\beta \sum_{i < j, (i,j) \neq (1,2)} u(r_{ij})}}{Z(T, V, N)}$$

Algumas definições e alguns "truques"

$$g(\mathbf{r}) = \frac{V}{N(N-1)} \left\langle \sum_{i < j} \delta(\vec{r}_i - \vec{r}_j - \vec{r}) \right\rangle$$

sistema homogêneo

$$\left\langle \delta(\vec{r}_1 - \vec{r}_2 - \vec{r}) \right\rangle$$

$$= \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i \neq j} \left\langle \delta(\vec{r}_i - \vec{r}_j - \vec{r}) \right\rangle = \left\langle \delta(\vec{r}_3 - \vec{r}_2 - \vec{r}) \right\rangle = \dots$$

$$g(\mathbf{r}) = V \left\langle \delta(\vec{r}_1 - \vec{r}_2 - \vec{r}) \right\rangle$$

juntando

$$g(\mathbf{r}) = \frac{V}{N(N-1)} \left\langle \sum_{i \neq j} \delta(\vec{r}_i - \vec{r}_j - \vec{r}) \right\rangle$$

• sistema homogêneo $g(\mathbf{r}) = V \langle \delta(\vec{r}_1 - \vec{r}_2 - \vec{r}) \rangle$

• média sobre configurações de X qualquer

$$\langle X \rangle = V \int_V d\vec{r}_{21} X e^{-\beta u(r_{12})} \int_V d\vec{r}_{31} \dots \int_V d\vec{r}_{N1} X \frac{e^{-\beta \sum_{i < j, (i,j) \neq (1,2)} u(r_{ij})}}{Z(T, V, N)}$$

$$g(\mathbf{r}) = V^2 e^{-\beta u(r)} \int_V d\vec{r}_{31} \dots \int_V d\vec{r}_{N1} \frac{e^{-\beta \sum_{i < j, (i,j) \neq (1,2)} u(r_{ij})}}{Z(T, V, N)}$$

o problema teórico:

$$g(\mathbf{r}) = V^2 e^{-\beta u(r_{12})} \int_V d\vec{r}_{31} \dots \int_V d\vec{r}_{N1} \frac{e^{-\beta \sum_{i < j, (i,j) \neq (1,2)} u(\mathbf{r}_{ij})}}{Z(T, V, N)}$$

- Propor $u(\mathbf{r}_{ij})$
- Calcular $g(\mathbf{r})$

uma aproximação para $g(r)$:

$$g(r) = V^2 e^{-\beta u(r)} \int_V d\vec{r}_{31} \dots \int_V d\vec{r}_{N1} \frac{e^{-\beta \sum_{i<j, (i,j) \neq (1,2)} u(r_{ij})}}{Z(T, V, N)}$$

Mais um "truque!"

$e^{-\beta u(r_{ij})} = 1 + f(r_{ij})$, f é a função de Mayer

Em que situações podemos desprezar f ?

$$e^{-\beta \sum_{i<j} u(r_{ij})} = \prod_{i<j} [1 + f(r_{ij})]$$

$$Z(T, V, N) = \int_V d\vec{r}_1 \int_V d\vec{r}_2 \dots \int_V d\vec{r}_N e^{-\beta \sum_{i<j} u(r_{ij})} = \int_V d\vec{r}_1 \int_V d\vec{r}_2 \dots \int_V d\vec{r}_N \prod_{i<j} [1 + f(r_{ij})]$$

Exercício:

$$g(\mathbf{r}) = V^2 e^{-\beta u(\mathbf{r})} \int_V d\vec{r}_{31} \dots \int_V d\vec{r}_{N1} \frac{e^{-\beta \sum_{i < j, (i,j) \neq (1,2)} u(\mathbf{r}_{ij})}}{Z(T, V, N)}$$

aproximação com uso da função de Mayer $f_{ij} \approx e^{-\beta u_{ij}} - 1$,

- Use a aproximação de Mayer em ordem mais baixa para o cálculo do integrando – tanto para a exponencial, quanto para a função de partição
- Desenhe gráficos do potencial e de $g(\mathbf{r})$ para o potencial de esferas duras (parâmetro σ) e para o potencial de poço quadrado (parâmetros σ , $\alpha\sigma$ e ε)

Séries e “aglomerados” para cálculo de $g(\mathbf{r})$

$$g(\mathbf{r}) = e^{-\beta u(\mathbf{r})} \left\{ \frac{V^2}{Z(T, V, N)} \int_V d\vec{r}_{31} \dots \int_V d\vec{r}_{N1} e^{-\beta \sum_{i < j, (i,j) \neq (1,2)} u(r_{ij})} \right\}$$

I

$$g(\mathbf{r}) = e^{-\beta u(\mathbf{r})} \mathbf{I}$$

Desenvolvendo a série em aglomerados....

$$I = \frac{V^2}{Z(T, V, N)} \int_V d\vec{r}_{31} \dots \int_V d\vec{r}_{N1} \prod_{\substack{i < j \\ (i,j) \neq (1,2)}} [1 + f_{ij}]$$

$$\int_V d\vec{r}_{31} \dots \int_V d\vec{r}_{N1} \prod_{\substack{i < j \\ (i,j) \neq (1,2)}} [1 + f_{ij}]$$

$$= \int_V d\vec{r}_{31} \dots \int_V d\vec{r}_{N1} \left\{ 1 + \sum_{\substack{i \neq j \\ (i,j) \neq (1,2)}} f_{ij} + \sum_{\substack{i < j \\ (i,j) \neq (1,2)}} \sum_{\substack{k < l \\ (k,l) \neq (1,2)}} f_{ij} f_{kl} + o(f^3) \right\}$$

Vamos colocar índices nas partículas dos agregados?