Lista 5 - Eletroquímica

(Data de Entrega: 20/07/2022)

1. Sobre o elemento galvânico: $Zn_{(s)}^0 / Zn_{(aq)}^{2+} // Cu_{(aq)}^{2+} / Cu_{(s)}^0$, conhecido como Pilha de Daniell, responda o que se pede. **(1,6)(0.2 cada)**

(Dados: $E_{Zn_{(aq)}^{2+}/Zn_{(s)}^0}^0 = -0,76 V$, $E_{Cu_{(aq)}^{2+}/Cu_{(s)}^0}^0 = +0,34 V$)

- Escreva a meia reação de oxidação
- Escreva a meia reação de redução
- Escreva a reação global
- Quais os pólos negativo e positivo?
- Quais são o anodo e o cátodo?
- Qual placa tem aumento de massa e qual sofre corrosão?
- Qual o valor de ΔE^0 ?
- O dispositivo, nas condições padrão, é espontâneo no seu sentido direto?

2. Para se revestir com níquel uma peça de determinado metal, um sal de níquel foi submetido à eletrólise em meio aquoso. Sabendo que, após 20 minutos desde o início do processo, observou-se a deposição de 5,87 g de níquel sobre a peça metálica, indique o valor em ampères da corrente elétrica utilizada. **(1.3)**

(Dados: $1 F = 96500 C$, $Ni: 58.7 g/mol$)

3. O ar atmosférico úmido ou a água aerada têm alta capacidade oxidante, seu simples contato com a maioria dos metais provoca oxidação. Um desses metais, muito usado na construção de maquinários, barcos e diversas ferramentas, é o ferro. A reação que ocorre a partir do contato desse metal com o ar atmosférico úmido é descrita abaixo.

Meia reação de oxidação:

Meia reação de redução:

Reação global:

A partir dos dados informados e dos seus conhecimentos em eletroquímica, responda o que se pede. **(0.8)**

- a) Indique 3 metais que poderiam ser usados como metais de sacrifício para a proteção do ferro. *(0.6)*
- b) Cite outro método útil para a proteção anticorrosiva de metais. *(0.2)*

4. Analise a reação de uma dada célula eletroquímica:

Realizando a reação, observou-se que, nas seguintes condições apresentadas abaixo, a força eletromotriz da célula representada era de 0,64 V.

I. $[\text{Zn}_{(aq)}^{2+}] = 1 \text{ mol/L}$

II. $P(\text{H}_{2(g)}) = 1 \text{ bar}$

III. $T = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$

A partir dos dados apresentados e da equação de Nernst, calcule o pH da solução na situação descrita. **(1.3)**

5. Partindo do conceito de termodinâmica do trabalho de não expansão, demonstre como podemos chegar na equação $\Delta G^{\circ} = -nFE$. Em seguida, utilize essa equação para calcular qual seria o ΔG° da reação da Questão 1. O valor de ΔG° encontrado está de acordo com relação à espontaneidade ou não da reação encontrado no item h) da Questão 1?

6. Soluções ácidas de permanganato em água e soluções ácidas de dicromato são agentes oxidantes poderosos. Suponha que soluções dos dois reagentes foram preparadas e serviram como duas meias-células em uma célula galvânica com eletrodos de platina que gera uma corrente elétrica em um circuito externo.

- (a) Determine o potencial padrão da célula;
- (b) Escreva as semi-reações de redução e oxidação e a equação global balanceada.

7. Calcule o K_{ps} do $AgCl$ em água a $25\text{ }^{\circ}C$, considerando as semi-reações:

8. Uma forma de se obter alumínio da natureza é pela eletrólise de seu óxido dissolvido em criolita, Na_3AlF_6 . Encontre a massa de alumínio que será produzida em 1 dia em uma célula que opera continuamente com uma corrente de 100.000 A , considerando que a criolita não reage.