COMPARAÇÃO DE PERFIS DE DISSOLUÇÃO

Profa. Associada Sílvia Storpirtis

***Faculdade de Ciências Farmacêuticas
da Universidade de São Paulo (USP)***

ENSAIOS DE DISSOLUÇÃO PARA FORMAS FARMACÊUTICAS SÓLIDAS ORAIS DE LIBERAÇÃO IMEDIATA (FFSOLI)

- **ABSORÇÃO DE FÁRMACOS A PARTIR DE FFSOLI DEPENDE DE:**
 - *Liberção*
 - *Dissolução do Fármaco nos Líquidos do TGI*
 - *Permeabilidade*
- **ENSAIOS DE DISSOLUÇÃO:**
 - *Garantir a Qualidade*
 - *Orientar o Desenvolvimento Farmacotécnico*
 - *Assegurar a Manutenção da Bioequivalência quando Alterações Pós-Registro são necessárias - Evitar realização de novo ensaio in vivo*

- **PARA A DEFINIÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DE DISSOLUÇÃO DEVE-SE CONSIDERAR:**
 - SOLUBILIDADE
 - PERMEABILIDADE
 - PROCESSO / CINÉTICA DE DISSOLUÇÃO
 - FARMACOCINÉTICA
- **PARA REGISTRO DE MEDICAMENTOS INOVADORES:**
 - DISSOLUÇÃO, BIODISPONIBILIDADE E CORRELAÇÃO IVIV (BILOTE)
- **PARA REGISTRO DE MEDICAMENTOS MULTIFONTES (GENÉRICOS E SIMILARES):**
 - ESTABELECEM AS ESPECIFICAÇÕES DE DISSOLUÇÃO CONSIDERANDO OS PERFIS DE DISSOLUÇÃO DO LOTE UTILIZADO NO ESTUDO DE BIOEQUIVALÊNCIA

APLICAÇÕES IMPORTANTES

- ***SUBSTITUIÇÃO DA BIOEQUIVALÊNCIA***

- *Menores concentrações (FFS) quando a Bioequivalência foi demonstrada com a maior concentração*

- ***BIOISENÇÕES***

- *Considerando-se o Sistema de Classificação Biofarmacêutica*

COMPARAÇÃO DE PERFIS DE DISSOLUÇÃO

MÉTODO MODELO INDEPENDENTE

**FATOR DE
DIFERENÇA**

f_1

0 a 15

**FATOR DE
SEMELHANÇA**

f_2

50 a 100

FATOR DE DIFERENÇA - f_1

Porcentagem de diferença entre os dois perfis avaliados - cada tempo corresponde a uma medida do erro relativo entre os perfis

$$f_1 = \left\{ \left[\sum_{t=1}^n |R_t - T_t| \right] \div \left[\sum_{t=1}^n R_t \right] \right\} \times 100$$

n = n° de tempos

R_t = % dissolvida - tempo t (formulação referência)

T_t = % dissolvida - tempo t (formulação teste)

FATOR DE SEMELHANÇA - f_2

Medida da semelhança - % dissolvida - entre os perfis

$$f_2 = 50 \times \log \left\{ \left[1 + (1/n) \sum_{t=1}^n (R_t - T_t)^2 \right]^{-0,5} \times 100 \right\}$$

n = nº de tempos

R_t = % dissolvida - tempo t (formulação referência)

T_t = % dissolvida - tempo t (formulação teste)

PROCEDIMENTO GERAL E CRITÉRIO

- 1. Determinar o perfil de dissolução:
Teste e Referência com 12 unidades de cada
em condições idênticas**
- 2. Tempos: mínimo 05**
- 3. Incluir somente 01 (um) ponto após 85%**
- 4. Para permitir o uso de valores médios os CV
para os primeiros pontos não devem ser
maiores do que 20% (para os demais, máximo
10%)**

Avaliação do perfil de dissolução de comprimidos de hidroclorotiazida comercializados no Brasil

Mahle, F.¹; Goelzer, F.¹; Adriano, J.¹; Felipe, M.¹; Vier, N.¹; Carli, R.B.G.^{1,2}; Rosa, T.¹; Couto, A.G.¹; Lucinda-Silva, R.M.^{1*}

¹Curso de Farmácia, Centro de Ciências da Saúde, Núcleo de Investigações Químico-Farmacêuticas, NIQFAR, Universidade do Vale do Itajaí, UNIVALI, Itajaí, SC, Brasil

²Curso de Farmácia, União de Ensino do Sudoeste do Paraná, UNISEP, Dois Vizinhos, PR, Brasil

Figura 1. Perfil de dissolução das formulações contendo hidroclorotiazida. R (referência); S (similar); genéricos (G1 e G2).

Tabela 3 - Fatores de diferença (f_1) e de similaridade (f_2) dos comprimidos de hidroclorotiazida similar (S) e genéricos (G1 e G2), em relação ao referência (R).

Grupos	f_1	f_2
R x S	11,94	55,79
R x G1	5,75	68,52
R x G2	0,70	65,62

ASPECTOS RELEVANTES

- **Quando o método não está na Farmacopéia**
 - Desenvolvimento e validação do método
 - Recomendado: 3 meios distintos em pH fisiológico
- **Quando a dissolução é muito rápida**
 - Não se aplica o cálculo de f_2
- **Pontos Críticos**
 - Utilizar tensoativo e velocidade de agitação de 100 rpm (aparato 2) sem justificativa adequada
 - Alteração de condições descritas na Farmacopéia sem justificativa adequada
 - Utilizar meio com pH que não é fisiológico
 - Critério para seleção do meio

BIBLIOGRAFIA

MARQUES, M.R.C. - Dissolução de Medicamentos. In: STORPIRTIS, S. et al. – Biofarmacotécnica - Coleção Ciências Farmacêuticas. Ed. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, cap. 7, p. 96 – 108, 2.009.

NOORY C, TRAN N, OUDERKIRK L, SHAH V. - Steps for development of a dissolution test for sparingly water-soluble drug products. Dissol Tech 2.000, 7(1): 16 – 21.

BROWN CK, CHOKSHI HP, NICKERSON B, REED RA, ROHRS BR, SHAH PJ. Acceptable analytical practices for dissolution testing of poorly soluble compounds. Pharm . Technol. Feb 2.004, 56 – 65.

PARK SH, CHOI HK. The effects of surfactants on the dissolution profiles of poorly water-soluble acidic drugs. Int J Pharm 2.006, 321: 35 – 41.