Física dos Materiais – 4300502

1º Semestre de 2016

Instituto de Física
Universidade de São Paulo

Professor: **Luiz C C M Nagamine**

E-mail: nagamine@if.usp.br

Fone: **3091.6877**

homepage <http://disciplinas.stoa.usp.br/course/view.php?id=10070>

Física dos Materiais

Modelo atômico de Bohr

- 1) Núcleo com Z prótons + neutrons
- 2) Eletrosfera com ~Z elétrons em órbitas (ou camadas eletrônicas), apenas uma variável (n => energia)

$$F = \frac{kZe^2}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

Fig. 2.1 Representação esquemática do átomo de Bohr.

Fig. 2.3 Comparação entre os modelos atômicos de (a) Bohr e (b) mecânico-ondulatório em termos de distribuição eletrônica. (Adaptado de Z. D. Jastrzebski, *The Nature and Properties of Engineering Materials*, 3. ed., p. 4. Copyright © 1987 de John Wiley & Sons, New York.

Modelo Atômico de Bohr - Postulados:

1. na eletrosfera os elétrons não se encontram em qualquer posição: órbitas fixas e com energia definida. As órbitas são chamadas camadas eletrônicas, representadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q a partir do núcleo, ou níveis de energia representados pelos números 1, 2, 3, 4...;
2. os elétrons ao se movimentarem numa camada eletrônica não absorvem nem emitem energia;
3. os elétrons de um átomo tendem a ocupar as camadas eletrônicas mais próximas do núcleo, isto é, as que apresentam menor energia;
4. um átomo está no estado fundamental quando seus elétrons ocupam as camadas menos energéticas;
5. quando um átomo recebe energia, o elétron pode saltar para uma camada mais externa (mais energética). Nessas condições o átomo se torna instável. Dizemos que o átomo se encontra num estado excitado;

Estrutura atômica

Modelo ondulatório (quântico)

1) Núcleo com Z prótons + neutrons

2) Eletrosfera com $\sim Z$ elétrons em orbitais (com camadas e sub-camadas eletrônicas), quatro números quânticos n , l , m_l e m_s (envolvendo energia, momento angular, projeção do momento angular e projeção do spin)

Seqüência de níveis Energéticos

É importante conhecer a seqüência segundo a qual os níveis energéticos são preenchidos. A figura ao lado constitui um auxílio útil. Vêja-se pela figura que a seqüência de preenchimento dos níveis energéticos é: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, etc.

Fig. 2.4 Representação esquemática das energias relativas dos elétrons para as várias camadas e subcamadas. (Extraído de K. M. Ralls, T. H. Courtney e J. Wulff, *Introduction to Materials Science and Engineering*, p. 22. Copyright © 1976 de John Wiley & Sons, New York. Re-

Estrutura atômica

Modelo ondulatório (quântico)

Eléctrosfera com $\sim Z$ elétrons em orbitais (com camadas e sub-camadas eletrônicas), quatro números quânticos n , l , m_l e m_s (envolvendo energia, momento angular, projeção do momento angular e projeção do spin)

$$l = 0$$

$$s$$

Os Níveis Eletrônicos de Energia

- **Orbitais:** correspondem aos estados individuais que podem ser ocupados por um elétron em um átomo. Cada orbital no átomo acomoda no máximo dois elétrons.

- **Spin Eletrônico:** é uma propriedade dos elétrons. Quando há dois elétrons no mesmo orbital, seus spins estão em direções opostas.

- **Subcamadas:** Os orbitais em um átomo são agrupados em conjuntos chamados subcamadas. Em átomos no seu estado fundamental quatro tipos de subcamadas são ocupadas por elétrons, designadas por s, p, d e f, que consistem em 1, 3, 5 e 7 orbitais, respectivamente.

- **Camadas:** Um agrupamento de subcamadas é denominado camada. Todos os elétrons em uma dada camada estão a mesma distância média do núcleo. Dois métodos equivalentes são normalmente utilizados para a designação das camadas: K, L, M, N etc.; isto é, a primeira camada ($n=1$) é denominada camada K, a segunda camada ($n=2$) é L, e assim por diante.

O Princípio da Exclusão de Pauli

Para definir um orbital são necessários três números quânticos n , l e m . Cada orbital pode conter dois elétrons, desde que eles tenham spins opostos. Um número quântico adicional é necessário para definir o spin de um elétron no orbital. Portanto, são necessários quatro números quânticos para definir a energia de um elétron num átomo. O Princípio da Exclusão de Pauli diz que os dois elétrons de um orbital não podem ter iguais os quatro números quânticos.

Para mostrar a posição dos elétrons num átomo, usam-se os símbolos 1s, 2s, 2p, etc. para indicar o nível energético principal e o subnível. Um índice indica o número de elétrons em cada série de orbitais. Por exemplo, o hidrogênio contém 1 elétron, o que se indica por $1s^1$. No hélio, o nível 1s contém 2 elétrons, o que se indica por $1s^2$

As estruturas eletrônicas podem ser escritas como abaixo:

Uma maneira alternativa de representar a estrutura eletrônica de um átomo é representar os orbitais por quadrados e os elétrons por pequenas setas:

name	symbol	orbital meaning	range of values	value example
principal quantum number	n	shell	$1 \leq n$	$n = 1, 2, 3 \dots$
azimuthal quantum number (angular momentum)	l	subshell (s orbital is listed as 0, p orbital as 1 etc.)	$(0 \leq l \leq n - 1)$	for $n = 3$: $l = 0, 1, 2 (s, p, d)$
magnetic quantum number, (projection of angular momentum)	m_l	energy shift (orientation of the subshell's shape)	$-l \leq m_l \leq l$	for $l = 2$: $m_l = -2, -1, 0, 1, 2$
spin projection quantum number	m_s	spin of the electron (-1/2 = counter-clockwise, 1/2 = clockwise)	$-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$	for an electron, either: $-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$

Tabela 2.1 O Número de Estados Eletrônicos Disponíveis em Algumas Camadas e Subcamadas Eletrônicas

<i>Número Quântico Principal n</i>	<i>Designação da Camada</i>	<i>Subcamadas</i>	<i>Número de Estados</i>	<i>Número de Elétrons</i>	
				<i>Por Subcamadas</i>	<i>Por Camada</i>
1	<i>K</i>	<i>s</i>	1	2	2
		<i>s</i>	1	2	
2	<i>L</i>	<i>p</i>	3	6	8
		<i>s</i>	1	2	
3	<i>M</i>	<i>p</i>	3	6	18
		<i>d</i>	5	10	
4	<i>N</i>	<i>s</i>	1	2	32
		<i>p</i>	3	6	
		<i>d</i>	5	10	
		<i>f</i>	7	14	

Exercício: Dar a configuração eletrônica para Fe³⁺.

Fe: Z=26

Estrutura atômica

Tabela 2.2 Uma Listagem das Configurações Eletrônicas Esperadas Para Alguns dos Elementos Comuns^a

Elemento	Símbolo	Número Atômico	Configuração Eletrônica
Hidrogênio	H	1	$1s^1$
Hélio	He	2	$1s^2$
Lítio	Li	3	$1s^2 2s^1$
Berílio	Be	4	$1s^2 2s^2$
Boro	B	5	$1s^2 2s^2 2p^1$
Carbono	C	6	$1s^2 2s^2 2p^2$
Nitrogênio	N	7	$1s^2 2s^2 2p^3$
Oxigênio	O	8	$1s^2 2s^2 2p^4$
Flúor	F	9	$1s^2 2s^2 2p^5$
Neônio	Ne	10	$1s^2 2s^2 2p^6$
Sódio	Na	11	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
Magnésio	Mg	12	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
Alumínio	Al	13	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$
Silício	Si	14	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$
Fósforo	P	15	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$
Enxofre	S	16	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$
Cloro	Cl	17	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
Argônio	Ar	18	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
Potássio	K	19	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$
Cálcio	Ca	20	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$
Escândio	Sc	21	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^1 4s^2$
Titânio	Ti	22	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^2 4s^2$
Vanádio	V	23	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3 4s^2$
Cromo	Cr	24	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$
Manganês	Mn	25	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^2$
Ferro	Fe	26	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$
Cobalto	Co	27	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^7 4s^2$
Níquel	Ni	28	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^8 4s^2$
Cobre	Cu	29	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$
Zinco	Zn	30	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2$
Gálio	Ga	31	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^1$
Germânio	Ge	32	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^2$
Arsênio	As	33	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^3$
Selênio	Se	34	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^4$
Bromo	Br	35	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^5$
Criptônio	Kr	36	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6$

Elétrons de valência

Algumas subversões !

^aQuando alguns elementos se ligam covalentemente, eles formam ligações híbridas *sp*. Isto é especialmente verdadeiro para os átomos de C, Si e Ge.

Alcalinos

Halogênios

Alcalinos terrosos

IA		Metals de transição										Halogenios						0	
1	2											3	4	5	6	7	8	9	10
H	He											B	C	N	O	F	Ne		
1.0080	4.0026											10.811	12.011	14.007	15.999	18.998	20.183		
3	4											13	14	15	16	17	18		
Li	Be											Al	Si	P	S	Cl	Ar		
6.939	9.0122											26.982	28.086	30.974	32.064	35.453	39.948		
11	12	IIIB	IVB	VB	VIB	VII B	VIII			IB	IIB								
Na	Mg						26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
22.990	24.312						Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr		
39.102	40.08	44.956	47.90	50.942	51.996	54.938	55.847	58.933	58.71	63.54	65.37	69.72	72.59	74.922	78.96	79.91	83.80		
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe		
85.47	87.62	88.91	91.22	92.91	95.94	(99)	101.07	102.91	106.4	107.87	112.40	114.82	118.69	121.75	127.60	126.90	131.30		
55	56	Rare earth series	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86		
Cs	Ba		Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn		
132.91	137.34		178.49	180.95	183.85	186.2	190.2	192.2	195.09	196.97	200.59	204.37	207.19	208.98	(210)	(210)	(222)		
87	88	Actinide series																	
Fr	Ra																		
(223)	(226)																		

Key

- 29 ← Atomic number
- Cu ← Symbol
- 63.54 ← Atomic weight

- Metal
- Nonmetal
- Intermediate

Rare earth series

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138.91	140.12	140.91	144.24	(145)	150.35	151.96	157.25	158.92	162.50	164.93	167.26	168.93	173.04	174.97

Actinide series

89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lw
(227)	232.04	(231)	238.03	(237)	(242)	(243)	(247)	(247)	(249)	(254)	(253)	(256)	(254)	(257)

FIGURE 2.6 The periodic table of the elements. The numbers in parentheses are the atomic weights of the most stable or common isotopes.

Eletronegatividade

IA 1 H 2,1																		0 2 He -
3 Li 1,0	IIA 4 Be 1,5											III A 5 B 2,0	IV A 6 C 2,5	V A 7 N 3,0	VIA 8 O 3,5	VII A 9 F 4,0	10 Ne -	
11 Na 0,9	12 Mg 1,2	IIIB	IVB	VB	VIB	VII B	VIII			IB	IIB	13 Al 1,5	14 Si 1,8	15 P 2,1	16 S 2,5	17 Cl 3,0	18 Ar -	
19 K 0,8	20 Ca 1,0	21 Sc 1,3	22 Ti 1,5	23 V 1,6	24 Cr 1,6	25 Mn 1,5	26 Fe 1,8	27 Co 1,8	28 Ni 1,8	29 Cu 1,9	30 Zn 1,6	31 Ga 1,6	32 Ge 1,8	33 As 2,0	34 Se 2,4	35 Br 2,8	36 Kr -	
37 Rb 0,8	38 Sr 1,0	39 Y 1,2	40 Zr 1,4	41 Nb 1,6	42 Mo 1,8	43 Tc 1,9	44 Ru 2,2	45 Rh 2,2	46 Pd 2,2	47 Ag 1,9	48 Cd 1,7	49 In 1,7	50 Sn 1,8	51 Sb 1,9	52 Te 2,1	53 I 2,5	54 Xe -	
55 Cs 0,7	56 Ba 0,9	57-71 La-Lu 1,1-1,2	72 Hf 1,3	73 Ta 1,5	74 W 1,7	75 Re 1,9	76 Os 2,2	77 Ir 2,2	78 Pt 2,2	79 Au 2,4	80 Hg 1,9	81 Tl 1,8	82 Pb 1,8	83 Bi 1,9	84 Po 2,0	85 At 2,2	86 Rn -	
87 Fr 0,7	88 Ra 0,9	89-102 Ac-No 1,1-1,7																

Fig. 2.7 Os valores de eletronegatividade para os elementos. (Adaptado de Linus Pauling, *The Nature of the Chemical Bond*, 3.^a ed. Copyright 1939 e 1940, copyright da 3.^a edição © 1960, de Cornell University. Usado sob permissão da editora, Cornell University Press.)

Ligações químicas

Força e Energia Potencial entre dois átomos vizinhos.

Ligações químicas

Ligação iônica

Íons esféricamente simétricos
(ligações não direcionais)

Força atrativa coulombiana
(muito forte)

Alta energia de ligação

$$\longrightarrow E_A = -\frac{A}{r}$$

$$E_R = \frac{B}{r^n}$$

com $n \sim 8$

Ligações químicas

Ligação covalente

Representação esquemática da ligação covalente em molécula de metano (CH_4).

Átomos ficam polarizados

**Ligações altamente direcionais
(associadas aos orbitais)**

**Cargas elétricas distribuídas entre
os átomos**

**Compartilhamento de elétrons de
valência entre vizinhos**

Baixa energia de ligação (em geral)

Alguns exemplos

Ligações químicas

Ligação metálica

Ilustração esquemática da ligação metálica.

Átomos cedem elétrons (de valência) para o coletivo

Ligações não direcionais

Elétrons livres se movem entre os átomos

Variada energia de ligação

Alta condutividade elétrica e térmica

Física dos Materiais

Ligações químicas

Tabela 2.3 Energias de Ligação e Temperaturas de Fusão para Várias Substâncias

Tipo de Ligação	Substância	Energia de Ligação		Temperatura de Fusão (°C)
		<i>kJ/mol</i> (<i>kcal/mol</i>)	<i>eV/Átomo,</i> <i>Íon, Molécula</i>	
Iônica	NaCl	640 (153)	3,3	801
	MgO	1000 (239)	5,2	2800
Covalente	Si	450 (108)	4,7	1410
	C (diamante)	713 (170)	7,4	>3550
	Hg	68 (16)	0,7	-39
Metálica	Al	324 (77)	3,4	660
	Fe	406 (97)	4,2	1538
	W	849 (203)	8,8	3410
van der Waals	Ar	7,7 (1,8)	0,08	-189
	Cl ₂	31 (7,4)	0,32	-101
Hidrogênio	NH ₃	35 (8,4)	0,36	-78
	H ₂ O	51 (12,2)	0,52	0

Fig. 2.13 Representações esquemáticas de (a) um átomo eletricamente simétrico e (b) um dipolo atômico induzido.

Ilustração esquemática da ligação de van der Waals

Fig. 2.14 Representação esquemática de uma molécula polar de cloreto de hidrogênio (HCl).

Representação esquemática da ligação de hidrogênio