

RESPOSTAS – QUESTIONÁRIO TÓPICO 8: Cinquenta milesimal

QUESTÃO 1: Na técnica de preparo de medicamentos homeopáticos pelo método hahnemanniano escala cinquenta milesimal a partir de tintura-mãe (em casos excepcionais) deve-se :

RESPOSTA: Adicionar 0,5mL de tintura-mãe ao primeiro terço de um total de 5,0g de lactose, evaporar o etanol e proceder á trituração hahnemanniana.

QUESTÃO 2: Como é feita a dispensação de medicamentos homeopáticos preparados pelo método hahnemanniano escala cinquenta- milesimal de acordo com a Farmacopéia Homeopática Brasileira 3ª edição?

RESPOSTA: Dissolver 1 microglóbulo da potência desejada em 20,0mL de etanol 30,0%.

QUESTÃO 3: A técnica de preparo de medicamentos homeopáticos pelo método hahnemanniano escala cinquenta milesimal está associada à potencialização do medicamento a cada tomada segundo orientações de Hahnemann descritas no Organon da Arte de Curar. Em vista disto, o medicamento preparado nesta escala é dispensado em frasco contendo 2/3 de sua capacidade preenchida.

Para fazer esta potencialização deve ser feito:

RESPOSTA: Realizar 10 sucussões a cada tomada.

QUESTÃO 4: Analise a afirmativa abaixo e assinale VERDEIRO ou FALSO

Na técnica de preparo de medicamentos homeopáticos pelo método hahnemanniano escala cinquenta milesimal a dissolução do terceiro triturado é feita dissolvendo-se 63mg do terceiro triturado proveniente da etapa preliminar de preparo da LM em 500 gotas de uma mistura de água e etanol 96% na proporção 4:1.

RESPOSTA: Verdadeiro.

QUESTÃO 5: Para dispensar o medicamento Belladonna 2LM devemos misturar 1 gota da solução A (obtida através da técnica da LM) com 100 gotas de etanol 96% e realizar 100 sucussões. A seguir umedecer 500 microglóbulos (correspondente a 63mg) com 1 gota desta solução. Assim teremos a 1LM em cada microglóbulo. Para dispensar a 2LM, dissolver 2 microglóbulos assim preparados em 20,0mL de etanol 30% em frasco de 30,0mL.

RESPOSTA: Falso.

QUESTÃO 6: Analise a descrição da técnica de preparo do medicamento Pulsatilla 1LM descrita abaixo, partindo de 1 grão da planta inteira fresca e assinale VERDADEIRA ou FALSA.

Colocar 2,079g de lactose em gral e triturar para tampar os poros do gral. Adicionar 63mg de planta inteira no estado fresco e triturar por 6 minutos e raspar por 4 minutos. Triturar por mais 6 minutos e raspar por mais 4 minutos. Adicionar 2,079g de lactose e triturar por 6 minutos e raspar por 4 minutos. Triturar por mais 6 minutos e raspar por mais 4 minutos. Adicionar 2,079g de lactose e triturar por 6 minutos e raspar por 4 minutos. Triturar por mais 6 minutos e raspar por mais 4 minutos. Este é o primeiro grau de trituração. Repetir o procedimento utilizando 63mg do primeiro grau de trituração para obter o segundo grau de trituração. Repetir novamente o procedimento utilizando 63mg do segundo grau de trituração para obter o terceiro grau de trituração.

Dissolver 63mg do terceiro grau de trituração em 500 gotas de uma solução de água e etanol 96% (400 gotas de água e 100 gotas de etanol 96%).

Em frasco de vidro de capacidade adequada misturar 1 gota da solução anteriormente obtida com 100 gotas de etanol 96%, realizar 100 succussões. Umedecer 500 microglóbulos com 1 gota desta solução. Secar os microglóbulos.

Para dispensar dissolver 1 microglóbulo em 20mL de etanol 30% em frasco de vidro de capacidade de 30,0mL.

RESPOSTA: Verdadeiro.

QUESTÃO 7: Assinale a alternativa CORRETA

A técnica de preparo de medicamentos homeopáticos pelo método hahnemanniano escala cinquenta milesimal está associada à potencialização do medicamento a cada tomada segundo orientações de Hahnemann descritas no Organon da Arte de Curar. De acordo com Hahnemann:

- I- Essa potencialização é feita para diminuir o risco de agravação homeopática.
- II- Essa potencialização é benéfica porque o grau de potência de cada dose deve diferir da anterior, sendo sempre menor do que a dose anterior, para que o princípio vital não se rebele provocando reações contrárias.
- III- Não se deve repetir a mesma dose inalterada do medicamento.

RESPOSTA: Somente I e III estão corretas.

QUESTÃO 8: Analise o texto abaixo e assinale VERDADEIRO ou FALSO

A técnica de preparo de medicamentos homeopáticos pelo método hahnemanniano escala cinquenta milesimal é realizada por :

Realizar trituração hahnemanniana do insumo ativo com lactose na proporção 1/100. Dividir a lactose em três porções. Colocar 1 porção de lactose em gral e triturar para tampar os poros do gral. Adicionar o insumo ativo e triturar por 6 minutos e raspar por 4 minutos. Triturar por mais 6 minutos e raspar por mais 4 minutos. Adicionar mais uma porção de lactose e triturar por 6 minutos e raspar por 4 minutos. Triturar por mais 6 minutos e raspar por mais 4 minutos. Adicionar mais uma porção de lactose e triturar por 6 minutos e raspar por 4 minutos. Triturar por mais 6 minutos e raspar por mais 4 minutos. Esta é a primeira potência LM (1LM). Repetir o procedimento utilizando a 1LM assim preparada como insumo ativo para obter a segunda potência da LM (2LM). Repetir novamente o procedimento utilizando a 2LM para obter a terceira potência LM (3LM). Dissolver 63mg da 3LM em 500 gotas de uma solução de água e etanol 96% (400 gotas de água e 100 gotas de etanol 96%). Em frasco de vidro de capacidade adequada misturar 1 gota da solução anteriormente obtida com 100 gotas de etanol 96%, realizar 100 succussões. Umedecer 500 microglóbulos com 1 gota desta solução. Secar os microglóbulos. Esta é a 4LM. Para dispensar a potência 4LM dissolver 1 microglóbulo assim preparado em 20mL de etanol 30% em frasco de vidro de capacidade de 30,0mL.

RESPOSTA: Falso.

QUESTÃO 9: Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA

- I- No método hahnemanniano escala cinquenta milesimal a escala de diluição é 1/50.000.

II- A técnica de preparo de medicamentos homeopáticos pelo método hahnemanniano escala cinquenta milesimal envolve a impregnação de microglóbulos e não são feitas succussões.

III- A técnica de preparo de medicamentos homeopáticos pelo método hahnemanniano escala cinquenta milesimal envolve uma fase preliminar de três triturações hahnemannianas com lactose apenas para as substâncias insolúveis assim como na escala centesimal.

VI- Na técnica de preparo de medicamentos homeopáticos pelo método hahnemanniano escala cinquenta milesimal devemos partir da própria substância pura, preferencialmente no estado fresco. Excepcionalmente pode ser usada tintura-mãe, a qual será adicionada na lactose seguida de evaporação do etanol e posterior trituração hahnemanniana. O uso da tintura-mãe envolve correção da força medicamentosa.

RESPOSTA: Somente I e IV estão corretas.

QUESTÃO 10: Em relação ao estoque de matrizes preparadas pelo método hahnemanniano escala cinquenta milesimal, assinale a alternativa CORRETA:

RESPOSTA: O estoque de matrizes no método hahnemanniano escala cinquenta-milesimal é feito na forma de microglóbulos na potência desejada.