


4

ALEITAMENTO MATERNO

Prevalência e práticas de aleitamento materno em crianças
brasileiras menores de 2 anos. ENANI-2019




Realização



Execução



Financiamento



(*) participação ativa de pesquisadores de diversas instituições brasileiras

Histórico

- Inquéritos nacionais pregressos sobre aleitamento materno e alimentação infantil:
 - 1974: Estudo Nacional de Despesa Familiar (ENDEF)
 - **1986**: Pesquisa Nacional sobre Saúde Materno-Infantil e Planejamento Familiar (PNSMI)
 - **1996 e 2006: Pesquisas Nacionais de Demografia e Saúde (PNDS)**
 - 2013: Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)

(*) As Pesquisas de Orçamentos Familiares (POF) de 2002/2003 e de 2008/2009 incluíram apenas duas perguntas sobre amamentação, o que limita a sua utilidade e comparabilidade com os outros inquéritos.

- OMS: recomenda periodicidade de 3 a 5 anos entre inquéritos

Métodos

- O ENANI-2019 é um inquérito populacional de base domiciliar que avaliou o **consumo alimentar**, o estado nutricional antropométrico e a deficiência de micronutrientes de crianças com idade inferior a 5 anos
- Amostra: 14.558 crianças
 - 12.524 domicílios
 - 123 municípios dos 26 estados da Federação e o Distrito Federal.



Métodos

- 14 indicadores → estimados e agregados em seis grupos:
 - 1) início do aleitamento materno;
 - 2) aleitamento materno em menores de 6 meses;
 - 3) aleitamento materno em menores de 2 anos;
 - 4) duração do aleitamento materno;
 - 5) práticas relacionadas ao aleitamento materno;
 - 6) uso de mamadeiras, chuquinhas e chupetas.
- Estratificadores: **macrorregião, sexo, situação do domicílio (urbana ou rural), quintos do Indicador Econômico Nacional (IEN), e cor ou raça** (branca, parda, preta, amarela e indígena).

Método

Perguntas sobre alimentação da criança	
1.	“Nome da criança” tomou leite do peito ontem?
2.	“Nome da criança” tomou água ontem?
3.	Se SIM, a água que “Nome da criança” tomou ontem era filtrada ou fervida?
4.	“Nome da criança” tomou água com açúcar ontem?
5.	“Nome da criança” tomou chá ontem?
6.	“Nome da criança” tomou leite de vaca em pó ontem?
7.	“Nome da criança” tomou leite de vaca líquido ontem?
8.	“Nome da criança” tomou leite de soja em pó ontem?
9.	“Nome da criança” tomou leite de soja líquido ontem?
10.	“Nome da criança” tomou fórmula infantil ontem? (Exemplos: Nan®, Nestogeno®, Aptamil®, Enfamil®, Milupa® e Similac®)


Quadro 2. Perguntas de práticas relacionadas ao aleitamento materno e do uso de chuquinha, mamadeiras e chupetas.

Pergunta	Opções de resposta
Você amamentou alguma vez “nome da criança”?	• Sim • Não • Não sabe/não quis responder
Quanto tempo depois do nascimento “nome da criança” foi colocado no peito pela primeira vez para mamar?	• Horas ou dias
Desde que você amamenta “nome da criança”, você amamentou o filho de outra mulher? ^a	• Sim • Não • Não sabe/não quis responder
Quando estava amamentando “nome da criança”, você amamentou o filho de outra mulher? ^b	
Desde que você amamenta “nome da criança”, você deixou seu filho ser amamentado por outra mulher?	• Sim • Não • Não sabe/não quis responder
Quando estava amamentando “nome da criança”, você deixou seu filho ser amamentado por outra mulher?	
Desde o nascimento de “nome da criança” até hoje, ele(ela):	• Usa chupeta • Já usou chupeta, mas não usa mais • Recusou o uso de chupeta • Nunca usou porque nunca foi oferecido • Não sabe/não quis responder
“Nome da criança” recebeu algum alimento por mamadeira ou chuquinha ontem?	• Sim • Não • Não sabe/não quis responder

Resultados

INDICADOR 1: Prevalência de crianças menores de 2 anos alguma vez amamentadas

Figura 1. Prevalência de crianças menores de 2 anos alguma vez amamentadas segundo macrorregiões. Brasil, 2019.



Resultados


PNDS 2006: 42,9%

Nascer Brasil* 2011:

56,0%

INDICADOR 2: Aleitamento materno na primeira hora de vida entre crianças menores de 2 anos

Figura 5. Prevalência do aleitamento materno na primeira hora de vida entre crianças menores de 2 anos segundo macrorregião. Brasil, 2019.



ps: > prevalência
no quinto IEN


Resultados

INDICADOR 3: Aleitamento materno exclusivo

PNSMI 1986: 4,7%

PNDS 1996: 29,2%

PNDS: 2006: 45,0%




Resultados

INDICADOR 3: Aleitamento materno exclusivo

PNSMI 1986: 2,9%

PNDS 1996: 23,9%


PNDS: 2006: 37,1%



Resultados

INDICADOR 4: Aleitamento materno misto entre crianças menores de 6 meses

Figura 17. Prevalência de aleitamento materno misto entre crianças menores de 6 meses segundo macrorregião. Brasil, 2019.



Resultados


PNSMI 1986: 37,4%

PNDS 1996: 44,8%

PNDS: 2006: 56,3%

INDICADOR 5: Aleitamento materno entre crianças menores de 2 anos


Figura 21. Prevalência de aleitamento materno entre crianças menores de 2 anos segundo macrorregião. Brasil, 2019.



Resultados

INDICADOR 6: Aleitamento materno continuado entre crianças de 12 a 23 meses


Figura 25. Prevalência de aleitamento materno continuado entre crianças de 12 a 23 meses segundo macrorregião. Brasil, 2019.



Resultados

INDICADOR 6: Aleitamento materno continuado entre crianças de 12 a 15 meses

Figura 29. Prevalência de aleitamento materno continuado entre crianças de 12 a 15 meses segundo macrorregião. Brasil, 2019.




I Intervalo de confiança de 95%.

Resultados

INDICADOR 6: Aleitamento materno continuado entre crianças de 20 a 23 meses

Figura 37. Prevalência de aleitamento materno continuado de crianças entre 20 e 23 meses segundo macrorregião. Brasil, 2019.



ps: > prevalência
no primeiro IEN e
na área rural

Resultados


Medianas:

- Duração mediana do aleitamento materno exclusivo: 3 meses
- Duração mediana do aleitamento materno: 16 meses

Resultados

INDICADOR 7: Prevalência do uso de mamadeira ou chuquinha


Figura 53. Prevalência de uso de mamadeira ou chuquinha entre crianças menores de 2 anos segundo macrorregião. Brasil, 2019.



Resultados

INDICADOR 8: Prevalência do uso de chupeta entre crianças menores 2 anos

Figura 57. Prevalência de uso de chupeta entre crianças menores de 2 anos segundo macrorregião. Brasil, 2019.



Metas

Comparação das prevalências (%) do ENANI-2019 com as metas 2030 da Organização Mundial de Saúde.

ENANI-2019
META 2030



Discussão

O QUE JÁ TEMOS

- Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC)
- 2013: Estratégia Amamenta Alimenta Brasil (EAAB)
- 2015: NBCAL
- Licença maternidade de 4 meses
- Programa Empresa Cidadã
- Sala de Apoio à Amamentação
- 2015: Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (Pnaisc)
- 2019: Guia Alimentar
- Sisvan

DESAFIOS

- Manutenção e ampliação da IHAC
- Ampliação da EAAB
- Atualização e monitoramento da NBCAL
- Licença maternidade de 6 meses
- Formação profissional (medicina, enfermagem e nutrição)
- Campanhas fortes*
- Formação acadêmica

Advocacy

 ibfanbrasil

OS PAÍSES PRECISAM **PROMULGAR, MONITORAR E APLICAR** A LEGISLAÇÃO NACIONAL EM CONSONÂNCIA COM O CÓDIGO INTERNACIONAL. NO **BRASIL** HÁ A **NBCAL*** – O NOSSO INSTRUMENTO LEGAL EM DEFESA DO ALEITAMENTO MATERNO.

Ref.: Como o marketing das fórmulas lácteas influencia nossas decisões sobre alimentação infantil (OMS - UNICEF, 2022)



PARA CONHECER A LEE
visite nbcabrasil.org.br

* Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras

 IBFAN BRASIL

Liked by [cristiano.boccolini](#) and 210 others

ibfanbrasil Todos os setores do governo, incluindo saúde, trabalho e comércio, profissionais de saúde e suas associações, investidores e aqueles com influência... more

 observainfancia

Assédio da indústria de alimentos infantis a profissionais de saúde em eventos científicos

Profissionais da saúde patrocinados pela indústria de substitutos do leite materno durante eventos científicos

7 de cada 10 **PEDIATRAS**

3 de cada 5 **NUTRICIONISTAS**

1 de cada 3 **FONOAUDIÓLOGOS**

Fonte: Multi NBCAL (Flocruz, UFPA, UFMG, ISS/SP, USP, UNB, UFPA, UFSC, Uerj e UFF, em parceria com a IBFAN-Brasil)

 UNIFASE

 ICICT

 Ministério da Saúde
Secretaria de Políticas de Alimentação e Nutrição

Liked by [cristiano.boccolini](#) and 429 others

observainfancia 7 de cada 10 pediatras recebem patrocínio da indústria de substitutos do leite materno durante eventos científicos. Entre nutricionistas... more

 idecbr

ATENÇÃO À PROPAGANDA CRUZADA!



COMPOSTOS LÁCTEO FÓRMULA

Atenção consumidor! Este produto, apesar da semelhança visual de suas embalagens, não é fórmula infantil ou leite em pó. Segundo o Ministério da Saúde, este produto não deve ser oferecido para bebês e crianças menores de 2 anos. **As empresas Nestlé, Danone e Mead Johnson estão respondendo judicialmente por ausência de informação clara e adequada e por propaganda enganosa e abusiva.**

idec

Liked by [friends_of_the_who_code](#) and 958 others

idecbr Nós acionamos Nestlé, Danone e Mead Johnson por semelhança em rótulos de fórmulas infantis e compostos lácteos ultraprocessados. Esse tipo de estratégia provoca confusão, engano e prejuízo, especialmente para pais, mães, cuidadores e crianças pequenas. Entenda melhor sobre a denúncia em nosso site.

Obrigada!