Química Inorgânica II

Prof. Sofia Nikolaou

**Teoria dos orbitais moleculares aplicada a compostos
de coordenação**

Orbitais Moleculares

- orbitais moleculares são gerados a partir da combinação linear de orbitais atômicos de MESMA SIMETRIA (somação ou subtração das funções de onda dos orbitais atômicos originais)
- o número de orbitais moleculares gerados é sempre igual ao número de orbitais atômicos de origem
- a soma do número de elétrons de valência dos átomos envolvidos na formação dos orbitais moleculares é igual ao número total de elétrons que deverão ser distribuídos no diagrama resultante

GERAL

Notação de Dirac para integral $\rightarrow$

$$\Psi_{OM} = c_1 \Psi_1 + c_2 \Psi_2$$
$$\langle \Psi_i | H | \Psi_f \rangle = H_{ij} \text{ integral de ressonância}$$
$$\langle \Psi_i | \Psi_f \rangle = S_{ij} \text{ integral de recobrimento}$$

Equações seculares

REPRESENTAÇÃO GERAL: $\sum c_i (H_{ij} - ES_{ij}) = 0$

Orbitais Moleculares – Caso mais simples: AB onde A = B

- $H_{11} = H_{22}$

- $\Delta E \sim H_{12}$

- $E = \frac{H_{11} \pm H_{22}}{\pm S_{12}}$

$\downarrow E \rightarrow \Psi_{OM} \text{ ligante} \rightarrow \Psi_1 + \Psi_2$

$\uparrow E \rightarrow \Psi_{OM} \text{ anti-ligante} \rightarrow \Psi_1 - \Psi_2$

Orbitais Moleculares – Caso onde $A \neq B$

Ex. $\lambda \lll 1$

$\Psi_2 - \lambda\Psi_1 \rightarrow$ caráter Ψ_2

$\Psi_1 + \lambda\Psi_2 \rightarrow$ caráter Ψ_1

- $H_{11} \neq H_{22}$

- $\Delta E \sim \frac{(H_{12})^2}{H_{22} - H_{11}}$

- $\Psi_{12} = \Psi_1 + \lambda\Psi_2$
ou

- $\Psi_{12} = \Psi_2 - \lambda\Psi_1$

Teoria
da
perturbação

$\lambda \rightarrow$ fator que dá a contribuição relativa do orbital atômico original

A função de onda resultante, Ψ_{OM} , será perturbada pela mistura das funções de onda atômicas. Na prática:

O OM terá maior contribuição do orbital atômico com energia mais próxima, ou seja, será mais “parecido” com ele $\rightarrow$ caráter de metal ou de ligante!!!! ⁴

Orbitais Moleculares

FATORES IMPORTANTES:

- só se combinam orbitais atômicos de mesma simetria
- $H_{22} - H_{11}$ **pequeno**: a energia dos orbitais atômicos que se quer combinar deve ser semelhante
- H_{12} **alta**: alta ressonância/acoplamento $\rightarrow$ ligação química!!!
- Caso extremo: $H_{22} - H_{11}$ **muito grande** $\rightarrow$ não há grande ganho energético na combinação e portanto praticamente não há formação do OM.

Orbitais Moleculares – COMPLEXOS

$$\Psi_{OM} = c_i \Psi_M + c_j \Psi_L$$

- Ligação sigma → dz^2 e dx^2-y^2 , **em geometria Oh**, primeiramente participam de ligações sigmas;

→ ligantes orgânicos: átomos que fazem a ligação química, em geral, C, N O, P, X⁻sempre orbitais s e p (orbital p faz ligação σ e π , dependendo da orientação do ligante nos eixos coordenados)

$$a_1g = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 \dots \text{ (s ligantes)}$$

$$t_1u = \sigma_1 - \sigma_3, \sigma_2 - \sigma_4, \sigma_5 - \sigma_6, \dots \text{ (p ligantes)}$$

$$e_g = \sigma_1 - \sigma_2 + \sigma_3 - \sigma_4, 2\sigma_6 + 2\sigma_5 - \sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3 - \sigma_4, \dots$$

s, p e e_g do metal

} Todos de simetria sigma

t_2g metal: simetria π , portanto não se combina com os anteriores

USO DE SALCS – COMPLEXOS

SALCS: combinação linear de orbitais atômicos adaptada por simetria

SIMETRIA σ

$a_{1g} = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 \dots$ (ligantes)

$t_{1u} = \sigma_1 - \sigma_3, \sigma_2 - \sigma_4, \sigma_5 - \sigma_6, \dots$ (ligantes)

$e_g = \sigma_1 - \sigma_2 + \sigma_3 - \sigma_4, 2\sigma_6 + 2\sigma_5 - \sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3 - \sigma_4, \dots$ (ligantes)

s, p e e_g (metal)

USO DE SALCS – COMPLEXOS

SALCS: combinação linear de orbitais atômicos adaptada por simetria

SIMETRIA σ

$$a_{1g} = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 \dots \text{ (s ligantes)}$$

$$t_{1u} = \sigma_1 - \sigma_3, \sigma_2 - \sigma_4, \sigma_5 - \sigma_6, \dots \text{ (p ligantes)}$$

$$e_g = \sigma_1 - \sigma_2 + \sigma_3 - \sigma_4, 2\sigma_6 + 2\sigma_5 - \sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3 - \sigma_4, \dots \text{ (d metal)}$$

USO DE SALCS – COMPLEXOS

SALCS: combinação linear de orbitais atômicos adaptada por simetria

SIMETRIA σ

$$a_1g = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 \dots \text{ (s ligantes)}$$

$$t_1u = \sigma_1 - \sigma_3, \sigma_2 - \sigma_4, \sigma_5 - \sigma_6, \dots \text{ (p ligantes)}$$

s e p (d metal)

$$e_g = \sigma_1 - \sigma_2 + \sigma_3 - \sigma_4, 2\sigma_6 + 2\sigma_5 - \sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3 - \sigma_4, \dots \text{ (d metal)}$$

Orbitais Moleculares - Complexos

- o número de elétrons a ser distribuídos é a somatória dos elétrons da camada d do centro metálico e os elétrons de valência dos ligantes
- Exemplo: $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_6]^{+3} \rightarrow \text{Fe}^{+3} d^5$; cada NH_3 tem $2e^-$

Metal

OMs

Ligante

Este diagrama está mostrando as interações σ

Orbitais Moleculares – Ligação π

Ligante π doador: tem orbitais de simetria π ***preenchidos e com energia*** suficientemente próxima dos orbitais t_{2g} do metal para que haja a combinação (exemplo Cl^-)

Interação σ

Interação π

Orbitais Moleculares – Ligação π

Ligante π doador: tem orbitais de simetria π preenchidos e com energia suficientemente próxima dos orbitais t_{2g} do metal para que haja a combinação (exemplo Cl^-)

* SALC de simetria π obtido a partir de orbitais p dos ligantes

• Exemplo: $[\text{Fe}(\text{Cl})_6]^{-3} \rightarrow \text{Fe}^{+3} d^5$; Cl^- LIGANTE σ e π doador!

• Exemplo: $[\text{Fe}(\text{Cl})_6]^{3-} \rightarrow \text{Fe}^{+3} d^5$; Cl^- LIGANTE σ e π doador!

Orbitais Moleculares – Ligação π

Ligante π receptor: tem orbitais de simetria π **vazios e com energia maior** que a dos orbitais t_{2g} do metal. Exemplo: CO; CN^- , piridina, NO^+

- Exemplo: $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{-4} \rightarrow \text{Fe}^{+2} d^6$; CN^- LIGANTE σ doador e π receptor!

10Dq grande → CAMPO FORTE!

Ligantes π aceptores

:CN
2 x 6 = 12 e⁻

$I^- < Br^- < S^{2-} < SCN^- < Cl^- < NO_3^- < F^- < OH^- < ox^{2-}$
 $< H_2O < NCS^- < CH_3CN < NH_3 < en < bpy$
 $< phen < NO_2^- < phosph < CN^- < CO$

Ligante π receptor

NO^+ , CO , CN^- , phen

Ligante π doador

I^- , Br^- , SCN^- , OH^-

Ligante σ

NH_3^+ , CH_3CN , NCS^- , H_2O

Campo fraco

Campo intermediário

Campo forte

Orbitais Moleculares – ligação π $\rightarrow$ ligantes π aceptores

- A teoria de OM explica a série espectroquímica (empírica) e dá sentido aos termos ligantes de campo fraco e forte.
- É possível convergir aspectos da teoria de OM, que descreve a covalência, com a teoria de campo cristalino pois, embora esse modelo seja eletrostático, os dados experimentais refletem a covalência da ligação metal-ligante no complexo!

SÉRIE ESPECTROQUÍMICA

Orbitais Moleculares – complexos tetraédricos

Basicamente o mesmo desenvolvimento feito para geometria Oh porém atentar para:

- inversão do e e t_2
- supressão do índice g e u que se refere à paridade das funções de onda que descrevem os orbitais.

VERIFICAR NA LITERATURA!!!!