CARBOIDRATOS

1 – ESTRUTURA

CONFIGURAÇÃO
CONFORMAÇÃO
POLIMERIZAÇÃO

2- GLICOPROTEÍNAS E GLICOLIPÍDEOS

3 – GLICOSAMINOGLICANAS E PROTEOGLICANAS

Açúcares

ou

Glicídeos

Oses

Sacarídeos

Carboidratos

Hidratos de carbono $\rightarrow (CH_2O)_n$

$n \geq 3$

Moléculas orgânicas mais abundantes

Diferentes funções: nutrientes

reserva

estrutura

Estrutura química → são poliálcoois

Polihidroxialdeídos ou Polihidroxicetonas

ALDOSE

CETOSE

Açúcares mais simples :

Gliceraldeído

Dihidroxiacetona

Açúcares são **quirais**:

Apresentam centros de
assimetria (C*)

Formam enantiômeros
Isomeria Geométrica L ou D
(e isômeros ópticos)

D – Gliceraldeído

L – Gliceraldeído

Exemplo: Familia D de Aldoses

Exemplo:
Família D de
Cetoses

Numeração de Carbonos da D – Glicose

4 C* (assimétricos)

2x2x2x2 (2⁴) isômeros

8 isômeros D
(e 8 isômeros L)

D – Manose

D – Glicose

D – Galactose

D-Manose e D-Galactose são **epímeros** da D-Glicose :

Diferença em apenas 1 dos Carbonos assimétricos

Glicose em água sofre **Mutarrotação** espontânea

α -D-glicose tem rotação específica de $+ 112^\circ$ (dextrógira)

β -D-glicose tem rotação específica de $+ 19^\circ$ (dextrógira)

Açúcares em solução aquosa Formam hemiacetais →

Frutose (C₆H₁₂O₆) – uma cetose

Também forma hemiacetais em água:

Ao formar o Hemiacetal cíclico (anel lactona)
é formado um novo C assimétrico (C₁ – carbonila)

D-glicose

Anômeros

(diferença em apenas 1 C)

Anomeria

Podem ter configuração α (-OH para baixo) ou β (-OH para cima) em relação a CH_2OH .

Mutarrotação

As formas α e β estão em equilíbrio, uma forma pode se converter na outra.

Ciclização Intramolecular

Diferentes formas de representação de α -D-glicopiranosose

Fisher

Haworth

Estereo

Cadeira-barco

α -D-glycopyranose

β -D-glycopyranose

α -D-glycopyranose
38%

β -D-glycopyranose
62%

α -D-glicofuranose
< 0.5%

$\sim$ 0.02%

β -D-glicofuranose
< 0.5%

Considerações sobre conformações

Fórmulas Conformacionais

α -D-Glicopiranose

Interconversão de cadeiras

Interconversão com substituintes

Confôrmeros furanósicos

Envelope

$$\Delta G^\circ \cong 3-4 \text{ kcal/mol}$$

Torcida

ALGUMAS ESTRUTURAS

Glicopiranoses mais comuns

**α-D-Glicopiranosose
(Glucose)
Glc**

**α-D-Galactopiranosose
(Galactose)
Gal**

**α-D-Manopiranosose
(Mannose)
Man**

**L-Fucose
L-Fuc**

**N-Acetil-D-Glicosamina
(GlcNAc)**

**N-Acetil-D-galactosamina
(GalNAc)**

**D-Xilose
(Xyl)**

**L-Arabinose
(L-Ara)**

**Ácido Siáico
N-Acetil Neuroamínico
(NeuNAc)**

N-Glicolil Neuroamínico

Ligações Glicosídicas ocorrem entre dois açúcares

Podem ter configuração α ou β e ligações entre os carbonos 1-2, 1-4 ou 1-6.

Primeiro açúcar que provamos é um Dissacarídeo:
2 monosacarídeos unidos por ligação glicosídica

O- β -D-galactopiranosil (1 $\rightarrow$ 4) (α) ou (β)-D-glicopiranose

Dissacarídeos importantes

Maltose

Lactose

Sucrose

Dissacarídeos

Sacarose

O- α -D-Glicopiranosil-(1 $\rightarrow$ 2)- β -D-Frutofuranosídio

Lactose

O- β -D-Galactopiranosil-(1 $\rightarrow$ 4)- β -D-Glicopiranose

Maltose

O- α -D-Glicopiranosil-(1 $\rightarrow$ 4)- β -D-Glicopiranose

Doçura Relativa

Sacarose	100
Glicose	70
Frutose	170
Maltose	30
Lactose	16
Sacarina	40.000

sacarina

Fontes de Diversidade

Anomeria

Maltose

Cellobiose

Ramificação

Formas Isoméricas

Composição do Monômero	Produto	Número de Isômeros	
		Peptídeos	Sacarídeos
X2	Dímero	1	11
X3	Trímero	1	176
XYZ	Trímero	6	1056

POLISSACARÍDEOS

Polissacarídeos

Ramificações das cadeias de glicogênio e amido

α -glucose subunits

Starch: Chain of α -glucose subunits

Glycogen: Branched chain of α -glucose subunits

β -glucose subunits

Cellulose: Chain of β -glucose subunits

α -Amylose

Figure 8-10. α -Amylose.
[Figure copyrighted © by Irving Geis.]

Copyright 1999 John Wiley and Sons, Inc. All rights reserved.

©
IRVING
GEIS

Amilose

Celulose (poli-glicose)

Celulase

Celulose (função estrutural) → Estabilizada por pontes de hidrogênio

N-Acetil-D-Glicosamina (polímero em β)

Quitina: insetos, caranguejos, lagosta, camarão

(Tomado de Biologia 2 - Santillana)

Aminopectina e Glicogênio

GLICOGENINA – ponto de partida do polímero de glicogênio

GLICOPROTEÍNAS

Glicoproteínas

Estruturas dos oligossacarídeos ligados a Asparagina

Complex

Hybrid

High-mannose

Antígenos dos Grupos Sanguíneos ABO

ENZIMAS QUE LIBERAM OLIGOSSACARÍDEOS DE GLICOPROTEÍNAS

Endo- β -N-glucosaminidasas

ENDO D
ENDO H
ENDO CII
ENDO F

ENDO GLUCOSAMINIDASE D

R precisa ser: $\text{Man}\alpha(1\rightarrow3)\text{Man}\beta(1\rightarrow4)\text{GlcNAc}$

Parte mais importante: resíduo α -manosil do trissacarídeo

Substituição da manose em C4 não inibe a enzima

Substituição da manose em C2 inibe a enzima

$\text{Fuca}\alpha(1\rightarrow6)\text{GlcNAc}$ não inibe a enzima

$\text{Fuca}\alpha(1\rightarrow6)\text{GlcNAc-peptídeo}$ não inibe a enzima

ENDO GLUCOSAMINIDASE H

R precisa ser: $\text{Man}\alpha(1\rightarrow3)\text{Man}\alpha(1\rightarrow6)\text{Man}\beta(1\rightarrow4)\text{GlcNAc}$

- **Parte mais importante: resíduo α -manosil do tetrassacarídeo**
- **Substituição da manose em C2 não inibe a enzima**
- **$\text{Fuc}\alpha(1\rightarrow6)\text{GlcNAc}$ não inibe a enzima**
- **$\text{Fuc}\alpha(1\rightarrow6)\text{GlcNAc}$ -peptídeo não inibe a enzima**
- **Hidrolisa todas as cadeias "high-mannose" e muitas cadeias híbridas**
- **Não hidrolisa as cadeias complexas porque elas não tem as duas manoses da ponta não redutora**

ENDOGLUCOSAMINIDASE CII

R precisa ser: $\text{Man}\alpha(1\rightarrow3)\text{Man}\alpha(1\rightarrow6) [\text{Man}\alpha(1\rightarrow3)] \text{Man}\beta(1\rightarrow4)\text{GlcNAc}$

Requer pentassacarídeo ramificado

ENDOGLUCOSAMINIDASE F

Mesma especificidade da ENDO H, atuando em cadeias biantenárias, mas não em triantenárias ou tetraantenárias

ENZIMAS QUE LIBERAM OLIGOSSACARÍDEOS DE GLICOPROTEÍNAS

N-glicanase

Glicopeptidase

Peptídeo-N4-(N-acetilβglicosaminil) asparagina amidase

Age com maior velocidade quando o oligossacarídeo está no aa 3 - 40

Não age quando oligossacarídeo está no aa aminoterminal ou carboxiterminal

ENZIMAS QUE LIBERAM OLIGOSSACARÍDEOS DE GLICOPROTEÍNAS

O-glicanase
Endo- α -N-acetilgalactosaminidase

Gal β pode estar sialilada em $\alpha2\rightarrow3$

Por isso sempre se trata com neuraminidase antes da O-glicanase

MUCINAS HUMANAS
CODIFICADAS POR 22 GENES
MUC 1 A MUC 22

- 1-TRANSMEMBRÂNICAS
- 2-SOLÚVEIS FORMADORAS DE GEL
- 3-SOLÚVEIS QUE NÃO FORMAM GEL

Células Caliciformes/Goblet Cells

Epitélio de Traqueia

β -D-N-acetylglucosamine

Estrutura das glicanas de mucinas humanas

Ácido siálico
Ácido Acetil Neuramínico

GLICOLIPÍDEOS

ESFINGOSINA

CERAMIDA

GLICOLÍPÍDEO
GLICOCERAMIDA
CEREBROSÍDEO
GLICOESFINGOLÍPÍDEO

ESFINGOMIELINA

GLICOESFINGOLÍPÍDEO
GANGLIOSÍDEO

GIPL-1

ÂNCORA VSG

Leishmania Tipo II

G1PLS

A *T. brucei*

B *Leishmania*

C *T. cruzi*

Trypanosoma brucei

Leishmania major

Trypanosoma cruzi

Yeast

Dicystostellium discoideum

Fish proteins

Mammalian proteins

MUCINA (C-terminal)

Man α 1-2 Man α 1-2 Man α 1-6 Man α 1-4 GlcNH₂ α 1-6 INO

GLICINOSITOL FOSFOLIPÍDEOS
GLICINOSITOL FOSFOCERAMIDAS

2-AEP

ÂNCORAS
DE
MUCINAS
(T. cruzi)

SÍTIOS DE CLIVAGEM PARA INSERÇÃO DA ÂNCORA DE GPI

Acetilcolinesterase (Torpedo)	NQFLPKKKNATAC DGELSSSGTSSSKG <u>IIFYVLFSILYLIFY</u>
Fosfatase alcalina (placenta)	TACDLAPPAGTTD AAHPGRSVVPALLP <u>LLAGTLLLLLETATAP</u>
Decay Accelerating Factor	HETTPNKGS GTTS GTTRLLSGHTC <u>FTLTGLLGTLVTMGLLT</u>
Prociclina (<i>T. brucei</i> PARP)	EPEPEPEPEPEPG AATLK <u>SVALPFAIAAAALVAAF</u>
Prion (hamster)	QKESQAYYDGRRS SAVLFSS <u>PPVILLISFLIFLMVG</u>
Antígeno Thy-1 (rato)	KTINVIRDKLVKC GGISLLVQNTSW <u>LLLLLLLSLSFLQATDFISL</u>
VSG (<i>T. brucei</i> 117)	ESNCKWENNAC KD SSILVTKK <u>FALTVVSAAFVALLF</u>
Tc-85 (LBG, <i>T. cruzi</i>)	GTAREKGDGGANG DAGSAYGRELLP <u>MLLLLGLWALATA</u>

GLICOSAMINOGLICANAS
E
PROTEOGLICANAS

Proteoglicanos

Glicosaminoglicanos

GAGs:

- Heparina
- Heparan Sulfato
- Dermatan Sulfato
- Condroitim 4-Sulfato
- Condroitim 6-Sulfato
- Ácido Hialurônico

Diferenças quanto :

- Hexosamina;
- Açúcar não nitrogenado;
- Presença e posição de grupamentos sulfato; e
- Tipo de ligação glicosídica.

Glicosaminoglicanos

Hexosamina

(α -D-Glucosamina ou β -D-Galactosamina)

Açúcar não nitrogenado

▲ Sulfato
alta densidade de cargas negativas

- β -D-Galactose
- **Ácido urônico**
(β -D-glucurônico ou α -L-idurônico)

Nos tecidos:

Proteoglicanos = Proteína (“core”) + Cadeia linear de GAG

Glicosaminoglicanos

Hyaluronate

Dermatan sulfate

Chondroitin-4-sulfate

Keratan sulfate

Chondroitin-6-sulfate

Heparin

Tabela I

Características estruturais dos glicosaminoglicanos

Glicosaminoglicanos	Dissacarídeos				
	Açúcar não nitrogenado	Ligação intra-dissacarídica	Hexosamina		
Ácido Hialurônico	D-GlcA	$\beta 1 \rightarrow 3$	D-GlcN Ac	$\beta 1 \rightarrow 4$	Ligação inter-dissacarídica
Condrosam	D-GlcA	$\beta 1 \rightarrow 3$	D-GalN Ac		
Condroitim sulfato	D-GlcA	$\beta 1 \rightarrow 3$	D-GalN Ac		
	D-GlcA	$\beta 1 \rightarrow 3$	D-GalN Ac (4S)		
	D-GlcA	$\beta 1 \rightarrow 3$	D-GalN Ac (6S)		
Dermatam sulfato	D-GlcA	$\beta 1 \rightarrow 3$	D-GalN Ac (4S)		
	D-GlcA	$\beta 1 \rightarrow 3$	D-GalN Ac (6S)		
	L-IdoA	$\alpha 1 \rightarrow 3$	D-GalN Ac (4S)		
	L-IdoA (2S)	$\alpha 1 \rightarrow 3$	D-GalN Ac (4S)		
	L-IdoA (2S)	$\alpha 1 \rightarrow 3$	D-GalN Ac (6S)		
Queratam sulfato	D-Gal (6S)	$\beta 1 \rightarrow 3$	D-GlcN Ac (6S)		
Heparosam	D-GlcA	$\beta 1 \rightarrow 4$	D-GlcN Ac	$\alpha 1 \rightarrow 4$	
Acaram sulfato	L-IdoA (2S)	$\alpha 1 \rightarrow 4$	D-GlcN Ac		
Heparam sulfato	D-GlcA	$\beta 1 \rightarrow 4$	D-GlcN Ac		
	D-GlcA	$\beta 1 \rightarrow 4$	D-GlcN Ac (6S)		
	D-GlcA	$\beta 1 \rightarrow 4$	D-GlcN (S)		
	D-GlcA	$\beta 1 \rightarrow 4$	D-GlcN (S, 6S)		
	L-IdoA	$\alpha 1 \rightarrow 4$	D-GlcN (S)		
	L-IdoA (2S)	$\alpha 1 \rightarrow 4$	D-GlcN (S)		
Heparina	D-GlcA	$\beta 1 \rightarrow 4$	D-GlcN (S)		
	D-GlcA	$\beta 1 \rightarrow 4$	D-GlcN (S, 6S)		
	L-IdoA (2S)	$\alpha 1 \rightarrow 4$	D-GlcN (S)		
	L-IdoA (2S)	$\alpha 1 \rightarrow 4$	D-GlcN (S, 6S)		

D-GlcA: ácido D-glucurônico; L-IdoA: ácido L-idurônico; D-GlcN: D-glucosamina; D-GalN, D-galactosamina; D-Gal, D-galactose.

**COMPONENTES DA UNIDADE ESTRUTURAL DOS
GLICOSAMINOGLICANOS ÁCIDOS**

GLICOSAMINO GLICANO	AÇÚCARES	POSIÇÃO DO SULFATO	LIGAÇÃO INTRA	LIGAÇÃO INTER
Condroitim	GalNAc GlcUA	- -	β 1→3	β 1→4
Condroitim 4-sulfato	GalNAc GlcUA	4 -	β 1→3	β 1→4
Dermatam sulfato	GalNAc GlcUA IduUA	4 - -	β 1→3 α 1→3	β 1→4
Condroitim 6-sulfato	GalNAc GlcUA	6 -	β 1→3	β 1→4
Ácido Hialurônico	GlcNAc Gal	- -	β 1→3	β 1→4
Queratam sulfato	GlcNAc Gal	6 -/6	β 1→4	β 1→3
Heparam sulfato	GlcN GlcNAc GlcUA	2/6 -/6 -	α 1→4	α 1→4
Heparina	GlcN GlcUA IduUA	2/6 - 2	α 1→4	α 1→4

Proteoglicanos

Figura modificada do site:

<http://www.organic.lu.se/people/ulf%20ellervik/ellervikresearchgroup/Research.html>

Proteoglicanos

Região de Ligação

Proteoglicanos

- Células
 - Grânulos citoplasmáticos: serglicim
 - Superfície celular: sindecam, glipicam
- Matriz extracelular
 - Membrana basal: perlecam, bamacam
 - Matriz intersticial:
 - Alto peso molecular, que agregam com ácido hialurônico
 - Baixo peso molecular, da família das proteínas ricas em leucina

Função dos Proteoglicanos

Proteoglicano	Localização	Função
Heparan Sulfato	Em todos os tecidos • Superfície Celular • Matriz Extracelular • Membrana Basal	• Adesão celular • Reconhecimento Celular • Papel importante na divisão celular
Condroitim4- e 6- Sulfato	• Matriz de tecidos conjuntivos, ossos e cartilagens. • Tecidos de proliferação rápida	• Proliferação celular
Dermatan Sulfato	• Tecidos conjuntivos densos (pele e tendão)	• Organização de tecidos ricos em colágenos
Heparina	• Tecidos em contato com o meio externo (pele, pulmão)	• Defesa
Queratan Sulfato	• Estroma da Córnea • Cartilagem óssea	• Transparência a córnea • Crescimento celular

Heparin is found in intracellular granules of mast cells and Heparan Sulfate is located at the cell surface of all animal species with tissue organization

Nucleo azul DAPI, verde fibronectina e vermelho Proteoglicano de heparam sulfato na superfície, Visualizados com anticorpos específicos

Heparina corada em roxo com azul de toluidina-metacromasia

Common Classes of Animal Glycans

Peptidoglicano (Paredes Celular)

THE END

Doçura relativa

Composto	Escala
Sacarose	100
Frutose	140
Glicose	70 – 80
Galactose	35
Maltose	30 – 50
Lactose	20
Sacarina	300
Ciclamato	30
Aspartame	180
Acesulfame	200
Sucralose	600

Sacarose

Sucralose

3 regiões de interação

Modelo do receptor da sensação de “doce”

EPÍMEROS (Convenção de Fischer)

Epímeros diferem na configuração de um átomo de carbono

D-Glicose

D-Manose

D-Glicose

D-Galactose

Epímeros do carbono 2

Epímeros do carbono 4

Carboidratos são classificados quanto a natureza do grupo carbonila:
cetona = cetoses

Monossacarídeos (D-cetoses)

Dissacarídeos

Fatores de Reconhecimento de Superfície Celular

Difração de Raio X – Modelo de IgG

Ketone sugars

Ketones are not easy to oxidize except ketoses.

Enediol reaction-all monosaccharides are reducing sugars.

Monossacarídeos podem formar estruturas em anel

Anel Pirano

Anel Furano

Piranoose

Furanoose