

Mecânica Estatística – 4302401

Respostas da lista de exercícios 5

Segundo semestre de 2023

1. (a) A densidade de estados (constante!) é dada por

$$D(\epsilon) = \frac{\gamma Am}{2\pi\hbar^2}.$$

Se as partículas têm spin $\frac{1}{2}$, vale $\gamma = 2$.

- (b) A energia de Fermi ϵ_F é

$$\epsilon_F = \frac{\pi\hbar^2 N}{\gamma Am}.$$

A temperatura de Fermi é

$$T_F = \frac{\epsilon_F}{k_B} = \frac{\pi\hbar^2 N}{\gamma Am k_B}.$$

- (c) Nessa faixa de temperaturas, a energia média por partícula é

$$u = \frac{E}{N} = \frac{1}{2}\epsilon_F \left[1 + \frac{\pi^2}{3} \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right].$$

O calor específico a área constante é

$$c_A = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_{N,A} = \frac{\pi^2}{3} k_B \frac{T}{T_F},$$

A entropia, nesse nível de aproximação, coincide com o calor específico.

- (d) No limite semiclássico, a energia interna por partícula é

$$u(T, a) \approx k_B T,$$

e o calor específico por partícula é

$$c_A = k_B.$$

A entropia por partícula é dada por

$$s(T, a) = k_B \ln \left(\frac{2\pi\gamma m k_B T}{h^2} \right).$$

- (e) Para traçar os gráficos, a sugestão é adaptar o notebook utilizado para os cálculos tridimensionais, fornecido no E-disciplinas.
2. Calculando e igualando as potências emitida e absorvida, temos para a Terra uma temperatura de equilíbrio

$$T_{\text{eq}} = \sqrt{\frac{R_{\odot}}{2d}} T_{\odot},$$

sendo R_{\odot} o raio do Sol, T_{\odot} a temperatura do Sol e d o raio da órbita da Terra.

3. (a) No limite de altas temperaturas, a energia interna por átomo é

$$u = 2k_B T,$$

de modo que o calor específico a área constante é

$$c_A = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_{N,A} = 2k_B.$$

- (b) No limite de baixas temperaturas, a energia interna por átomo é

$$u = \frac{A\hbar}{N\pi c^2} \left(\frac{k_B T}{\hbar} \right)^3 \zeta(3) \Gamma(3) = \frac{2.4041 A\hbar}{N\pi c^2} \left(\frac{k_B T}{\hbar} \right)^3,$$

o que implica um calor específico a área constante dado por

$$c_A = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_A = \frac{7.2123 A}{N\pi c^2} k_B \left(\frac{k_B T}{\hbar} \right)^2.$$

- (c) A escala de temperatura que “separa” os regimes de altas e de baixas temperaturas é $T_D = \hbar\omega_D/k_B$.
4. (a) A grande função de partição do sistema é

$$\Xi(\beta, V, z) = \left(1 + z + z^2 e^{-\beta\epsilon} \right)^{V/v_0}.$$

- (b) A demonstração pode ser feita a partir da relação

$$N = z \left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial z} \right)_{\beta, V},$$

resolvendo para z .

(c) Até segunda ordem em c , a pressão é tal que

$$\frac{p}{k_B T} \approx \frac{1}{v} + \frac{1}{2} \left(1 - 2e^{-\beta\epsilon}\right) \frac{v_0}{v^2}.$$

Portanto, o segundo coeficiente do virial para esse sistema é

$$B_2 = \frac{1}{2} \left(1 - 2e^{-\beta\epsilon}\right) v_0.$$

5. As relações são

$$v_c = 2b, \quad k_B T_c = \frac{a}{4b}, \quad p_c = \frac{a}{4b^2} e^{-2}.$$

Temos então, para a equação de Dieterici,

$$\frac{k_B T_c}{v_c p_c} = \frac{e^2}{2} \simeq 3,7,$$

enquanto para a equação de van der Waals temos

$$\frac{k_B T_c}{v_c p_c} = \frac{8}{3} \simeq 2,7.$$

Portanto, a equação de Dieterici reproduz melhor os valores experimentalmente medidos da combinação $k_B T_c / v_c p_c$.

6. (a) Cada conexão desencaixada contribui ϵ para a energia, de modo que $E_n = n\epsilon$
 (b) Cada conexão desencaixada contribui uma multiplicidade G , e as multiplicidades se multiplicam, de modo que $\Omega_n = G^n$.
 (c) A função de partição é

$$Z = \frac{1 - (Ge^{-\beta\epsilon})^N}{1 - Ge^{-\beta\epsilon}}.$$

A soma vai apenas até $n = N - 1$ porque a última conexão sempre permanece encaixada.

(d) A energia livre é

$$F = k_B T \ln \left[\frac{1 - Ge^{-\beta\epsilon}}{1 - (Ge^{-\beta\epsilon})^N} \right].$$

Enquanto $Ge^{-\beta\epsilon} < 1$, ou seja, enquanto $T < T_c = \epsilon / k_B \ln G$, tanto o numerador quanto o denominador no argumento do logaritmo são positivos, e supondo $N \gg 1$ vale

$$F(T < T_c) \approx k_B T \ln \left(1 - Ge^{-\beta\epsilon}\right).$$

Por outro lado, se $Ge^{-\beta\epsilon} > 1$, ou seja, se $T > T_c$, tanto o numerador quanto o denominador no argumento do logaritmo são negativos e vale

$$F(T > T_c) \approx -N k_B T \ln \left(Ge^{-\beta\epsilon}\right).$$

(e) A energia média é dada por

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{\partial (\beta F)}{\partial \beta}.$$

Acima da temperatura crítica, temos

$$\langle E \rangle \approx \frac{NG\epsilon e^{-\beta\epsilon}}{Ge^{-\beta\epsilon}} = N\epsilon,$$

e portanto o zíper está aberto, já que $\langle n \rangle \approx N$. Por outro lado, abaixo da temperatura crítica, temos

$$\langle E \rangle \approx \frac{G\epsilon e^{-\beta\epsilon}}{1 - Ge^{-\beta\epsilon}},$$

e portanto $\langle n \rangle = O(1)$, ou seja, o zíper está fechado.

7. (a) Descartar os termos contendo o produto das flutuações é válido quando se espera que as correlações entre essas flutuações em spins vizinhos sejam pequenas, ou seja, quando a flutuação de um spin afetar pouco a flutuação de um spin vizinho. Isso deve ocorrer em temperaturas muito acima ou muito abaixo da temperatura crítica, ou ainda quando o número de vizinhos de um spin qualquer for muito grande.
- (b) A primeira relação decorre de desprezar o termo $\delta\sigma_i\delta\sigma_j$ no produto

$$(\langle \sigma \rangle + \delta\sigma_i)(\langle \sigma \rangle + \delta\sigma_j) \approx \langle \sigma \rangle^2 + \langle \sigma \rangle(\delta\sigma_i + \delta\sigma_j) = \langle \sigma \rangle(\sigma_i + \sigma_j) - \langle \sigma \rangle^2.$$

Com isso, é possível reescrever o hamiltoniano na forma

$$H \approx \frac{Nq}{2} \langle \sigma \rangle^2 - \sum_j \mu_0 B_{\text{ef}} \sigma_j,$$

com

$$B_{\text{ef}} = B + \frac{qJ}{\mu_0} \langle \sigma \rangle.$$

Para escrever a função de partição, basta notar que agora o hamiltoniano corresponde ao de uma coleção de spins não interagentes.

- (c) Os extremos de F em relação a $\langle \sigma \rangle$ são dados pela solução da equação

$$\langle \sigma \rangle = \tanh(\beta\mu_0 B + \beta qJ \langle \sigma \rangle),$$

mesmo resultado obtido, por outra abordagem, nas notas de aula.

- (d) A energia livre tem um máximo local em $\langle \sigma \rangle = 0$ para $T < T_c$.

- (e) Os gráficos são qualitativamente idênticos àqueles na figura 11 das notas sobre sistemas interagentes.
- (f) A expansão da energia livre em torno de $\langle \sigma \rangle = 0$ produz

$$F = -Nk_B T \ln 2 + \frac{qJ}{2} \left(1 - \frac{qJ}{k_B T} \right) \langle \sigma \rangle^2 + \frac{q^4 J^4}{12 (k_B T)^3} \langle \sigma \rangle^4 + \dots .$$

O coeficiente do termo quadrático em $\langle \sigma \rangle$ pode ainda ser reescrito como

$$\frac{qJ}{2} \left(1 - \frac{T_c}{T} \right) = \frac{qJ}{2T} (T - T_c)$$

que, quando $T \rightarrow T_c$, assume ainda a forma

$$\frac{qJ}{2T} (T - T_c) \approx \frac{qJ}{2T_c} (T - T_c) .$$

Portanto,

$$a = \frac{qJ}{2T_c} = \frac{k_B}{2} > 0 .$$