Introdução a Transporte e Sinalização Celular

**Deborah Schechtman
deborah@iq.usp.br**

Cronograma

QBQ02508 e QBQ5770- Transporte e Sinalização Celular - 2023

Docentes: Alexander Henning Ulrich e Deborah Schechtman e Fábio L. Forti

Cronograma:

15/08	D	Membranas Biológicas: Estrutura e Função. Sinalização através de Membranas.
22/08	H	Tipos de receptores
29/08	D	Quinases
5/09		Semana da Pátria – Não haverá aula.
12/09	D	Discussão do artigo 1: Quinases
19/09	D	Tirosina quinases
26/09		Semana da Química
03/10	D	Discussão do artigo 2: Tirosina quinases
10/10	H	Receptores acoplados a proteína G - 7TMR
17/10	H	Artigo 3: Receptores acoplados a proteína G 7TMR
24/10	F	Fosfatases
31/10	D	MAPK
07/11	D	Artigo 4: MAPK
14/11	H	PI3K
21/11	D	Sinalização parasita/ hospedeiro
28/11	H	Artigo 5: PI3K
05/12	H	Segundos mensageiros e sinalização REDOX
12/12		Prova

SINALIZAÇÃO NO IQ

Profa. Deborah Schechtman
NGF

Prof. Alexander Henning Ulrich e
Profa. Claudiana Lameu
Receptores Purinérgicos

Prof. Ricardo José Giordano
Angiogênese

Profa. Alexandre Bruni Cardoso
Interções células tumorais
com a matriz extracelular

Profa. Betina Malnic
Receptores olfatórios

SINALIZAÇÃO NO IQ

Profa. Daniela Sanchez Basseres
GTPase KRas

Profa. Deborah Schechtman
Proteína quinase C

Profa. Alicia Kowaltowski
Bioenergética

Profa. Nadja Souza Pinto
DNA mitocondrial e reparo

Prof. Nicolas Carlos Hoch
Reparo de DNA

Prof. Fábio Luis Forti
Fosfatases/ GTPases

Profa. Sayuri Miyamoto
Modificações redox de lipídeos

Prof. Marcelo S. da Silva
reparo de DNA em tripanosomatídeos

O que é Transdução de sinal

• Transdução de sinal "Processo pelo qual um sinal químico ou físico extracelular ativa um receptor ou uma alteração na membrana plasmática causando respostas intracelulares"

<https://www.youtube.com/watch?v=tMMrTRnFdI4>

Membranas Biológicas

Definição características e funções

Membrana plasmática e de organelas

Paredes celular

GRAM-NEGATIVE

GRAM-POSITIVE

Estructuras lipídicas

Modelo do mosaico fluido

Composição de lipídeos varia entre membranas de organismos diferentes

TABLE 11-1 Major Components of Plasma Membranes in Various Organisms					
	Components (% by weight)			Sterol type	Other lipids
	Protein	Phospholipid	Sterol		
Human myelin sheath	30	30	19	Cholesterol	Galactolipids, plasmalogens
Mouse liver	45	27	25	Cholesterol	—
Maize leaf	47	26	7	Sitosterol	Galactolipids
Yeast	52	7	4	Ergosterol	Triacylglycerols, steryl esters
Paramecium (ciliated protist)	56	40	4	Stigmasterol	—
<i>E. coli</i>	75	25	0	—	—

Note: Values do not add up to 100% in every case, because there are components other than protein, phospholipids, and sterol; plants, for example, have high levels of glycolipids.

Table 11-1
Lehninger Principles of Biochemistry, Fifth Edition
 © 2008 W. H. Freeman and Company

Composição de lipídios varia entre membranas das células

Modelo do mosaico fluido revisitado

Assimetria

Figure 11-5
 Lehninger Principles of Biochemistry, Fifth Edition
 © 2008 W. H. Freeman and Company

Composição de lipídeos varia entre as faces de uma membrana

Movimento de "flip-flop" não é espontâneo

Composição de lipídeos e adaptação ao meio

Observação: a instauração se deve à ocorrência de pelo menos uma dupla ligação entre os carbonos da molécula.

TABLE 11-2 Fatty Acid Composition of *E. coli* Cells Cultured at Different Temperatures

	Percentage of total fatty acids [†]			
	10 °C	20 °C	30 °C	40 °C
Myristic acid (14:0)	4	4	4	8
Palmitic acid (16:0)	18	25	29	48
Palmitoleic acid (16:1)	26	24	23	9
Oleic acid (18:1)	38	34	30	12
Hydroxymyristic acid	13	10	10	8
Ratio of unsaturated to saturated [†]	2.9	2.0	1.6	0.38

Modelo do mosaico fluido revisitado

Lipid rafts (balsas lipídicas)

Membranas podem ter regiões mais ou menos definidas

Citoesqueleto limita movimento dos lipídeos e proteínas

Proteínas de membranas

Proteínas periféricas - ancoradas na membrana

No lado interno da membrana plasmática são encontradas as proteínas ancoradas com ácidos palmítico e mirístico e com grupos farnesyl ou geranygeranyl

- No lado externo da membrana plasmática são encontradas as proteínas ancoradas com grupo glicosil-fosfatidilinositol

Proteínas integrals de membrana

- Alfa-hélices hidrofóbicas ou anfipáticas

Barris β

Fusão e fissão de membranas

Fusão de membranas

- Mediada por proteínas
- SNARES (soluble NSF attachment receptor)
- neurotransmissão
- funcionam como "zíperes"

SARS-CoV-2 COVID-19

Membrane curvature Filapodia e Lamellipodi

Bar domain containing proteins sense curvature

Cytoskeletal fences

Septins are involved in the formation of structures such as, cilia and flagella, dendritic spines, and yeast buds. Limiting cell division.

Neuropatia com Desmielinização

Gap junction

- Structure that permits direct transfer of small molecule(upto 1200Da).
- Composed of family of protein called connexins.
- Mutations in genes encoding connexins are associated with cardiovascular diseases and X-linked form of charcot-Marie-tooth disease.

(a) Direct communication through gap junctions

© 2011 Pearson Education, Inc.

44

Comunicação celular adesão

Comunicação celular adesão

Migração de leucócitos

<https://www.youtube.com/watch?v=B9Qi7we0Ynk>

Transporte através de membranas

Movimento através de uma membrana permeável

Concentração

Carga

Permeabilidade das membranas biológicas

TABLE 11-1 A Comparison of Inorganic Ion Concentrations Inside and Outside a Typical Mammalian Cell*

Component	Cytoplasmic concentration (mM)	Extracellular concentration (mM)
Cations		
Na^+	5-15	145
K^+	140	5
Mg^{2+}	0.5	1-2
Ca^{2+}	10^{-4}	1-2
H^+	7×10^{-5} ($10^{-7.2}$ M or pH 7.2)	4×10^{-5} ($10^{-7.4}$ M or pH 7.4)
Anions		
Cl^-	5-15	110

*The cell must contain equal quantities of positive and negative charges (that is, it must be electrically neutral). Thus, in addition to Cl^- , the cell contains many other anions not listed in this table; in fact, most cell constituents are negatively charged (HCO_3^- , PO_4^{3-} , nucleic acids, metabolites carrying phosphate and carboxyl groups, etc.). The concentrations of Ca^{2+} and Mg^{2+} given are for the free ions: although there is a total of about 20 mM Mg^{2+} and 1-2 mM Ca^{2+} in cells, both ions are mostly bound to other substances (such as proteins, free nucleotides, RNA, etc.) and, for Ca^{2+} , stored within various organelles.

Transporte

Transportadores e Canais

Canais iônicos

- -Movimentam íons inorgânicos.
- -Junto com os trocadores regulam a concentração citoplasmática de íons e o potencial de membrana.

Canais iônicos

Canais iônicos diferem de transportadores de íons:

- Velocidade do fluxo de íons é maior nos canais.
- Canais não são saturáveis.
- "gated" controlados por algum estímulo.

Controlados por ligantes (geralmente oligoméricos).

- Mudança conformacional do canal que abre ou fecha com um ligante.

Controlados por voltagem

- Mudança no potencial transmembranar causa o movimento de uma proteína com carga relativo à membrana causando a abertura ou fechamento do canal

Cystic Fibrosis

<https://youtu.be/eehsgyvm0SQ>

Transportadores e Canais

Transportadores

- Saturáveis
- Baixa velocidade de transporte
- Maioria proteínas monoméricas

Canais

- Mais rápidos
- Insaturáveis
- Maioria proteínas oligoméricas

Transportadores e Canais

Transportadores

Transportadores de íons (transportador de K^+ / filtro de seletividade)

High selectivity needs tight binding site!
Easier to remove water more distant from nucleus!
Bond distance and backbone Carbonyl oxygens = Water for K

The structure of the potassium ion channel explains its rapid rate of transport

High selectivity needs tight binding site!

How to achieve fast transport of channels?

Hydrated K^+ ion proceeds into the channel.
Cell exterior

The ion then gives up its coordinated water molecules and binds to a site within the selectivity filter region

The ion can move between the four sites (tetramer, similar ion affinity).

This multiple binding site mechanism solves the apparent paradox of high ion selectivity and rapid flow.

Transportadores

Antiporte

Simporte

Uniporte

Transportadores de Glicose

Glucose Transporters

- Tissue-specific expression pattern

GLUT-1	RBCs and brain
GLUT-2	Liver, kidney & pancreas
GLUT-3	Neurons
GLUT-4	Adipose tissue & skeletal muscle
GLUT-5	Small intestine & testes
GLUT-7	Liver (ER-membrane)

- Functions:

GLUT-1, 3 & 4	Glucose uptake from blood
GLUT-2	Blood & cells (either direction)
GLUT-5	Fructose transport

Transporte (Uniporter)

Transportadores

Sodium-dependent glucose co-transporters (symporter)

Intestinal mucosa (enterocytes) of the small intestine and the proximal tubule of the nephron. They contribute to renal glucose reabsorption.

Sodium-dependent glucose co-transporters (symporter)

Trocador de cloreto-bicarbonato (trocador aniônico) Co-transportador antiporte

O bicarbonato é mais solúvel no plasma do que o CO_2

Transporte ativo resulta no acúmulo do soluto acima do ponto de equilíbrio termodinamicamente não é favorável e deve ser acoplado a um processo exergônico

Transportadores (ATP)

Transportador "bomba" tipo P

Na⁺/K⁺-ATPase

- Na⁺/K⁺-ATPase exporta 3 íons de Na⁺ e importa 2 K⁺ por ciclo
- O transporte ativo é acoplado com a hidrólise de 1 ATP

Digitalis

Digitalina (insuficiência cardíaca)

- ❖ Increases the force of cardiac contraction, causing the cardiac output.
- ❖ Improved circulation leads to reduced sympathetic activity, which then reduces peripheral resistance with reduction in heart rate.
- ❖ Slows down conduction velocity through the AV node, which accounts for its use in atrial fibrillation.

Transportadores (ABC)

(ABC –ATP binding
Cassette)

(A) A BACTERIAL ABC TRANSPORTER

(B) A EUKARYOTIC ABC TRANSPORTER

Transportador de lactose movido por um gradiente de H^+

Gated Channels

Superfamilies of Ligand-Gated Ion Channels

Cys-Loop Receptors

Glutamate receptors

ATP receptors

Aquaporina Transportador de água

• Mutations in the aquaporin-2 [gene](#) cause hereditary nephrogenic [diabetes insipidus](#) in humans.

• Mice [homozygous](#) for inactivating mutations in the aquaporin-0 gene develop [congenital cataracts](#).

Potencial de ação

Um potencial de ação é uma inversão do potencial de membrana que percorre a membrana de uma célula. Potenciais de ação transportam rapidamente informações entre e dentro dos tecidos.

Utilizados mais intensamente pelo sistema nervoso, para comunicação entre neurônios e para transmitir informação dos neurônios para outro tecido do organismo, como os músculos ou as glândulas.

Despolarização neuronal

<https://m.youtube.com/watch?v=fHRC8SILcH0>

Condução nervosa

Comunicação por meio de neurotransmissores

Constituição do Neurônio:

- corpo celular ou pericario
- prolongamento celulares: dendrites e axônio

Método de medir os potenciais da membrana - patch clamp

Erwin Neher

Bert Sakmann

for their discoveries concerning the function of single ion channels in cells"

How optogenetics works

<https://www.youtube.com/watch?v=7Mmsah0v9Qc>