Exercícios de fixação – Trabalho e energia cinética

- 1) Calcule a energia cinética de um carro e um trem viajando a 120 km/h. A massa do trem é de 120 t e do carro é 1 t. Dado: 1 t = 1000 kg.
- 2) Uma força constante produz um trabalho tal que a velocidade de uma partícula de 1 kg aumenta de 2 m/s para 4 m/s ao longo de uma trajetória de 1 m.
 - a. Qual o trabalho realizado pela força sobre o corpo?
 - b. Qual o módulo e sentido da força em relação ao deslocamento?
- 3) Uma força constante de 3 N é aplicada sobre um corpo na direção Nordeste. O corpo de 1 kg se desloca na direção Leste. Uma força de atrito também atua no corpo, com intensidade 0,8 N. Se o corpo parte do repouso e atinge 2 m/s em 4 s, calcule:
 - a. o trabalho total sobre o corpo
 - b. o trabalho do atrito
 - c. o trabalho da força aplicada
- 4) Um corpo de 2 kg é lançado para cima a partir do solo, estando inicialmente em repouso e atingindo o topo da trajetória em $y = 2$ m.
 - a. Qual o trabalho da força gravitacional sobre o corpo durante a subida?
 - b. Qual o trabalho da força gravitacional durante a descida?
- 5) Uma força $\vec{F} = 2x \hat{i} - 5 \hat{j}$ é aplicada sobre um corpo que se desloca desde $\vec{r}_0 = 10 \hat{j}$ até o ponto $\vec{r} = 8 \hat{i} + 2 \hat{j}$.
 - a. Qual o trabalho da força sobre o corpo?
 - b. A velocidade do corpo aumenta ou diminui durante o deslocamento?
- 6) Qual o trabalho da força elástica de uma mola quando esta é distendida por 2 cm desde a sua posição de equilíbrio? Suponha $k = 20$ N/m.
- 7) Se uma mola é comprimida por 2 cm desde sua posição de equilíbrio, qual o trabalho realizado pela força elástica? Suponha $k = 20$ N/m.
- 8) Qual o trabalho realizado pela força aplicada para comprimir a mola no exercício 7?
- 9) Um objeto de 1 kg é solto de uma altura de 2 m a partir do repouso.
 - a. Qual o trabalho da força gravitacional sobre o corpo em 1 s de queda?
 - b. Qual a taxa de realização de trabalho durante a queda na letra a?
- 10) Uma força variável é aplicada sobre um corpo, desenvolvendo uma potência $P = 2t^2 + 3t + 4$. Se a força atua sobre o corpo por 10 s, qual o trabalho da força?

Resoluções Lista

1) $v = 120 \text{ km/h} = 33,3 \text{ m/s}$

trêm: $K = \frac{1}{2} \cdot 120 \times 10^3 \times (33,3)^2 = 66,5 \times 10^6 \text{ J}$

carro: $K = \frac{1}{2} \cdot 1000 \times (33,3)^2 = 0,55 \times 10^6 \text{ J}$

2) $v_0 = 2 \text{ m/s}$

$v_f = 4 \text{ m/s}$

$\Delta s = 1 \text{ m}$

$m = 1 \text{ kg}$

a) $W = \Delta K$

$\Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2} \cdot m (v_f^2 - v_i^2)$

$\Rightarrow W = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (4^2 - 2^2) = 6 \text{ J}$

b) Como $W > 0$, $\theta \leq 90^\circ$

3) $F = 3 \text{ N}$

$\theta = 45^\circ$

$m = 1 \text{ kg}$

$f = 0,8 \text{ N}$

$v_0 = 0$

$v = 2 \text{ m/s}$

$\Delta t = 4 \text{ s}$

a) $W_T = ?$

$W = \Delta K$

$\Rightarrow W = \frac{1}{2} \cdot m (v_f^2 - v_i^2) = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (2^2 - 0^2)$

$\Rightarrow W_T = 2 \text{ J}$

b) $W_f = f \cdot d \cdot \cos \theta$

para encontrar d: $v^2 = v_0^2 + 2ad$

para encontrar a: $F \cdot \cos 45^\circ - f = ma$

$\Rightarrow a = 1,3 \text{ m/s}^2$

$\Rightarrow \frac{2^2 - 0^2}{2 \times 1,3} = d \Rightarrow d = 1,5 \text{ m}$

$\Rightarrow W_f = 0,8 \times 1,5 \times \cos 180^\circ = -1,2 \text{ J}$

c) $W_F = F \cdot \cos \theta \cdot d$

$\Rightarrow W_F = 3 \cdot \cos 45^\circ \cdot 1,5$

$\Rightarrow W_F = 3,2 \text{ J}$

ou
 $W_T = W_F + W_f$

$$4) m = 2 \text{ kg}$$

$$v_0 = 0$$

$$y_{\text{max}} = 2 \text{ m}$$

$$y_0 = 0$$

$$a) W = -m \cdot g \cdot d \Rightarrow W = -2 \times 9,8 \times 2 = -39,2 \text{ J}$$

$$b) W = m \cdot g \cdot d = 2 \times 9,8 \times 2 = 39,2 \text{ J}$$

$$5) \vec{F} = 2x \hat{i} - 5 \hat{j}$$

$$\vec{r}_0 = 10 \hat{j}$$

$$\vec{r} = 8 \hat{i} + 2 \hat{j}$$

$$a) W = \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{x_0}^x F_x \cdot dx + \int_{y_0}^y F_y \cdot dy$$

$$\Rightarrow W = \int_0^8 2x \, dx + \int_{10}^2 (-5) \cdot dy = \left. \frac{x^2}{2} \right|_0^8 - 5y \Big|_{10}^2$$

$$\Rightarrow W = 64 - 5 \cdot (2 - 10) = 104 \text{ J}$$

b) Como $W > 0 \Rightarrow \Delta K > 0 \Rightarrow v$ aumenta

$$6) W_{\text{Fed}} = ?$$

$$\Delta x = 2 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$k = 20 \text{ N/m}$$

$$W = \int_{x_0}^x -kx \cdot dx = -20 \int_0^{0,02} x \cdot dx = -20 \cdot \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{0,02}$$

$$\Rightarrow W = -10 \times 0,02^2 = \boxed{-4 \times 10^{-3} \text{ J}}$$

$$7) W_{\text{Fed}} = ?$$

$$\Delta x = -2 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$W = -20 \int_0^{-0,02} x \cdot dx = -20 \cdot \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{-0,02} = -10 \times 0,02^2 = \boxed{-4 \times 10^{-3} \text{ J}}$$

$$8) W_F = ?$$

$$F = -F_{\text{el}} \Rightarrow \boxed{W = 4 \times 10^{-3} \text{ J}}$$

$$g) \begin{aligned} y_0 &= 2 \text{ m} \\ v_0 &= 0 \\ m &= 1 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$a) W_{F_g} = ? \quad F_g = -mg \quad W_{F_g} = -mg \cdot \Delta y$$

$$\text{encontrar } \Delta y \text{ em } \Delta t = 1 \text{ s: } y = y_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

$$\Rightarrow y = 2 - \frac{9,8 \times 1^2}{2} = -2,9 \text{ m}$$

$$\Rightarrow \Delta y = -2,9 - 2 = -4,9 \text{ m}$$

$$\Rightarrow W_{F_g} = -1 \times 9,8 \times (-4,9) = \boxed{48,5 \text{ J}}$$

$\rightarrow W > 0$ pois v está aumentando ($\Delta K > 0$)

$$b) P = \frac{W}{\Delta t} = \frac{48}{1} = \boxed{48 \text{ W}}$$

10) Franiárel

$$P = 2t^2 + 3t + 4$$

$$\Delta t = 10 \text{ s}$$

$$W = ?$$

$$P = \frac{dW}{dt} \Rightarrow W = \int_{t_0}^t P \cdot dt = \int_0^{10} (2t^2 + 3t + 4) dt$$

$$\Rightarrow P = \frac{2t^3}{3} + \frac{3t^2}{2} + 4t \Big|_0^{10} = \frac{2}{3} \times 10^3 + \frac{3}{2} \times 10^2 + 4 \times 10$$

$$\Rightarrow P = \boxed{857 \text{ W}}$$