

Conciliação de Medicamentos

Em Pacientes com Câncer de Mama



Grupo 8: Danilo dos Santos, Giovana Ludovice, Heloisa Ramos, Matheus Figueiredo, Sofia Bustia

População Amostrai

Características

97% mulheres

Média de idade de 52 anos

Apenas 32,3% com ensino médio completo

67,7% possuem outras doenças de base

Média de 3,38 medicamentos de uso contínuo por paciente



Principais interações



Entre quimioterápicos

31,9%

Entre quimioterápicos e outros medicamentos

35,2%

Entre não quimioterápicos

33%

Uso de Chás Medicinais

61,3% apresentou reação adversa a quimioterapia (náusea, vômitos, hipotensão).

52% fazem uso de chás medicinais por conta das reações adversas.

- como o índice terapêutico dos quimioterápicos antineoplásicos muitas vezes é estreito, os fitoterápicos e as plantas medicinais podem alterar a expressão de diversas enzimas relacionadas à biotransformação de medicamentos.



Tipos de Intervenção



Educação em Saúde

87,5%

Monitorar Sinais, Sintomas e Exames Laboratoriais

8,3%



Sugerir Início de Terapia Medicamentosa

4,3%

Em 83,9% das conciliações realizadas foi identificado alguma discrepância